Rubio Pharma
y Asociados
S.A. de C.V.



Dr. Hans H. Reckeweg

Compendio de Medicamentos y Guía Terapéutica

GRUPO ERGO PHARM ALEMANIA

-Heel Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden - Baden Alemania.

BHI BIOLOGICAL
HOMEOPATHIC
INDUSTRIES, INC.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO,U.S.A.

COSMOCHEMA Dr. H-H. Reckeweg GmbH
BADEN - BADEN GERMANY

Phinter Heel
Madrid, España.

Indice

Prólogo 3

Laboratorio Heel 4
Introducción 5
Homeoterapia, terapia antihomotóxica y terapia biológica 5
Grupos de medicamentos antihomotóxicos 6
A. Medicamentos compuestos 6
B. Medicamentos homeopáticos simples o unitarios 7
C. Medicamentos alopáticos homeopatizados 7
D. Catalizadores intermediarios 7
E. Nosodes 7
F. Organopreparados -"suis" 7
Prescripción y posología en la práctica 7
1. Medicamentos compuestos 7
1.1 Elección de los medicamentos 7
1.2 Dosificación y frecuencia de administración 8
1.3. Dosificación en lactantes y niños 9
1.4 Formas de administración 9
1.5 Advertencias 10
2. Medicamentos simples o unitarios 10
2.1 Elección de los medicamentos 11
2.2. Elección de las diluciones 11
2.3. Dosificación y frecuencia de administración 12
2.4. Formas de administración 12
Indice Terapéutico Heel 14
Medicamentos homeopáticos simples o unitarios 36
Medicamentos simples o unitarios contenidos en los medicamentos compuestos 46

Laboratorio B.H.I. 55
Homeopatía 55
La prescripción homeopática 55
Preparados combinados 56
Presentaciones comerciales 57
Líquidos (gotas) 57
Tabletas 57
Administración 58
Indice terapéutico B.H.I. 59

Materia Médica de los preparados B.H.I.
Ingredientes y síntomas correspondientes 74

Compendio de Medicamentos 93
Ampolletas Grupo Compositum 1 94
Ampolletas Grupo Compositum 2 98
Ampolletas Homaccord 103
Ampolletas remedios combinados 109
Tabletas Heel 114
Gotas especialidades 121
Gotas Homaccord 128
Gotas categoría especial 134
Pomadas Heel 135
Supositorios Heel 136
Spray Nasal Heel 136
Novedades-Ampolletas Heel 137
Colirio Heel 137
Tabletas Cosmochema 138
Gotas Cosmochema 139
Tabletas B.H.I. 142
Jarabe Phinter Heel 152
Glóbulos Phinter Heel 152

Anexos y Novedades 153

Medicamentos Alopáticos Homeopatizados 154
Catalizadores intermediarios 156
Nosodes 161
Organopreparados-"suis" 173

Oligoelementos 179
Metaboheel® 180
Lipolisheel® 181
Muskheel® 183

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

Prólogo.

En los años de 1948/49 los principios homeopáticos recibieron una fundamentación científica basada en los experimentos y hallazgos del **Dr. Hans-Heinrich Reckeweg**. Su publicación **Homotoxicología** le abrió nuevas sendas al tratamiento homeopático.

De acuerdo con las leyes de la Homotoxicología, la enfermedad es una forma de expresarse de la auto-curación. El organismo afectado siempre trata de regular sus funciones a través del sistema de la gran defensa, activando las funciones de detoxicación y excreción. La inflamación y la fiebre no son siempre signos negativos sino que sirven al propósito de detoxicar y eliminar homotoxinas. Esto ocurre siempre de acuerdo con las leyes químicas definidas y demostradas en la obra -- **Homotoxicología**. Siguiendo las enseñanzas de la homotoxicología, al médico se le es presentada una mejor forma de ver la enfermedad ayudándosele a clarificar muchos interrogantes y a trazar y reestablecer reglas terapéuticas.

La concentración de los índices terapéuticos y farmacológicos de los prestigiados laboratorios que representamos **HEEL, BHI, COSMOCHEMA Y PHINTER HEEL**, hacen de éste documento una guía práctica y de fácil consulta para los profesionales que están utilizando esta medicina de vanguardia.

La sencilla exposición de las patologías más comunes y de los tratamientos sugeridos, así como la seguridad que impone el registro ante la Secretaría de Salud, convierte este compendio en una de las herramientas más utilizables en la consulta diaria.

La Sociedad Médica Mexicana de Homotoxicología, trabaja en coordinación con la Facultad de Medicina y con la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos en pro de un programa de educación y preparación médica continua para ello se trae a México a ponentes de reconocimiento internacional como son: **DR. IVO BIANCHI (Italia), Prof. HARTMUT HEINE (Alemania), DR. MASSIMO DE BELLIS (Italia), DR. ARTURO C. TOLEDO (México)** y la futura participación de otros ponentes tanto internacionales como nacionales, para poder elevar la calidad de la enseñanza, llevando como finalidad el tratamiento integral para sus pacientes utilizando la mejor calidad a nivel mundial en cuanto a medicamentos y dándole a ustedes la confianza de trabajar con productos registrados y legales en el país.

Rubio Pharma y Asociados, S.A. de C.V., pone a su disposición esta obra, en la cual además de su contenido científico está plasmado el esfuerzo de todo un equipo de trabajo que puso su mayor empeño en su realización.

Nuestro compromiso: Atención, Calidad y Servicio.

Empresas que nos respaldan:

-Heel Biologische Heilmittel Heel GmbH Baden - Baden Alemania.

BHI BIOLOGICAL HOMEOPATHIC INDUSTRIES, INC. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO,U.S.A.

COSMOCHEMA Dr. H-H. Reckeweg GmbH BADEN - BADEN GERMANY

Phinter Heel Madrid, España.

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

Estimado/a doctor/a:

Con el fin de facilitarle su labor de prescripción, nos complace comunicarle que de las **presentaciones** citadas en este vademécum las **disponibles en México** son las siguientes:

Formas farmacéuticas	**Presentaciones**
Ampollas inyectables (válidas para vía oral) de 1,1 ml, 2,0 ml y 2,2 ml	Cajas de 10 ampollas
Comprimidos	Envase de 50 comprimidos
Gotas	Frascos cuentagotas de 30 ml
Pomadas	Tubos de 50 g
Supositorios	Envase con 12 supositorios
Colirio	Caja con 10 aplicaciones
Spray nasal	Frasco solución 20 ml

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

Introducción

Homeoterapia, terapia antihomotóxica y terapia biológica

En los albores del s. XIX, un médico alemán, el Dr. Samuel Hahnemann desarrolló una forma especial de terapéutica medicamentosa, la homeopatía. Esta terapia consiste en activar la capacidad intrínseca de autocuración del organismo y puede conceptuarse como una terapia específica de estimulación o de regulación. No obstante, desde la época de Hahnemann, el uso de los medicamentos homeopáticos ha ido evolucionando en distintas direcciones, configurándose diversos métodos que, actualmente, se engloban bajo el término de **"homeoterapia"**. De este modo, la homeoterapia agrupa a todos los métodos terapéuticos que utilizan medicamentos homeopáticos.

La aportación quizá más importante a la evolución y actualización de la terapéutica homeopática se debe a otro médico también alemán, el **Dr. Hans-Heinrich Reckeweg** (1905-1985), cuyo mérito fue el de unir los avances habidos en las ciencias médicas básicas (biología molecular, fisiología, anatomía patológica, etc.) con posterioridad a Hahnemann y la experiencia terapéutica atesorada por la homeopatía.

Reckeweg creó el término de **homotoxicología** para catalogar sus estudios e investigaciones sobre el fenómeno de enfermar humano, concebido como desequilibrio biológico producido por diversos factores y agentes etiológicos, que reciben la denominación general de **homotoxinas.** En este sentido, la enfermedad puede definirse como la manifestación de las reacciones de defensa que el organismo activa para proteger su integridad o su equilibrio funcional ante la agresión por homotoxinas, o bien representa el intento de compensar las lesiones provocadas por las mismas, teniendo por tanto, desde el punto de vista biológico, un significado favorable.

De lo anterior se deduce que la intervención terapéutica debe orientarse en el sentido de modular, y no inhibir, dichas reacciones defensivas, para lo cual tienen una indicación especial los medicamentos homeopáticos. No obstante, esto no excluye que, cuando el carácter o la intensidad de los síntomas o manifestaciones patológicas pueda causar serios perjuicios a la salud o cuando el sufrimiento de un paciente sea intenso, lógicamente haya que recurrir a medicamentos de tipo supresivo.

Considerando la acción de regulación o de estimulación de los mecanismos biológicos de defensa del organismo que ejercen los medicamentos homeopáticos, estos representan la base de la terapia antihomotóxica. Así, puede comprenderse la calificación de **bioterapéuticos antihomotóxicos** que reciben los medicamentos homeopáticos en la terminología propia de la homotoxicología, ya que los mismos actúan contra las causas de las enfermedades (homotoxinas) activando los mecanismos de defensa del organismo, con el objetivo de restablecer el equilibrio biológico perdido.

Sin embargo, para poder actuar terapéuticamente sobre las enfermedades, teniendo en cuenta la sobrecarga tóxica de nuestra civilización actual, o dicho de otro modo, debido a los múltiples factores de riesgo que inciden en la patogénesis de muchas de nuestras enfermedades actuales, es necesaria una ampliación de la farmacopea de la homeopatía clásica. Por este motivo, junto a los grupos de sustancias homeopáticas clásicas de origen vegetal, mineral y animal y nosodes, la homotoxicología utiliza también catalizadores intermediarios, medicamentos alopáticos homeopatizados y organoterápicos (organopreparados-"suis"). Estos grupos de medicamentos (diluidos y dinamizados según las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana) componen un **amplio arsenal terapéutico** que permite afrontar el tratamiento biológico de un gran número de enfermedades.

Tratar biológicamente consiste en procurar al enfermo los medios capaces de activar sus propias defensas o, dicho de otro modo, en **favorecer la curación natural**. Por ello, los medicamentos

antihomotóxicos se integran perfectamente en el concepto de terapia biológica.

Como biológica, la terapia antihomotóxica también tiene el doble objetivo de **tratamiento y prevención** de las enfermedades. En lo relativo al aspecto propiamente terapéutico, se caracteriza por la especial atención que se presta a las relaciones entre los diferentes sistemas del organismo, tratando de comprender y controlar las alteraciones de su sistema básico de regulación y valorando el papel que la individualidad de cada enfermo desempeña en el proceso morboso. En cuanto a las indicaciones preventivas, el objetivo es fortalecer y mantener el estado de salud, siendo posible activar las defensas para, por ejemplo, resistir mejor a las llamadas enfermedades estacionales (resfriados, gripe, alergias primaverales, etc.).

En conclusión, la terapia antihomotóxica es un método terapéutico biológico que, además, ha aportado importantes observaciones las cuales han ayudado a comprender mejor la biopatografía del enfermo y la complejidad de muchas enfermedades, siendo estas dos características la razón de la utilización del concepto de **Medicina Antihomotóxica**, que con todo derecho se incluye en el contexto de la medicina contemporánea.

Grupos de medicamentos antihomotóxicos

Los medicamentos utilizados en la terapia antihomotóxica, todos ellos elaborados según normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB), pueden dividirse en 6 grupos (A-F).

El grupo A lo forman diversas **asociaciones medicamentosas a dosis fijas**, compuestas por sustancias de uno o varios de los grupos B a F (grupos de medicamentos simples o unitarios).

En general, todos los medicamentos de los grupos B a F se presentan en "**acordes de potencias**" (mezcla a partes iguales de potencias bajas, medias y altas de un mismo medicamento) y en dos grados de concentración **Injeel** e **Injeel forte**.

*** A. Medicamentos compuestos**

Los medicamentos antihomotóxicos compuestos son los de prescripción más frecuente, debido, entre otras razones, a que tienen una acción más amplia que los medicamentos simples o unitarios y a la posibilidad de utilizarlos considerando los diagnósticos médicos convencionales.

Este tipo de medicamentos se dividen en 4 subgrupos:

-Especialidades: asociaciones a dosis fijas de sustancias homeopáticas, cada una de ellas generalmente solo en una potencia. Se denominan con un nombre comercial de un solo vocablo (Engystol®, Lymphomyosot®, Trameel S®, Vertheel®, Viburcol®, Zeel T®, etc.). Están disponibles en una o más formas de administración como solución inyectable, pomadas, supositorios, comprimidos o gotas.

-Medicamentos-Homaccord: asociaciones a dosis fijas de "acordes de potencias" de distintos medicamentos homeopáticos. Se denominan con el nombre latino de uno de los componentes seguido del sufijo Homaccord®. Las formas de administración de todos los Homaccord son gotas y solución inyectable.

-Injeel mixtos: asociaciones de dos o más componentes homeopáticos con las mismas características que los Homaccord, pero a diferencia de los mismos, solo se presentan en solución inyectable. Su denominación comercial se realiza con uno o dos vocablos y el término Injeel (acrónimo de **Inj**ections H**eel**) como prefijo o sufijo (Angio-Heel®, Circulo-Heel®, Chol Inj®, Metro-Adnex®, etc.).

-Medicamentos compositum: asociaciones formadas, en algunos casos, solo por componentes homeopáticos clásicos en potencias únicas (por ejemplo, Cantheel® y Carbocomp®). Sin embargo, con mayor frecuencia contienen componentes de los restantes grupos de medicamentos de la homotoxicología (por ejemplo, Soliheel®). La mayoría de los preparados compositum se presentan en solución inyectable o gotas o en ambas formas, aunque

también existen comprimidos (Molybdan®) y gotas nasales (Euphoheel compositum® y Luffheel®).

*** B. Medicamentos homeopáticos simples o unitarios**

Los medicamentos homeopáticos clásicos también se utilizan en el campo de la terapia antihomotóxica. Se recomienda su utilización, cuando el cuadro patogenético del medicamento cubre la sintomatología del paciente. La elección del medicamento y su utilización terapéutica siguen la ley de la similitud, es decir, se utilizan según la metodología terapéutica de la homeopatía clásica.

Más adelante se describen resumidamente importantes "síntomas guía" del cuadro patogenético o "indicaciones probadas" de prácticamente todos los medicamentos homeopáticos clásicos.

*** C. Medicamentos alopáticos homeopatizados**

En este grupo de medicamentos se encuentra una serie de medicamentos utilizados en alopatía, especialmente antibióticos y antipiréticos. En la práctica, tienen un significado especial en el tratamiento de patología iatrogénica, por ejemplo, en los casos de multimorbilidad a consecuencia de una medicación múltiple.

*** D. Catalizadores intermediarios**

La administración de catalizadores intermediarios del metabolismo representa una peculiaridad de la terapia antihomotóxica. Las sustancias conocidas como catalizadores intermediarios se encuentran fisiológicamente a nivel de la respiración celular y de los procesos obtención de energía (ciclo del ácido cítrico, sistemas redox). En parte, se trata también de sustancias que aparecen en ciertos sistemas enzimáticos o que tienen una acción catalítica en estos procesos. Su utilización terapéutica se realiza con el fin de reparar defectos en las cadenas metabólicas, restituyendo así la dinámica de estos procesos.

*** E. Nosodes**

Los nosodes son preparados homeopáticos obtenidos a partir de tejidos y productos patológicos o de microorganismos. El modo de preparación de este tipo de medicamentos, descrito en las farmacopeas homeopáticas, garantiza que los mismos no contengan ni agentes ni productos patológicos infecciosos y, por tanto, su seguridad. Entre sus indicaciones más importantes figura el tratamiento de estados patológicos crónicos relacionados con infecciones sufridas con anterioridad.

*** F. Organopreparados-"suis"**

Las sustancias de partida de estos preparados se obtienen de cerdos sanos. Estos preparados homeopáticos tienen una acción regenerante y vitalizante a nivel celular.

Estos seis grupos de medicamentos (A-F) componen la Materia Médica Homeopática Antihomotóxica, por lo que la terapia antihomotóxica es una terapéutica homeopática completa y ampliada.

Prescripción y posología en la práctica

1. Medicamentos compuestos

1.1. Elección de los medicamentos

Como norma general, la elección de los medicamentos compuestos se realiza **según sus indicaciones,** descritas en el índice terapéutico y en el compendio de medicamentos de Heel. El conocimiento de dichas indicaciones procede de las experiencias de numerosos facultativos de todas las especialidades, dedicados desde hace muchos años a la terapéutica homeopática y antihomotóxica. A ello se suman los datos aportados por numerosas investigaciones científicas (ensayos clínicos multicéntricos, a doble y simple ciego, casuística, etc.). No obstante, conviene recordar que la formulación de estos medicamentos compuestos se basa en la materia médica o farmacología homeopática de sus com-

ponentes (”síntomas guía” de los cuadros patogenéticos, “indicaciones probadas”, etc.), cuyo conocimiento puede ser de gran ayuda para una prescripción diferenciada.

Cuando se presentan afecciones de diverso origen o localización, así como cuando pueda estar indicado más de un medicamento para síntomas que afectan a la misma esfera orgánica, pueden administrarse simultáneamente varios medicamentos para tratar las diferentes afecciones presentes como, por ejemplo, en caso de cefaleas, trastornos cardiocirculatorios, artralgias, etc.

Si es necesaria la prescripción de varios medicamentos, estos se pueden administrar de forma separada (alternándolos en intervalos de 1 a 2 horas) o conjunta, pues no se ha descrito variación alguna en la eficacia de los medicamentos como consecuencia de su administración simultánea.

Los medicamentos que se presentan en diferentes formas de administración (por ejemplo, gotas y comprimidos), en general, pueden considerarse equivalentes desde el punto de vista de su acción terapéutica.

1.2. Dosificación y frecuencia de administración

Como norma básica, para la utilización de los medicamentos Heel es necesario considerar la evolución, aguda o crónica, de la patología a tratar.

En general, en las **enfermedades agudas,** cuanto mayor sea la gravedad e intensidad de las afecciones, mayor será también la frecuencia de administración de los medicamentos prescritos. Así, puede comenzarse el tratamiento con 1 comprimido o 10 gotas cada 15 minutos, durante 2 horas como máximo. A medida que se establece la mejoría, esta dosificación se reducirá paulatinamente, aumentando el espacio de tiempo entre las tomas, hasta llegar a la dosificación habitual en casos agudos, que oscila entre 3 y 6 tomas al día. Los medicamentos inyectables indicados en el tratamiento de los casos agudos se aplicarán al principio diariamente, aunque en procesos patológicos de especial gravedad puede ser necesaria la aplicación hasta 3 veces al día.

En el tratamiento a largo plazo de las **enfermedades crónicas,** la dosis de los medicamentos de administración oral es, en general, de 1 comprimido o 10 gotas 3 veces al día. Las soluciones inyectables se aplicarán 1-3 veces por semana, dosificación recomendada también para el tratamiento de mantenimiento de las enfermedades agudas.

Todas las normas expuestas son de carácter general y orientativo, y tienen la finalidad de ayudar, a aquellos facultativos que comienzan a utilizar en la práctica la homeoterapia antihomotóxica, a determinar la dosificación más conveniente. Conforme aumenta la experiencia, pueden establecerse, cuando ello es posible, pautas de dosificación individualizadas. Así, el médico experimentado, a la hora de determinar la dosis o la frecuencia óptima de administración, no sólo considera la gravedad del proceso patológico, sino también las características constitucionales y la respuesta de cada paciente.

En la posología de cada medicamento compuesto se describen las dosis de adultos, las cuales deberán adaptarse a los niños como se expone seguidamente.

1.3. Dosificación en lactantes y niños

Comprimidos:

Grupo de edad	Dosificación normal	Dosificación en casos agudos
0-12 meses	½ comprimido 2 veces al día	½ comprimido cada 1-2 horas como máximo 8 veces al día
1-6 años	½ comprimido 3 veces al día	½ comprimido cada 1-2 horas como máximo 12 veces al día
6-12 años	1 comprimido 2 veces al día	1 comprimido cada 1-2 horas como máximo 8 veces al día
>12 años	Dosis de adultos	Dosis de adultos

Gotas:

Grupo de edad	Dosificación normal	Dosificación en casos agudos
0-12 meses	3 gotas 1-3 veces al día	4 gotas cada ½ -1 hora como máximo 10 veces al día
1-6 años	5 gotas 1-3 veces al día	6 gotas cada ½ -1 hora como máximo 10 veces al día
6-12 años	7 gotas 1-3 veces al día	8 gotas cada ½ -1 hora como máximo 10 veces al día
>12 años	Dosis de adultos	Dosis de adultos

Gotas nasales: para la dosificación en niños, véase lo especificado en Euphoheel compositum® gotas nasales y Luffheel® gotas nasales.

Supositorios: para la dosificación en lactantes y niños, véase lo especificado en los siguientes medicamentos: Spascupreel S® supositorios y Viburcol® supositorios.

Ampollas de 1,1 ml:

Grupo de edad	Dosificación normal	Dosificación en casos agudos
0-12 meses	0,3 ml ($^1/_3$ de ampolla) 1 vez al día	0,3 ml 3 veces al día
1-6 años	0,5 ml (½ de ampolla) 1 vez al día	0,5 ml 3 veces al día
6-12 años	0,7 ml ($^2/_3$ de ampolla) 1 vez al día	0,7 ml 3 veces al día
>12 años	Dosis de adultos	Dosis de adultos

Ampollas de 2,2 ml:

Grupo de edad	Dosificación normal	Dosificación en casos agudos
0-12 meses	0,7 ml ($^1/_3$ de ampolla) 1 vez al día	0,7 ml 3 veces al día
1-6 años	1,0 ml (½ de ampolla) 1 vez al día	1,0 ml 3 veces al día
6-12 años	1,4 ml ($^2/_3$ de ampolla) 1 vez al día	1,4 ml 3 veces al día
>12 años	Dosis de adultos	Dosis de adultos

1.4. Formas de administración

Los **comprimidos** se toman dejándolos disolver lentamente en la boca, preferentemente bajo la lengua. No se deben masticar ni tragar. Para su administración a lactantes y niños, pueden disolverse en un poco de agua mineral y, en caso necesario, usarse el biberón para facilitar la administración.

Los adultos pueden tomar los medicamentos en **gotas** colocando directamente el número de gotas prescrito bajo la lengua, aunque lo más recomendable es diluirlas en un poco de agua (preferentemente mineral) y mantener la solución resultante en la boca (bajo la lengua) 1 o 2 minutos antes de ingerirla. En niños, siempre se deben diluir en agua y, en caso necesario, puede usarse el biberón para facilitar su administración.

Las **ampollas** pueden administrarse por **vía parenteral:** intramuscular (i.m.), subcutánea (s.c.) o intradérmica (i.d.). La administración intravenosa (i.v.) se debe realizar bajo control médico. El único medicamento en que está contraindicada la inyección intravenosa es el Proinum®. Por otra parte, a no ser que se tenga mucha experiencia en homeopatía, no se recomienda la inyección intravenosa de Cymeheel®, Disheel® y Ubicheel®, dado que estos medicamentos pueden dar lugar a reacciones iniciales muy intensas o graves.

Como aplicación especial, también se pueden realizar inyecciones en puntos de acupuntura, de terapia neural (segmental) y de otras reflexoterapias.

En caso necesario, todas las ampollas Heel pueden asociarse para realizar inyecciones mixtas de los medicamentos que se consideren indicados.

La cuestión sobre si es preferible la administración de los medicamentos en ampollas por vía oral o parenteral no puede responderse en términos generales. En recientes ensayos clínicos de muchos medicamentos compuestos, realizados con un gran número de sujetos, se ha podido observar que, en general, los resultados terapéuticos obtenidos con la administración parenteral son algo mejores que con la administración oral.

No obstante, debido a los diferentes factores que concurren en los casos documentados (la distinta duración de las afecciones, terapias concomitantes, etc.), que probablemente podrían haber influido de forma considerable en los resultados, estos no pueden calificarse, por el momento, como concluyentes y, por tanto, no son extrapolables a la totalidad de los medicamentos.

En general, se recomienda utilizar la vía oral para el tratamiento inicial de la sintomatología que comporte una menor gravedad. Se utilizará la vía parenteral cuando se trate de patologías de curso muy agudo, o cuando en estados patológicos crónicos la administración de los medicamentos en gotas o comprimidos no produzca una mejoría satisfactoria. Tras haber comenzado un tratamiento con una inyección o una serie de inyecciones, es muy recomendable continuar con las formas de administración oral como tratamiento de mantenimiento a largo plazo.

La administración de las ampollas inyectables por **vía oral** (como ampollas bebibles) se realiza colocando el contenido de la ampolla directamente bajo la lengua. No obstante, sobre todo en caso de niños, también puede disolverse el contenido de una o más ampollas en un vaso de agua y beberse a pequeños sorbos a lo largo del día. En lactantes, puede utilizarse el biberón de agua para facilitar la administración.

1.5. Advertencias

Como las **gotas** se fabrican, conforme a las normas de la HAB (Farmacopea Homeopática Alemana) con una mezcla hidroalcohólica, se recomienda prescribirlas con discreción en aquellos pacientes en los que la ingesta de pequeñas cantidades de alcohol pudiera ocasionar problemas como, por ejemplo, en enfermos hepáticos y alcohólicos, sobre todo ex alcohólicos.

Los medicamentos en **comprimidos** se administrarán con precaución en aquellos casos raros de intolerancia a la lactosa. La administración de medicamentos en comprimidos no está contraindicada en pacientes con diabetes mellitus. En formas graves de esta enfermedad, en las que se exige una dieta con un riguroso equilibrio de hidratos de carbono, hay que calcular por comprimido (300 mg) 0,025 UP (unidades pan).

2. Medicamentos simples o unitarios

Las normas que se exponen en este punto se refieren a los medicamentos simples o unitarios en acordes de potencias (Injeel e Injeel forte).

2.1. Elección de los medicamentos

La elección de los **medicamentos homeopáticos clásicos** se realiza considerando la similitud del cuadro patogenético del medicamento con el cuadro clínico del paciente. La mayor eficacia se obtiene, generalmente, cuando la sintomatología del paciente coincide lo más exactamente posible con el cuadro patogenético del medicamento homeopático a administrar. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el grado de estos síntomas patogenéticos clásicos observables en pacientes es inversamente proporcional al grado de tratamiento con fármacos de síntesis química que han recibido previamente.

Cuando sólo se presente un síntoma típico, puede resultar también muy favorable incluir en el plan terapéutico un medicamento homeopático unitario (Injeel, Injeel forte). Por otra parte, también se pueden administrar asociaciones de los medicamentos unitarios que se consideren indicados.

La utilización de los **medicamentos alopáticos homeopatizados** es recomendable, de modo adicional a otros bioterápicos antihomotóxicos indicados, para pacientes tratados previamente de sus afecciones con medicamentos químicos o cuando existan fundadas sospechas de daños iatrogénicos. No es estrictamente necesario que se administre en diluciones homeopáticas la misma sustancia que ha causado el daño, sino que también puede utilizarse una sustancia similar (principio de similitud).

Los **catalizadores intermediarios** contienen potencias homeopáticas de sustancias que desempeñan un papel importante en el metabolismo. Mediante su administración se ejerce una estimulación subliminal de los procesos metabólicos, a fin de activar y restablecer las funciones celulares y enzimáticas bloqueadas. Los catalizadores intermediarios se utilizan sobre todo en el tratamiento de las afecciones crónicas y degenerativas, junto a otros bioterápicos antihomotóxicos indicados.

La acción de los **nosodes** no se dirige directamente contra el agente patógeno, si bien es capaz de mejorar la situación defensiva del organismo para vencer definitivamente la infección o los daños causados por la misma. Habitualmente, se administran como tratamiento posterior, una vez superada la fase aguda de una enfermedad infecciosa (utilización según la similitud anamnésica etiológica). También se pueden administrar conforme a la similitud sintomática (principio de similitud).

Los **organopreparados-"suis"** se utilizan también como terapia de estimulación específica. Estos medicamentos han tenido especial éxito en el tratamiento de enfermedades degenerativas y en caso de insuficiencia funcional de los órganos. Como pauta de tratamiento, en primer lugar se efectuará un tratamiento previo con los medicamentos homeopáticos compuestos indicados y específicos de la enfermedad y, a continuación, el organopreparado-"suis" específico del órgano afecto, sólo o en combinación con los medicamentos homeopáticos que precisa la patología en cuestión.

2.2. Elección de las diluciones

Sobre la utilización de medicamentos homeopáticos en **acordes de potencias,** muy característica de la terapia antihomotóxica, ya existen referencias en una publicación de 1914 de un médico español, el Dr. Cahis. Con el acorde de potencias, en comparación con las potencias únicas, se amplía y profundiza el efecto terapéutico. Julian también informó sobre la utilización de mezclas de distintas potencias de un mismo medicamento homeopático, concretamente de nosodes, haciendo referencia a "precursores como Cahis, Castueil, Barishac y Fortier-Bernoville entre otros". Además describió la acción de este tipo de mezclas como "más rápida, profunda, estable y con menos efectos secundarios". Por otra parte, con la utilización de los acordes de potencias, prácticamente nunca o sólo en muy raras ocasiones se observa la denominada en homeopatía "agravación inicial".

Tal y como demuestra la experiencia, aun cuando se administren conjuntamente, cada una de las potencias del acorde mantiene su propia acción. Consecuentemente, con los acordes de poten-

cias pueden tratarse trastornos orgánicos y funcionales, así como trastornos del comportamiento o psíquicos, los cuales generalmente se consideraban influenciables sólo por potencias altas. Debido a las potencias altas que contienen, los acordes de potencias también son adecuados para el tratamiento de las enfermedades crónicas.

Cuando no se conoce con exactitud la capacidad reactiva del paciente, se recomienda comenzar el tratamiento con la administración de la forma Injeel simple. Como los efectos estimulantes de esta forma son comparativamente más suaves, no hay que temer reacciones iniciales intensas.

En **enfermedades crónicas** es aconsejable comenzar el tratamiento preferentemente con potencias más altas (Injeel simple) y sólo si se confirma una respuesta negativa, pasar a grados de potencia más bajos (Injeel forte).

En **enfermedades agudas,** mientras no se trate de un paciente especialmente sensible, al comienzo del tratamiento se utilizarán potencias más bajas (Injeel forte). La forma Injeel simple se administrará cuando la mejoría sea manifiesta.

2.3. Dosificación y frecuencia de administración

Siempre se deberán determinar de forma individual, por lo cual las normas que se citan a continuación son de carácter general y orientativo. La dosificación que se cita es la de **adultos.** Para **niños,** la frecuencia de administración puede ser la misma, pero la dosis a administrar debe reducirse según lo especificado para los medicamentos compuestos en ampollas de 1,1 ml (descrito anteriormente en el punto 1.3.).

Medicamentos homeopáticos clásicos: en general, 1 ampolla de 1 a 3 veces a la semana; en afecciones agudas, 1 ampolla de 1 a 3 veces al día.

Medicamentos alopáticos homeopatizados: en general, 1 ampolla de 1 a 2 veces a la semana.

Catalizadores intermediarios: en general, 1 ampolla de 1 a 2 veces a la semana.

Nosodes: en general, 1 ampolla de 1 a como máximo 3 veces a la semana.

Organopreparados-"suis": en general, 1 ampolla de 1 a 2 veces a la semana.

2.4. Forma de administración

Los Injeel e Injeel forte pueden administrarse por vía intramuscular, subcutánea, intradérmica o intravenosa. En principio, la inyección intravenosa se deberá aplicar siempre con las debidas precauciones y vigilando atentamente al paciente, sobre todo cuando se aplique un medicamento por primera vez, pues nunca se puede descartar totalmente la posibilidad de una reacción alérgica, aun cuando los componentes del medicamento homeopático se encuentren muy diluidos.

La administración intravenosa puede estar bien indicada en el tratamiento de afecciones agudas, pues el medicamento actúa de forma más rápida. Estudios de aplicación han mostrado unos resultados terapéuticos especialmente favorables con determinados medicamentos compuestos administrados por vía intravenosa. En estos estudios, el índice de resultados terapéuticos favorables logrados mediante la inyección intravenosa fue superior al conseguido con la administración i.m., s.c. o i.d. del mismo agente tera-

péutico. También se observó que la inyección intramuscular actuaba más lentamente que la intravenosa, aunque la primera proporcionaba un efecto más duradero.

La inyección subcutánea en zonas dolorosas, en puntos de acupuntura o de otras reflexoterapias tiene un efecto muchas veces muy rápido. En cambio, si se realiza en otras zonas, su efecto es en cierto modo comparable al de la inyección intramuscular.

La inyección intradérmica tiene, aunque no exclusivamente, un interés especial para las técnicas de mesoterapia, homeo-mesoterapia y homeosiniatría.

Todos los medicamentos Heel en ampollas también pueden administrarse por vía oral, como ya se explica en lo descrito en el punto 1.3.)

Indice Terapéutico Heel

Abscesos
Trameel S® (gotas, comp. amp., pomada)
Belaccord® (gotas, amp.)
Echiheel F®, **Echicomp®** (amp.)

Acidez
(véase Pirosis)

Acné vulgar
Trameel S® (gotas, comp. amp., pomada)
Cuticom® (amp.)
Echiheel F®, **Echicomp®** (amp.)
Hormeel S® (gotas, amp.)
Schwef-Heel® (gotas)

Acroparestesias
Circulo Heel® (amp.)

Acufenos
(a causa de otosclerosis)
Barijodeel® (comp.)
Osteoheel S® (comp.)
Vertheel® (gotas, comp., amp.)

Afonía
Phosphaccord® (gotas, amp.)
Ign Homaccord® (gotas, amp.)

Agotamiento,
estado de
Gincompositum® (gotas)
Proinum® (amp.)
Cerheel® (amp.)
Tesheel C® (amp.)
Ovarheel® (amp.)
Toni Inj® (amp.)
Altriheel® (comp.)
Causheel® (gotas, amp.)
Chinccord® (gotas, amp.)
Coccuheel® (gotas, amp.)
Selaccord® (gotas, amp.)
Cralonin® (gotas, amp.)

Agranulocitosis
(tratamiento complementario)
Tonsi Heel® (amp.)
Galheel® (gotas, amp.)
Psoriheel® (gotas)
Psorinoheel N® (amp.)

Albuminuria
Albumoheel® (comp.)
Apiccord® (gotas, amp.)
Popucompositum® (gotas)
Renheel® (comp.)
Lymphomyosot® (gotas, comp., amp.)

Alcohol,
trastornos por abuso de
Nux Homaccord® (gotas, amp.)
Gastheel® (comp.)
Hepeel® (comp., amp.)

Alérgicas,
enfermedades
Galheel® (gotas, amp.)
Schwef-Heel® (gotas)
Engystol® (comp., amp.)
Lymphomyosot® (gotas, comp., amp.)
Cuticom® (amp.)
Hepaheel® (amp.)

Alopecia
Cuticom® (amp.)
Selaccord® (gotas, amp.)

Amigdalitis
Angeel® (comp.)
Lymphomyosot® (gotas, comp., amp.)
Mercureel® (comp.)
Heelarn® (gotas)
Belaccord® (gotas, amp.)
Tonsi Heel® (amp.)
Trameel S® (gotas, comp., amp.)

Anexitis
Gynaheel® (gotas)
Trameel S® (gotas, comp., amp.)
Metro-Adnex® (amp.)
Echiheel F®, **Echicomp®** (amp.)

Angina de Pecho
(véase Anginosos,trastornos)

Anginosos, trastornos	**Cactheel®** (gotas, amp.) **Cardiheel®** (comp.) **Pectheel®** (comp.) **Cralonin®** (amp.) **Glonheel®** (gotas, amp.) **Corcompo®** (amp.)
Antrax	**Heelarn®** (gotas) **Belaccord®** (gotas, amp.) **Mercureel®** (comp.) **Apiccord®** (gotas, amp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp., Pomada) **Echiheel F®**, **Echicomp®** (amp.)
Apoplejía, secuelas de	**Carbocomp®** (amp.) **Placom®** (amp.) **Cerheel®** (amp.)
Apoplejía e infarto, afecciones tras	**Carbocomp®** (amp.) **Cirheel®** (gotas) **Cralonin®** (gotas, amp.) **Cactheel®** (gotas, amp.) **Corcompo®** (amp.)
Aquilia gástrica	**Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Galheel®** (gotas, amp.)
Arritmia cardiaca	**Cralonin®** (gotas, amp.) **Chelccord®** (gotas, amp.) **Corcompo®** (amp.) **Stropheel®** (amp.)
Arterioesclerosis	**Barijodeel®** (comp.) **Selaccord®** (gotas, amp.) **Cerheel®** (amp.) **Cralonin®** (gotas, amp.) **Auheel®** (gotas) **Cactheel®** (gotas, amp.)
	Cirheel® (gotas) **Carbocomp®** (amp.) **Circulo Heel®** (amp.) **Placom®** (amp.) **Vertheel®** (gotas, comp., amp.)
Articulares, afecciones	**Trameel S®** (gotas, comp.,amp., pomada) **Zeel T®** (comp., amp., pomada) **Kalheel®** (gotas, amp.) **Disheel®** (amp.)
Artritis, artrosis	**Zeel T®** (comp., amp., pomada) **Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Rhodoneel®** (gotas) **Disheel®** (amp.) **Kalheel®** (gotas, amp.) **Nerheum®** (amp.)
Artritis reumatoidea (véase Poliartritis crónica primaria)	
Asma bronquial	**Tarephedreel®** (gotas) **Dros Homaccord®** (gotas, amp.) **Husteel®** (gotas)
Astenia (véase Agotamiento, estados de)	
Atonía Intestinal	**Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Blefaritis	**Viseel®** (comp.) **Oculoheel®** (colirio) **Graf Homaccord®** (gotas, amp.) **Sulfeel®** (comp.)

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F.

Bocio (profilaxis)	**Strummel T**® (comp.) **Strumeel F**® (gotas)
Bronquitis	**Tarephedreel**® (gotas) **Bronheel**® (comp.) **Droperteel**® (comp.) **Mucs Heel**® (amp.) **Griheel**® (comp. amp.) **Engystol**® (comp., amp.) **Trameel S**® (gotas, comp. amp.)
Bronquitis asmática	**Dros Homaccord**® (gotas, amp.)
Bronquitis espasmódica	**Husteel**® (gotas)
Bursitis	**Trameel S**® (gotas, comp. amp., pomada) **Zeel T**® (comp., amp., pomada) **Osteoheel S**® (comp.) **Heelarn**® (gotas)
Cansancio (véase Agotamiento, estados de)	
Cardiospasmo	**Gastheel**® (comp.) **Spascupreel**® (comp., amp.) **Spascupreel S**® (sup.) **Mucs Heel**® (amp.)
Catarro nasal	**Euphoheel**® (gotas, amp.) **Euphoheel Compositum**® (nebulizador nasal) **Nasheel**® (gotas) **Griheel**® (comp., amp.)
Catarros (véanse diagnósticos específicos: Conjuntivitis; Rinitis; Gastritis; etc.)	
Catarro tubárico (oído)	**Euphoheel**® (gotas, amp.) **Mucs Heel**® (amp.)
Cefaleas (Véase también Migraña)	**Spigelon**® (gotas, comp., amp.) **Gels Homaccord**® (gotas, amp.)
Cerebrovasculares, accidentes (estados anteriores y posteriores al accidente)	**Carbocomp**® (amp.) **Meliccord**® (gotas, amp.) **Heelarn**® (gotas) **Cralonin**® (gotas, amp.) **Cerheel**® (amp.) **Corcompo**® (amp.)
Ciática	**Colt Homaccord**® (gotas, amp.) **Spascupreel**® (comp., amp.) **Spascupreel S**® (sup.) **Rhodoneel**® (gotas) **Disheel**® (amp.)
Cicatrices	**Graf Homaccord**® (gotas, amp.) **Cuticom**® (amp.)
Cinetosis	**Coccuheel**® (gotas, amp.) **Omittusheel**® (gotas)
Circulación cerebral, trastornos de la	**Barijodeel**® (comp.) **Cralonin**® (gotas, amp.) **Placom**® (amp.)
Circulación periférica, trastornos de la	**Cirheel**® (gotas) **Artheel**® (gotas) **Circulo Heel**® (amp.) **Placom**® (amp.)
Circulatorios, trastornos (posteriores a embolias)	**Cirheel**® (gotas)

Cistitis	**Renheel®** (comp.) **Cantheel®** (amp.) **Soliheel®** (amp.) **Popucompositum®** (gotas) **Echiheel F®**, **Echicomp®** (amp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Cistopielitis	**Renheel®** (comp.) **Cantheel®** (amp.) **Berbaccord®** (gotas, amp.) **Soliheel®** (amp.) **Popucompositum®** (gotas)
Claudicación intermitente	**Cirheel®** (gotas) **Artheel®** (gotas) **Heelarn®** (gotas) **Aesheel®** (gotas) **Circulo Heel®** (amp.)
Climaterio (véase menopausia)	
Codo del tenista (véase también Epicondilitis)	**Trameel S®** (gotas, comp. amp., pomada) **Ferrheel®** (gotas, amp.)
Colangitis	**Chelccord®** (gotas, amp.) **Spascupreel®** (comp. amp.) **Spascupreel S®** (sup.) **Atropeel®** (amp.) **Hepaheel®** (amp.) **Chol Inj®** (amp.)
Colapso, estados de	**Auheel®** (gotas) **Carbocomp®** (amp.) **Veraccord®** (gotas, amp.)
Colecistitis, colelitiasis	**Chelccord®** (gotas, amp.) **Hepaheel®** (amp.) **Chol Inj®** (amp.) **Momorheel®** (amp.)
Colesterol, (aumento del)	**Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Hepeel®** (comp. amp.) **Hepaheel®** (amp.) **Cirheel®** (gotas)
Cólicos	**Atropeel®** (amp.) **Spascupreel®** (comp., amp.) **Spascupreel S®** (sup.)
Cólicos biliares	**Atropeel®** (amp.) **Chelccord®** (gotas, amp.)
Cólicos intestinales (en niños)	**Atropeel®** (amp.)
Cólicos renales	**Atropeel®** (amp.) **Planheel®** (gotas, amp.) **Sabheel®** (gotas, amp.)
Colitis mucosa, ulcerosa	**Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Veraccord®** (gotas, amp.) **Mercureel®** (comp.) **Galheel®** (gotas, amp.) **Podyllum®** (gotas, amp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Colpitis	**Gynaheel®** (gotas) **Lamioflur®** (gotas) **Trameel S®** (gotas, comp., amp.) **Echiheel F®**, **Echicomp®** (amp.)
Condiloma (tratamiento complementario)	**Cuticom®** (amp.)

Congestión portal	**Lepdra**® (gotas, amp.) **Chol Inj**® (amp.) **Chelccord**® (gotas, amp.)
Congestión venosa	**Hamaccord**® (gotas, amp.) **Cirheel**® (gotas) **Aesheel**® (gotas) **Hmelheel**® (pomada)
Conjuntivitis	**Viseel**® (comp.) **Oculoheel**® (colirio) **Belaccord**® (gotas, amp.) **Mercureel**® (comp.) **Apiccord**® (gotas, amp.) **Trameel S**® (gotas, comp., amp.) **Mucs Heel**® (amp.)
Conmoción cerebral	**Trameel S**® (gotas, comp., amp.) **Vertheel**® (gotas, comp., amp.) **Cerheel**® (amp.)
Contusiones	**Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) **Arniheel**® (pomada)
Convalecencia retardada	**Echicomp**®, **Echiheel F**® (amp.) **Gincompositum**® (gotas) **Psoriheel**® (gotas) **Psorinoheel N**® (amp.) **Galheel**® (gotas, amp.) **Proinum**® (amp.)
Corazón senil	**Cralonin**® (gotas, amp.) **Crataegus-Heel S** (gotas)
Costra láctea	**Cuticom**® (amp.) **Graf Homaccord**® (gotas, amp.) **Psoriheel**® (gotas) **Psorinoheel N**® (amp.)
Craurosis vulvar	**Mezeheel**® (gotas, amp.) **Sulfeel**® (comp.) **Hormeel S**® (gotas, amp.) **Ovarheel**® (amp.)
Dacriocistitis	**Viseel**® (comp.) **Mercureel**® (comp.) **Belaccord**® (gotas, amp.) **Trameel S**® (gotas, comp., amp.)
Debilidad, estados de	**Proinum**® (amp.) **Altriheel**® (comp.) **Gincompositum**® (gotas) **Chinccord**® (gotas, amp.) **Toni inj**® (amp.)
Defensas orgánicas, estimulación de las	**Engystol**® (comp., amp.) **Galheel**® (gotas, amp.) **Psoriheel**® (gotas) **Psorinoheel N**® (amp.) **Schwef-Heel**® (gotas) **Pulcom**® (amp.)
Degenerativas, enfermedades	**Glyheel**® (amp.) **Thal Heel**® (amp.) **Vischeel Medium**® (amp.) **Viheel F**® (amp.) **Placom**® (amp.) **Cymeheel**® (amp.) **Ubicheel**® (amp.)
Depresión endógena	**Psoriheel**® (gotas) **Psorinoheel N**® (amp.) **Galheel**® (gotas, amp.) **Ner Heel**® (comp.) **Barijodeel**® (comp.) **Nerinjeel**® (amp.) **Cerheel**® (amp.)

Depresión exógena	**Ign Homaccord®** (gotas, amp.) **Ner Heel®** (comp.) **Nerinjeel®** (amp.) **Cerheel®** (amp.)
Dermatitis, dermatosis	**Graf Homaccord®** (gotas, amp.) **Psoriheel®** (gotas) **Psorinoheel N®** (amp.) **Schwef Heel®** (gotas) **Sulfeel®** (comp.) **Galheel®** (gotas, amp.) **Hepeel®** (comp., amp.) **Belaccord®** (gotas, amp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Cuticom®** (amp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Apiccord®** (gotas, amp.) **Lamioflur®** (gotas) **Kamillen®** (pomada) **Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Hepaheel®** (amp.)
Dermatitis atópica	**Hepaheel®** (amp.) **Cuticom®** (amp.)
Desarrollo intelectual de los niños trastornos del	**Cerheel®** (amp.) **Toni Inj®** (amp.) **Tonsi heel®** (amp.) **Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Hormeel S®** (gotas, amp.) **Ner Heel®** (comp.) **Valheel®** (gotas)
Diabetes mellitus (tratamiento complementario)	**Syzyheel Compositum®** (gotas) **Lepdra®** (gotas, amp.) **Momorheel®** (amp.)
	Placom® (amp.)
Diarreas	**Areel®** (comp.) **Veraccord®** (gotas, amp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Diátesis exudativa	**Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Tonsi Heel®** (amp.) **Psorinoheel N®** (amp.) **Calcoheel®** (comp.)
Diátesis reumático-gotosa	**Lithimeel®** (comp.)
Disbacteriosis	**Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Veraccord®** (gotas, amp.) **Areel®** (comp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Discopatías (véase Osteocondrosis)	
Dislexia	**Cerheel®** (amp.)
Dismenorrea	**Gynaheel®** (gotas) **Spascupreel®** (comp., amp.) **Spascupreel S®** (sup.) **Atropeel®** (amp.) **Hormeel S®** (gotas, amp.) **Cirheel®** (gotas) **Metro-Adnex®** (amp.) **Ovarheel®** (amp.)
Distonía vegetativa	**Chinccord®** (gotas, amp.) **Ypsiloheel®** (comp.) **Galheel®** (gotas, amp.) **Cerheel®** (amp.) **Placom®** (amp.)

Distorsiones	**Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) **Arniheel**® (pomada)
Distrofia adiposogenital (tratamiento complementario)	**Tesheel C**® (amp.) **Ovarheel**® (amp.) **Thyrheel**® (amp.) **Tonsi heel**® (amp.) **Hormeel S**® (gotas, amp.)
Diverticulitis	**Veraccord**® (gotas, amp.) **Nux Homaccord**® (gotas, amp.) **Areel**® (comp.) **Mucs Heel**® (amp.)
Dolores, en general	**Spigelon**® (gotas, comp., amp.) **Gels Homaccord**® (gotas, amp.)
Dolores intermenstruales	**Metro-Adnex**® (amp.)
Duodenitis	**Duoheel**® (comp.) **Nux Homaccord**® (gotas, amp.) **Mucs Heel**® (amp.) **Areel**® (comp.) **Erigotheel**® (amp.)
Dupuytren, contractura de	**Cuticom**® (amp.) **Graf Homaccord**® (gotas, amp.) **Heelarn**® (gotas) **Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada)
Eccema anal	**Mucs Heel**® (amp.) **Peoneel**® (comp.) **Paeoheel**® (pomada)
Eccemas	**Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) **Cuticom**® (amp.) **Hepaheel**® (amp.) **Abropernol N**® (comp.) **Lamioflur**® (gotas) **Sulfeel**® (comp.) **Soliheel**® (amp.) **Schwef-Heel**® (gotas), también **Calheel**® (pomada) Eccemas liquenificados **Sulfeel**® (comp.) Eccemas pruriginosos **Apiccord**® (gotas, amp.) Eccemas Pustulosos **Graf Homaccord**® (gotas, amp.) Eccemas secos, crónicos **Aesheel**® (gotas) y **Hamaccord**® (gotas, amp.) Eccemas varicosos **Mezeheel**® (gotas, amp.) Eccemas vesiculosos
Eclampsia	**Berbaccord**® (gotas, amp.) **Spascupreel**® (comp., amp.) **Spascupreel S**® (sup.) **Albumoheel**® (comp.)
Ectima	**Psoriheel**® (gotas) **Psorinoheel N**® (amp.) **Heelarn**® (gotas) **Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) **Cuticom**® (amp.)
Edemas	**Apiccord**® (gotas, amp.) **Lymphomyosot**® (gotas, comp., amp.) **Soliheel**® (amp.) **Corcompo**® (amp.)

Edemas posquirúrgicos y postraumáticos	**Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada)
Elefantiasis	**Lymphomyosot**® (gotas, comp., amp.) **Galheel**® (gotas, amp.) **Apiccord**® (gotas, amp.) **Cirheel**® (gotas) **Placom**® (amp.) **Tonsi Heel**® (amp.) **Thyrheel**® (amp.) **Cuticom**® (amp.) **Soliheel**® (amp.)
Embolias, trastornos posteriores a	**Colt Homaccord**® (gotas, amp.) **Placom**® (amp.)
Empiema	**Trameel S**® (gotas, comp., amp.) **Cruroheel**® (comp.) **Heelarn**® (gotas) **Tonsi Heel**® (amp.) **Echicomp**®, **Echiheel F**® (amp.)
Encefalitis, trastornos posteriores a	**Apiccord**® (gotas, amp.) **Belaccord**® (gotas, amp.) **Echicomp**®, **Echiheel F**® (amp.) **Tonsi Heel**® (amp.) **Placom**® (amp.) **Cerheel**® (amp.) **Gels Homaccord**® (gotas, amp.)
Endarteritis obliterante	**Cirheel**® (gotas) **Placom**® (amp.) **Corcompo**® (amp.)
Endometritis	**Gynaheel**® (gotas) **Heelarn**® (gotas) **Lamioflur**® (gotas) **Metro-Adnex**® (amp.)
Enfisema	**Cralonin**® (gotas, amp.) **Galheel**® (gotas, amp.) **Tarephedreel**® (gotas) **Mucs Heel**® (amp.) **Corcompo**® (amp.)
Enterocolitis	**Nux Homaccord**® (gotas, amp.) **Veraccord**® (gotas, amp.) **Mucs Heel**® (amp.) **Echicomp**®, **Echiheel F**® (amp.)
Enuresis nocturna	**Planheel**® (gotas, amp.) **Hormeel S**® (gotas, amp.) **Ner Heel**® (comp.) **Soliheel**® (amp.) **Tesheel C**® (amp.) **Ovarheel**® (amp.)
Enzimáticas, funciones (trastornos de las)	**Cymeheel**® (amp.) **Ubicheel**® (amp.) **Glyheel**® (amp.)
Epicondilitis	**Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) **Ferrheel**® (gotas, amp.) **Osteoheel S**® (comp.) **Disheel**® (amp.) **Zeel T**® (comp., amp., pomada)
Eritema exudativo, multiforme y nudoso	**Abropernol N**® (comp.) **Hamaccord**® (gotas, amp.) **Cruroheel**® (comp.) **Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) **Tonsi Heel**® (amp.) **Placom**® (amp.)

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

Eritema solar
(véase también Quemaduras solares)
Trameel S® (gotas, comp., amp., pomada)
Calheel® (pomada)
Kamillen® (pomada)

Esclerodermia
Cirheel® (gotas)
Lymphomyosot® (gotas, comp., amp.)
Cuticom® (amp.)

Esclerosis cerebral
Barijodeel® (comp.)
Selaccord® (gotas, amp.)
Cerheel® (amp.)

Esclerosis lateral amiotrófica
Galheel® (gotas, amp.)
Hormeel S® (gotas, amp.)
Psoriheel® (gotas)
Psorinoheel N® (amp.)
Cerheel® (amp.)

Escotomas centelleantes
Gels Homaccord® (gotas, amp.)
Spigelon® (gotas, comp., amp.)
Cerheel® (amp.)

Escrofulosis
Calcoheel® (comp.)
Mercureel® (comp.)
Lymphomyosot® (gotas, comp., amp.)
Natheel® (gotas, amp.)

Esguinces
Trameel S® (gotas, comp., amp., pomada)

Espasmos
Atropeel® (amp.)
Spascupreel® (comp., amp.)
Spascupreel S® (sup.)

Espasmos intestinales
Nux Homaccord® (gotas, amp.)
Spascupreel® (comp., amp.)
Spascupreel S® (sup.)
Atropeel® (amp.)
Mucs Heel® (amp.)

Espondilartrosis
Zeel T® (comp., amp., pomada)
Disheel® (amp.)

Estiloiditis
(véase también Epicondilitis)
Trameel S® (gotas, comp., amp., pomada)
Ferrheel® (gotas, amp.)
Zeel T® (comp., amp., pomada)

Estomatitis
Mucs Heel® (amp.)
Trameel S® (gotas, comp.,amp., pomada)
Echicomp®, **Echiheel F®** (amp.)

Estreñimiento
Nux Homaccord® (gotas, amp.)

Exantema
Apiccord® (gotas, amp.)
Belaccord® (gotas, amp.)
Psoriheel® (gotas)
Psorinoheel N® (amp.)
Sulfeel® (comp.)
Trameel S® (gotas, comp., amp.)
Tonsi Heel® (amp.)
Hepaheel® (amp.)

Exostosis
Osteoheel S® (comp.)
Cruroheel® (comp.)
Lymphomyosot® (gotas, comp., amp.)

Eyaculación precoz
Tesheel C® (amp.)

Faringitis
Phosphaccord® (gotas, amp.)
Tarephedreel® (gotas)
Belaccord® (gotas, amp.)

	Euphoheel® (gotas, amp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Bronheel®** (comp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Fiebre del heno (véase Rintis alérgica estacional)	
Fístulas	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Cruroheel®** (comp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Mercureel®** (comp.) **Lamioflur®** (gotas) **Osteoheel S®** (comp.)
Fisuras	**Peoneel®** (comp.) **Paeoheel®** (pomada) **Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Abropernol N®** (comp.)
Fisuras anales	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Peoneel®** (comp.) **Paeoheel®** (pomada) **Hamaccord®** (gotas, amp.) **Hmelheel®** (pomada)
Flatulencia (véase también Meteorismo)	**Areel®** (comp.) **Gastheel®** (comp.) **Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Hepeel®** (comp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Flemones	**Trameel S®** (gotas, comp., amp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Belaccord®** (gotas, amp.)
Fracturas (para favorecer su consolidación)	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Heelarn®** (gotas) **Arniheel®** (pomada)
Furunculosis	**Belaccord®** (gotas, amp.) **Mercureel®** (comp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Heelarn®** (gotas) **Arniheel®** (pomada) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Gastritis	**Gastheel®** (comp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Gastroenteritis	**Veraccord®** (gotas, amp.) **Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Areel®** (comp.) **Gastheel®** (comp.) **Duoheel®** (comp.) **Mucs Heel®** (amp.) **Omittusheel®** (gotas) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Gingivitis	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., Pomada) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Glandulares, disfunciones	**Thyrheel®** (amp.) **Glyheel®** (amp.)
Globo histérico	**Ypsiloheel®** (comp.) **Ign Homaccord®** (gotas, amp.)
Glomerulonefritis	**Cantheel®** (amp., gotas) **Soliheel®** (amp.) **Albumoheel®** (comp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)

	Apiccord® (gotas, amp.) **Popucompositum®** (gotas)
Granulocitopenia (tratamiento complementario)	**Galheel®** (gotas, amp.) **Tonsi Heel®** (amp.) **Mercureel®** (comp.) **Heelarn®** (gotas)
Gripe y resfriados	**Griheel®** (comp., amp.) **Acoheel®** (gotas, amp.) **Bryaconeel®** (comp.) **Engystol®** (comp., amp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp.) **Viburcol®** (sup.) **Euphoheel®** (gotas, amp.) **Euphoheel Compositum®** (nebulizador nasal)
Hematomas	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Belaccord®** (gotas, amp.) **Arniheel®** (pomada)
Hemorragias capilares	**Cinnaheel®** (gotas, amp.) **Hamaccord®** (gotas, amp.)
Hemorragias petequiales	**Phosphaccord®** (gotas, amp.) **Cinnaheel®** (gotas, amp.)
Hemorroides	**Hamaccord®** (gotas, amp.) **Hmelheel®** (pomada) **Cirheel®** (gotas) **Aesheel®** (gotas) **Peoneel®** (comp.) **Paeoheel®** (pomada) **Podyllum®** (gotas, amp.)
Hepatitis	**Chelccord®** (gotas, amp.)
	Hepaheel® (amp.) **Hepeel®** (comp., amp.) **Chol Inj®** (amp.) **Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Galheel®** (gotas, amp.) **Engystol®** (comp., amp.)
Hepatopatías	**Hepeel®** (comp., amp.) **Chelccord®** (gotas, amp.) **Chol Inj ®** (amp.) **Galheel®** (gotas, amp.) **Hepaheel®** (amp.) **Lepdra®** (gotas, amp.)
Heridas	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Arniheel®** (pomada) **Hmelheel®** (pomada) **Kamillen®** (pomada) **Paeoheel®** (pomada) Especialmente indicada en fisuras **Calheel®** (pomada) Particularmente para heridas por desgarro
Herpes zoster	**Ranuheel®** (gotas, amp.) **Mezeheel®** (gotas, amp.) **Apiccord®** (gotas, amp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp.) **Engystol®** (amp.): aplicación tópica **Cuticom®** (amp.)
Hidronefrosis	**Popucompositum®** (gotas) **Soliheel®** (amp.)
Hidropesía	**Apiccord®** (gotas, amp.) **Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.)

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

Hidropesía del oído medio	**Euphoheel®** (gotas, amp.)
Hiperacidez	**Gastheel®** (comp.) **Duoheel®** (comp.) **Erigotheel®** (amp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Hiperactividad	**Valheel®** (gotas) **Gels Homaccord®** (gotas, amp.) **Ner Heel®** (comp.)
Hiperactividad en niños	**Viburcol®** (sup.)
Hipercolesterolemia (véase Colesterol, aumento del)	
Hiperemesis	**Omittusheel®** (gotas) **Gastheel®** (comp.) **Chelccord®** (gotas, amp.) **Spascupreel®** (comp., amp.) **Spascupreel S®** (sup.)
Hiperexcitación (véase también Hiperactividad)	**Valheel®** (gotas.) **Ner Heel®** (comp.) **Viburcol®** (sup.)
Hiperhidrosis	**Schwef-Heel®** (gotas) **Phosphaccord®** (gotas, amp.) **Abropernol N®** (comp.) **Psoriheel®** (gotas) **Psorinoheel N®** (amp.) **Galheel®** (gotas, amp.) **Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Cuticom®** (amp.) **Hepaheel®** (amp.) **Soliheel®** (amp.)
Hiperqueratosis	**Abropernol N®** (comp.)
Hipertensión arterial	**Meliccord®** (gotas, amp.) **Rauwheel®** (amp.)
Hipertrofia amigdalar	**Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Dulcaccord®** (gotas, amp.) **Barijodeel®** (comp.) **Euphoheel®** (gotas, amp.)
Hipoacidez	**Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Galheel®** (gotas, amp.)
Hormonales, disfunciones (en hombres)	**Tesheel C®** (amp.)
Hormonales, disfunciones (en mujeres)	**Ovarheel®** (amp.) **Hormeel S®** (gotas, amp.)
Humedad, agravación de afecciones por la	**Dulcaccord®** (gotas, amp.) **Rhodoneel®** (gotas)
Ictericia obstructiva	**Chelccord®** (gotas, amp.)
Impétigo contagioso	**Mercureel®** (comp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Cuticom®** (amp.)
Impotencia viril	**Selaccord®** (gotas, amp.) **Tesheel C®** (amp.)
Incontinencia urinaria	**Planheel®** (gotas, amp.) **Sabheel®** (gotas, amp.) **Renheel®** (comp.) **Soliheel®** (amp.)

Induración plástica del pene	**Tesheel C®** (amp.) **Thyrheel®** (amp.)
Infarto de miocardio (estado posterior al)	**Cralonin®** (gotas, amp.) **Cactheel®** (gotas, amp.) **Carbocomp®** (amp.) **Stropheel®** (amp.) **Corcompo®** (amp.)
Infecciosas, enfermedades (estímulo defensas)	**Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Inflamaciones	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Heelarn®** (gotas) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Arniheel®** (pomada) **Hmelheel®** (pomada) **Kamillen®** (pomada)
Inflamaciones localizadas	**Belaccord®** (gotas, amp.) **Heelarn®** (gotas)
Inquietud de niños, estados de	**Viburcol®** (sup.)
Inquietud motora	**Valheel®** (gotas)
Insomnio	**Valheel®** (gotas) **Ner Heel®** (comp.)
Insuficiencia cardiaca latente (cuando aún no son necesarios los glucósidos cardiotónicos)	**Cralonin®** (gotas, amp.) **Corcompo®** (amp.) **Auheel®** (gotas) **Stropheel®** (amp.) **Cardiheel®** (comp.) **Cactheel®** (gotas, amp.)
Insuficiencia coronaria	**Cactheel®** (gotas, amp.) **Stropheel®** (amp.) **Cralonin®** (gotas, amp.) **Angio Heel®** (amp.) **Corcompo®** (amp.) **Crataegus-Heel S** (gotas) **Cardiheel®** (comp.)
Intertrigo	**Abropernol N®** (comp.) **Graf Homaccord®** (gotas, amp.) **Schwef-Heel®** (gotas) **Kamillen®** (pomada) **Cuticom®** (amp.)
Laringitis	**Phosphaccord®** (gotas, amp.) **Heelarn®** (gotas) **Tarephedreel®** (gotas) **Griheel®** (comp., amp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Linfático, sistema (estimulación del)	**Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Tonsi Heel®** (amp.)
Linfatismo (véase también Diátesis exudativa)	**Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Tonsi Heel®** (amp.) **Barijodeel®** (comp.) **Calcoheel®** (comp.)
Lumbago	**Colt Homaccord®** (gotas, amp.) **Ranuheel®** (gotas, amp.) **Cimiheel®** (gotas, amp.) **Cirheel®** (gotas) **Dulcaccord®** (gotas, amp.) **Spascupreel®** (comp., amp.) **Spascupreel S®** (sup.)
Lupus eritematoso	**Galheel®** (gotas, amp.)

	Psoriheel® (gotas) **Psorinoheel N®** (amp.) **Abropernol N®** (comp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp.) **Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Cirheel®** (gotas) **Cuticom®** (amp.) **Hepaheel®** (amp.)
Mamas, Erosión de (en madres lactantes)	**Kamillen®** (pomada)
Mastitis	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Mastodinia	**Cimiheel®** (gotas, amp.) **Ranuheel®** (gotas, amp.) **Ovarheel®** (amp.) **Placom®** (amp.) **Hormeel S®** (gotas, amp.) **Thyrheel®** (amp.)
Memoria, disminución de la	**Cerheel®** (amp.) **Barijodeel®** (comp.) **Selaccord®** (gotas, amp.)
Menopausia	**Klimakt Heel®** (comp.) **Hormeel S®** (gotas, amp.) **Ner Heel®** (comp.) **Gincompositum®** (gotas) **Metro-Adnex®** (amp.) **Ovarheel®** (amp.) **Cirheel®** (gotas)
Menorragia, **metrorragia**	**Cinnaheel®** (gotas, amp.) **Gynaheel®** (gotas)
	Ovarheel® (amp.)
Metabolismo mineral, regulación del	**Molybdan®** (comp.)
Meteorismo	**Gastheel®** (comp.) **Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Lepdra®** (gotas, amp.)
Metritis, parametritis, **endometritis,** **miometritis**	**Gynaheel®** (gotas) **Heelarn®** (gotas) **Apiccord®** (gotas, amp.) **Metro-Adnex®** (amp.) **Ovarheel®** (amp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Micosis cutánea (tratamiento complementario)	**Psoriheel®** (gotas) **Psorinoheel N®** (amp.) **Sulfeel®** (comp.) **Cuticom®** (amp.) **Graf Homaccord®** (gotas, amp.)
Micosis interdigital (tratamiento complementario)	**Cuticom®** (amp.) **Graf Homaccord®** (gotas, amp.) **Sulfeel®** (comp.) **Psoriheel®** (gotas) **Psorinoheel N®** (amp.)
Microsporia (véase también Micosis cutánea)	**Graf Homaccord®** (gotas, amp.) **Abropernol N®** (comp.) **Psoriheel®** (gotas) **Psorinoheel N®** (amp.) **Cuticom®** (amp.)
Migraña	**Spigelon®** (gotas, comp., amp.) **Gels Homaccord®** (gotas, amp.) **Psoriheel®** (gotas) **Psorinoheel N®** (amp.)

Miocardio, afecciones del	**Cralonin**® (gotas, amp.) **Corcompo**® (amp.) **Carbocomp**® (amp.) **Crataegus-Heel S** (gotas)
Miogelosis (véase también Reumatismo extraarticular)	**Spascupreel**® (comp., amp.) **Spascupreel S**® (sup.) **Cirheel**® (gotas) **Nerheum**® (amp.)
Mixedema	**Graf Homaccord**® (gotas, amp.) **Apiccord**® (gotas, amp.) **Galheel**® (gotas, amp.) **Strumeel F**® (gotas) **Thyrheel**® (amp.)
Mononucleosis	**Lymphomyosot**® (gotas, comp., amp.) **Belaccord**® (gotas, amp.) **Mercureel**® (comp.) **Heelarn**® (gotas) **Engystol**® (comp., amp.) **Trameel S**® (gotas, comp., amp.) **Echicomp**®, **Echiheel F**® (amp.)
Mucosas, afecciones a las	**Mucs Heel**® (amp.) **Lamioflur**® (gotas) **Natheel**® (gotas, amp.)
Muñones, dolores en	**Calheel**® (pomada) **Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) **Cirheel**® (gotas)
Náuseas	**Omittusheel**® (gotas)
Nefrolitiasis	**Berbaccord**® (gotas, amp.) **Renheel**® (comp.)
	Popucompositum® (gotas) **Soliheel**® (amp.) **Atropeel**® (amp.) **Spascupreel**® (comp., amp.) **Spascupreel S**® (sup.)
Nefrosclerosis	**Albumoheel**® (comp.) **Barijodeel**® (comp.) **Soliheel**® (amp.)
Nefrosis	**Albumoheel**® (comp.) **Renheel**® (comp.) **Soliheel**® (amp.) **Berbaccord**® (gotas, amp.) **Apiccord**® (gotas, amp.)
Neoplasias (tratamiento biológico complementario)	**Vischeel Medium**® (amp.) **Viheel F**® (amp.) **Cochicom Mite**® (amp.) **Causheel**® (gotas, amp.) **Gincompositum**® (gotas) **Molybdan**® (comp.) **Podyllum**® (gotas, amp.) **Proinum**® (amp.) **Pulcom**® (amp.) **Thal Heel**® (amp.) **Thyrheel**® (amp.) **Tonsi Heel**® (amp.) **Cymeheel**® (amp.) **Ubicheel**® (amp.)
Neumonía (tratamiento complementario)	**Bryaconeel**® (comp.) **Acoheel**® (gotas, amp.) **Phosphaccord**® (gotas, amp.) **Auheel**® (gotas) **Griheel**® (comp., amp.)
Neuralgias	**Gels Homaccord**® (gotas, amp.)

	Colt Homaccord® (gotas, amp.) **Ranuheel®** (gotas, amp.) **Bryaconeel®** (comp.) **Spigelon®** (gotas, comp., amp.) **Nerheum®** (amp.) **Rhodoneel®** (gotas) **Cimiheel®** (gotas, amp.) **Disheel®** (amp.)
Neuralgias intercostales	**Ranuheel®** (gotas, amp.) **Dulcaccord®** (gotas, amp.) **Colt Homaccord®** (gotas, amp.) **Disheel®** (amp.) **Nerheum®** (amp.)
Neurastenia	**Valheel®** (gotas) **Selaccord®** (gotas, amp.)
Neurosis climatérica	**Klimakt Heel®** (comp.) **Ner Heel®** (comp.) **Metro-Adnex®** (amp.)
Nevus	**Psoriheel®** (gotas) **Psorinoheel N®** (amp.) **Galheel®** (gotas, amp.) **Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Cuticom®** (amp.)
Obesidad	**Graf Homaccord®** (gotas, amp.) **Strummel T®** (comp.) **Strumeel F®** (gotas) **Hormeel S®** (gotas, amp.) **Thyrheel®** (amp.)
Ocena	**Euphoheel Compositum®** (nebulizador nasal)
Osteocondrosis	**Chinccord®** (gotas, amp.)
	Colt Homaccord® (gotas, amp.) Principalmente en la columna lumbar **Gels Homaccord®** (gotas, amp.) **Cimiheel®** (gotas, amp.) Principalmente en la columna cervical **Disheel®** (amp.) **Zeel T®** (comp., amp., pomada) **Nerheum®** (amp.) **Thyrheel®** (amp.)
Osteomalacia	**Galheel®** (gotas, amp.) **Calcoheel®** (comp.) **Osteoheel S®** (comp.) **Ovarheel®** (amp.) **Tesheel C®** (amp.)
Osteomielitis	**Trameel S®** (gotas, comp., amp.) **Heelarn®** (gotas) **Mercureel®** (comp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Otitis externa	**Mercureel®** (comp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp. pomada) **Psoriheel®** (gotas) **Psorinoheel N®** (amp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Otitis media	**Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Heelarn®** (gotas) **Belaccord®** (gotas, amp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp.) **Viburcol®** (sup.)
Ovárica, disfunción	**Ovarheel®** (amp.) **Gynaheel®** (gotas)

Pancreatopatías	**Ceanheel®** (gotas, amp.) **Lepdra®** (gotas, amp.) **Momorheel®** (amp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Parametritis	**Metro-Adnex®** (amp.) **Gynaheel®** (gotas) **Ovarheel®** (amp.)
Parkinson, enfermedad de	**Galheel®** (gotas, amp.) **Gels Homaccord®** (gotas, amp.) **Belaccord®** (gotas, amp.) **Cerheel®** (amp.) **Atropeel®** (amp.)
Parodontosis, **parodontitis**	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada)
Periartritis	**Kalheel®** (gotas, amp.) **Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada)
Periartritis **escapulohumeral**	**Zeel T®** (comp., amp., pomada) **Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Ferrheel®** (gotas, amp.) **Nerheum®** (amp.)
Periostitis	**Kalheel®** (gotas, amp.) **Osteoheel S®** (comp.) **Belaccord®** (gotas, amp.) **Rhodoneel®** (gotas)
Pie de fumador	**Cirheel®** (gotas) **Placom®** (amp.)
Piel, enfermedades de (véase también diagnósticos específicos)	**Cuticom®** (amp.) Como agente terapéutico básico **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) Para estimular los mecanismos de defensa
Pielitis, pielonefritis	**Cantheel®** (amp.) **Renheel®** (comp.) **Berbaccord®** (gotas, amp.) **Belaccord®** (gotas, amp.) **Soliheel®** (amp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Piodermia	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Schwef-Heel®** (gotas) **Calheel®** (pomada)
Pirosis	**Gastheel®** (comp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Plétora	**Meliccord®** (gotas, amp.) **Nux Homaccord®** (gotas, amp.) **Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.)
Pleuresía	**Bryaconeel®** (comp.) **Ranuheel®** (gotas, amp.) **Apiccord®** (gotas, amp.) **Acoheel®** (gotas, amp.) **Husteel®** (gotas)
Poliartritis **crónica primaria**	**Rhodoneel®** (gotas) **Rheutheel®** (comp.) **Galheel®** (gotas, amp.) **Zeel T®** (gotas, amp., pomada) **Bryaconeel®** (comp.)

Postoperatorio, tratamiento	**Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada)
Proctitis	**Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) **Nux Homaccord**® (gotas, amp.) **Veraccord**® (gotas, amp.)
Próstata, adenoma de (estadío inicial)	**Sabheel**® (gotas, amp.) **Popucompositum**® (gotas) **Soliheel**® (amp.)
Prostatitis	**Popucompositum**® (gotas) **Sabheel**® (gotas, amp.) **Belaccord**® (gotas, amp.) **Soliheel**® (amp.)
Prurito	**Mezeheel**® (gotas, amp.)
Psicosis	**Nerinjeel**® (amp.) **Ner Heel**® (comp.) **Cerheel**® (amp.) **Gels Homaccord**® (gotas, amp.) **Gincompositum**® (gotas) **Ign Homaccord**® (gotas, amp.)
Queloides	**Graf Homaccord**® (gotas, amp.) **Galheel**® (gotas, amp.) **Cuticom**® (amp.)
Quemaduras (grados 1.° y 2.°)	**Trameel S**® (gotas, comp., amp. pomada) **Heelarn**® (gotas) **Causheel**® (gotas, amp.) **Calheel**® (pomada) **Kamillen**® (pomada) **Cuticom**® (amp.)
Quemaduras solares	**Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) **Causheel**® (gotas, amp.) **Kamillen**® (pomada)
Quincke, edema de (tratamiento complementario)	**Apiccord**® (gotas, amp.) **Belaccord**® (gotas, amp.) **Psoriheel**® (gotas) **Psorinoheel N**® (amp.) **Cuticom**® (amp.) **Engystol**® (comp., amp.)
Rendimiento físico e intelectual, disminución del	**Gincompositum**® (gotas) **Proinum**® (amp.) **Cerheel**® (amp.) **Toni Inj**® (amp.)
Repolarización energética, tratamiento de	**Echicomp**®, **Echiheel F**® (amp.) **Engystol**® (comp., amp.) **Galheel**® (gotas, amp.) **Psoriheel**® (gotas) **Psorinoheel N**® (amp.) **Proinum**® (amp.)
Resfriado común (Rinitis aguda)	**Euphoheel Compositum**® (nebulizador nasal) **Nasheel**® (gotas)
Resfriados (véase Gripe y resfriados)	
Reumáticas, enfermedades	**Zeel T**® (comp., amp., pomada) Artrosis, poliartrosis **Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) En estados inflamatorios **Disheel**® (amp.) Osteocondrosis **Bryaconeel**® (comp.) Neuralgias

Chinccord® (gotas, amp.)
Osteocondrosis
Cimiheel® (gotas, amp.)
Osteocondrosis, especialmente en la columna cervical
Colt Homaccord® (gotas, amp.)
Neuralgias, osteocondrosis, especialmente en la columna lumbar
Dulcaccord® (gotas, amp.)
Agravación de las afecciones en tiempo húmedo
Ferrheel® (gotas, amp.)
Síndrome hombro-brazo
Gels Homaccord® (gotas, amp.)
Síndrome cervical
Lithimeel® (comp.)
Diátesis reumático-gotosa
Nerheum® (amp.)
Reumatismo de partes blandas
Osteoheel S® (comp.)
Periostitis
Placom® (amp.)
Para estimular la circulación periférica
Ranuheel® (gotas, amp.)
Neuralgias intercostales
Rheutheel® (comp.)
Reumatismo de partes blandas
Rhodoneel® (gotas)
Reumatismo de partes blandas, especialmente cuando se presentan agravaciones en tiempo húmedo y lluvioso
Spascupreel® (comp., amp.)
Spascupreel S® (sup.)
Espasticidad de la musculatura estriada
Tonsi Heel® (amp.)
Como estimulante del sistema linfático

Reumatismo extraarticular
Trameel S® (gotas, comp., amp., pomada)
Rheutheel® (comp.)
Nerheum® (amp.)
Rhodoneel® (gotas)
Dulcaccord® (gotas, amp.), o también
Arniheel® (pomada)

Revitalización
Gincompositum® (gotas)
Proinum® (amp.)
Cerheel® (amp.)
Tesheel C® (amp.)
Ovarheel® (amp.)

Rinitis
(vírica, bacteriana, alérgica)
Euphoheel® (gotas, amp.)
Euphoheel Compositum® (nebulizador nasal)
Echicomp®, **Echiheel F®** (amp.)
Engystol® (comp., amp.)
Nasheel® (gotas)
Luffheel® (gotas nasales)
Luaheel® (comp.)

Rinitis alérgica
estacional
(para mejorar la respiración nasal)
Luffheel® (gotas nasales)
Luaheel® (comp.)
Euphoheel® (gotas, amp.)
Euphoheel Compositum® (nebulizador nasal)
Mucs Heel® (amp.)

Rinitis atrófica
(tratamiento complementario)
Euphoheel® (gotas, amp.)
Euphoheel Compositum® (nebulizador nasal)
Mucs Heel® (amp.)

Riñón y vejiga,
afecciones de
Soliheel® (amp.)
Popucompositum® (gotas)

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

	Cantheel® (amp.) **Renheel®** (comp.)
Ronquera	**Phosphaccord®** (gotas, amp.)
Sabañones	**Abropernol N®** (comp.) **Cirheel®** (gotas)
Salpingitis	**Gynaheel®** (gotas)
Síndrome cervical	**Gels Homaccord®** (gotas, amp.) **Cimiheel®** (gotas, amp.)
Síndrome de Cushing	**Hormeel S®** (gotas, amp.) **Graf Homaccord®** (gotas, amp.) **Galheel®** (gotas, amp.) **Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Ovarheel®** (amp.) **Tesheel C®** (amp.)
Síndrome del "dumping"	**Anacheel®** (gotas, amp.) **Selaccord®** (gotas, amp.) **Duoheel®** (comp.) **Spascupreel®** (comp., amp.) **Spascupreel S®** (sup.)
Síndrome epigástrico	**Ceanheel®** (gotas, amp.) **Lepdra®** (gotas, amp.) **Momorheel®** (amp.)
Síndrome gastrocardiaco	**Ceanheel®** (gotas, amp.) **Spascupreel®** (comp., amp.) **Spascupreel S®** (sup.) **Duoheel®** (comp.) **Gastheel®** (comp.) **Mucs Heel®** (amp.) **Lepdra®** (gotas, amp.) **Corcompo®** (amp.)
	Erigotheel® (amp.)
Síndrome hombro-brazo	**Ferrheel®** (gotas, amp.) **Zeel T®** (comp.,amp. pomada) **Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada)
Sinusitis	**Euphoheel®** (gotas, amp.) **Euphoheel Compositum®** (nebulizador nasal) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Lamioflur®** (gotas) **Mucs Heel®** (amp.)
Sordera del oído interno	**Galheel®** (gotas, amp.) **Graf Homaccord®** (gotas, amp.) **Barijodeel®** (comp.) **Cirheel®** (gotas) **Placom®** (amp.)
Supuración de las bolsas gingivales	**Trameel S®** (gotas, comp., amp. pomada) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Supuraciones	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Mercureel®** (comp.)
Supuraciones, fístulas	**Cruroheel®** (comp.) **Lamioflur®** (gotas) **Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.)
Telangiectasias	**Artheel®** (gotas) **Hamaccord®** (gotas, amp.) **Hmelheel®** (pomada) **Cirheel®** (gotas)

Tendosinovitis	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Kalheel®** (gotas, amp.) **Heelarn®** (gotas)
Tinnitus aurium (véase Acufenos)	
Tiroidea, disfunción	**Thyrheel®** (amp.) **Strummel T®** (comp.) **Strumeel F®** (gotas) En casos de bocio parenquimatoso (difuso juvenil), también como profilaxis **Glonheel®** (gotas, amp.) Taquicardia, particularmente en casos de hipertiroidismo
Tos (véanse también diagnósticos específicos como bronquitis, etc.)	**Husteel®** (gotas) **Tarephedreel®** (gotas) **Atropeel®** (amp.) **Dros Homaccord®** (gotas, amp.) **Bronheel®** (comp.)
Tos ferina	**Dros Homaccord®** (gotas, amp.) **Droperteel®** (comp.) **Tarephedreel®** (gotas) **Husteel®** (gotas) **Atropeel®** (amp.)
Toxicosis focal	**Trameel S®** (gotas, comp., amp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Galheel®** (gotas, amp.) **Heelarn®** (gotas) **Hepeel®** (comp., amp.)
Traqueítis	**Phosphaccord®** (gotas, amp.) **Belaccord®** (gotas, amp.) **Tarephedreel®** (gotas) **Euphoheel®** (gotas, amp.) **Mucs Heel®** (amp.) **Echicomp®**, **Echiheel F®** (amp.) **Griheel®** (comp., amp.)
Traumatismos	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada)
Tromboflebitis	**Hamaccord®** (gotas, amp.) **Belaccord®** (gotas, amp.) **Heelarn®** (gotas) **Cirheel®** (gotas) **Trameel S®** (gotas, comp., amp. pomada)
Ulcera crural	**Cruroheel®** (comp.) **Cirheel®** (gotas) **Hamaccord®** (gotas, amp.) **Hepeel®** (comp., amp.) **Lymphomyosot®** (gotas, comp., amp.) **Placom®** (amp.)
Ulcera gastroduodenal	**Gastheel®** (comp.) **Duoheel®** (comp.) **Anacheel®** (gotas, amp.) **Erigotheel®** (amp.) **Mucs Heel®** (amp.)
Ulcera por decúbito	**Trameel S®** (gotas, comp., amp., pomada) **Cuticom®** (amp.) **Belaccord®** (gotas, amp.) **Kamillen®** (pomada) **Cirheel®** (gotas) **Placom®** (amp.)

Uretritis	**Popucompositum**® (gotas) **Mucs Heel**® (amp.) **Trameel S**® (gotas, comp., amp.)
Urinarias, vías (procesos inflamatorios en las)	**Renheel**® (comp.) **Soliheel**® (amp.) **Sabheel**® (gotas, amp.) **Popucompositum**® (gotas) **Berbaccord**® (gotas, amp.)
Urinarios, trastornos	**Popucompositum**® (gotas) **Sabheel**® (gotas, amp.) **Soliheel**® (amp.)
Urticaria	**Apiccord**® (gotas, amp.) **Belaccord**® (gotas, amp.) **Sulfeel**® (comp.) **Trameel S**® (pomada, gotas, amp., comp.) **Lymphomyosot**® (gotas, comp., amp.) **Cuticom**® (amp.)
Vaginitis	**Metro-Adnex**® (amp.) **Mucs Heel**® (amp.) **Trameel S**® (gotas, comp., amp.) **Lamioflur**® (gotas) **Gynaheel**® (gotas) **Echicomp**®, **Echiheel F**® (amp.)
Varices	**Aesheel**® (gotas) **Trameel S**® (gotas, comp., amp., pomada) **Hamaccord**® (gotas, amp.) **Hmelheel**® (pomada)
Vejiga irritable	**Planheel**® (gotas) **Sabheel**® (gotas, amp.)
Venosa, estasis	**Hamaccord**® (gotas, amp.) **Aesheel**® (gotas) **Hmelheel**® (pomada)
Vértigo (de diverso origen)	**Vertiheel**® (gotas, comp., amp.) **Coccuheel**® (gotas, amp.)
Vómito matutino	**Anacheel**® (gotas, amp.)
Vómitos (de diverso origen)	**Omittusheel**® (gotas) **Gastheel**® (comp.) **Chelccord**® (gotas, amp.) **Spascupreel**® (comp., amp.) **Spascupreel S**® (sup.)

Medicamentos homeopáticos simples o unitarios

En este apartado **se han excluido** los medicamentos alopáticos homeopatizados, los catalizadores intermediarios, los nosodes y los organopreparados-"suis" (se verán más adelante).

Los medicamentos que **se incluyen** son todos **los medicamentos más importantes de la homeopatía clásica.** Estos medicamentos se presentan en acordes de potencia (denominados con su nombre en latín y el sufijo **"Injeel",** acrónimo de "**Inj**ections H**eel**").

Los "**Injeel**" se componen de varias diluciones (potencias) de un mismo medicamento (acordes de potencias) y se presentan, salvo excepciones, en dos grados de concentración **Injeel** e **Injeel Forte**.

La diferencia entre las formas Injeel e Injeel forte de un mismo medicamento es la siguiente: la forma forte contiene una dilución (potencia) que es varios grados de dilución menor que la dilución más baja de la forma Injeel.

La metodología para la elección de estos medicamentos (ley de similitud), la elección de las diluciones (Injeel, Injeel forte), la dosificación y la frecuencia y forma de administración se describen en el apartado 1.3. y 1.4 de páginas anteriores.

La **presentación** de los medicamentos homeopáticos unitarios, en la forma de potencias balanceadas (Injeel e Injeel forte) es en cajas de 10 ampolletas.

Acidum carbolicum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Procesos sépticos y gangrenosos con secreción maloliente. Ulceras gástricas y duodenales. Dispepsia. Hiperemesis gravídica, leucorrea maloliente. Rágades, úlcera de decúbito, eccemas. Parestesias. Neuralgias.
Reacciones adversas: Alergia al fenol (ácido carbólico).

Acidum fluor-Injeel S: Acidum hydrofluoricum D 12, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades crónicas y subcrónicas. Eccema, prurito, varicosis. Ulcera crural. Escleroadenitis. Caries dental y ósea. Endurecimiento glandular.

Acidum formicicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Medicamento general de estimulación en asma, afecciones reumáticas, neuralgias, así como en todas las fases celulares.

Acidum nitricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Actúa sobre las mucosas y sobre la piel, especialmente en los puntos de transición entre piel y mucosas (boca, nariz, uretra, vulva y ano). Erupciones cutáneas en la frente, a lo largo de la línea del cabello. Dolores como si se hubiera astillado un hueso. Sudoración maloliente. Diátesis hemorrágica. Nefritis crónica.

Acidum phosphoricum-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.
Agotamiento físico y mental, pérdida de la memoria, sudores debilitantes. Diarreas indoloras. Agravación con el frío. Mejoría por el calor.

Acidum picrinicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados de agotamiento nervioso acompañados de lumbalgias con dolores de espalda, mialgias y artralgias. Neurastenia. Migraña. Agravación con el calor y esfuerzo mental.

Acidum uricum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos del metabolismo intermediario del ácido úrico. Experimentalmente también en caso de gota.

Aconitum-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados febriles con sensación de piel seca, frío interno ("como si se tuviera hielo en las venas"). Angina de pecho con ansiedad y sensaciones de estar cerca de la muerte (en estos casos no debe utilizarse la forma "forte"). Neuralgias. Reumatismo inflamatorio.

Actaea-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Artritis crónica primaria en los dedos de las manos y de los pies.

Aesculus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Aesculus-Injeel forte D 3, D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Congestión venosa, hemorroides, varices, parestesias, dolor sacrolumbar.

Agaricus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Sensibilidad al aire frío. Sensación de tener una masa incrustada en el epigastrio. Corea menor. Tics. Estados de excitación. Inquietud motora.

Agnus castus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Debilidad sexual, leucorrea indolora. Depresión mental.

Alkohol-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Intolerancia al alcohol.

Ammonium benzoicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Artritis úrica. Ascitis en caso de cirrosis hepática. Edemas.

Ammonium muriaticum-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tos y catarro, especialmente en casos de enfermedades hepáticas. Aquilodinia. Ciática que empeora al sentarse.

Ammonium phosphoricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Artritis y artrosis.

Apis-Injeel S: Apis mellifica D 12, D 30, D 200 ana partes.
Edemas pálidos, urticaria, dolores punzantes y ardientes. Formación de quistes (en el ovario derecho). Conjuntivitis. Irritación meníngea. Nefritis posterior a la escarlatina. Erisipela (especialmente en la cara). Amigdalitis (lado derecho). Derrames serosos en caso de pleuritis. Reumatismo con gran sensibilidad al contacto y a las vibraciones. Hipersensibilidad. Nerviosismo. Lengua aframbuesada y edematosa. Edema palpebral. Falta de sed. Sensibilidad al calor en cualquier forma. La sintomatología mejora con el frío y el aire fresco.

Aranea diadema-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Falta de calor corporal. Frío generalizado. El frío y la humedad agravan las afecciones. Constitución hidrogenoide. Neuralgias nocturnas del maxilar superior. Parestesias (del dedo anular e índice).

Argentum nitricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Melancolía, disminución de la memoria. Agorafobia. Dolores como si se tuviera un hueso astillado. Cefaleas que mejoran al colocarse un vendaje apretado. Faringitis, laringitis, ronquera, conjuntivitis, gastritis, úlcera gástrica, hemorragias gástricas. Enuresis.

Aristolochia clematitis-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estimula la cicatrización de heridas. Antiinflamatorio. Estasis venosa. Polaquiuria. Dismenorrea. Depresión antes de la menstruación. Amenorrea secundaria. Leucorrea. Eccema.

Arnica-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estimula la cicatrización de heridas. Fracturas, luxaciones, contusiones. Hematomas. Debilidad del miocardio. Neuralgias. Mialgias. Agravación con el contacto y el movimiento. Sensación de “estar molido”.

Arsenicum album-Injeel S D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.

Arsenicum album-Injeel forte S D 6, D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Trastornos que empeoran hacia la medianoche. Sensación de ardor, deseo de calor. Temor de no poder recobrar la salud. Flujo nasal acre y ardiente. Diarrea, gastritis. Sed insaciable (tomando únicamente pequeños sorbos de agua caliente). Adelgazamiento. Eccemas, dermatitis, urticaria con ardor, prurito, inquietud. Acné vulgar. Psoriasis. Pitiriasis. Liquen rojo plano. Glomerulonefritis. Nefrolitiasis con cólicos en lado derecho. Arritmia completa. Miocardosis. Anasarca. Conjuntivitis. Cefaleas. Arsenicum album es el medicamento indicado en aquellos casos en los que el agotamiento, ansiedad, inquietud y las depresiones dominan el cuadro clínico.

Arsenum jodatum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Asma bronquial. Medicación sintomática o coadyuvante en escrofulosis glandular y tuberculosis pulmonar. Tos seca e irritante. Sudoración nocturna.
Contraindicaciones: No se debe administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.

Arum maculatum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Faringitis, laringitis. Rinitis alérgica estacional. Síndrome bulbar (especialmente sialorrea). Rinofaringitis con sensación de dolor y ardor.

Asa foetida-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Asa foetida-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.

Globo histérico. Meteorismo y cólicos flatulentos con eructos explosivos. Ostealgias con sensibilidad al contacto.

Aurum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Aurum colloidale-Injeel D6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados hipertensivos (tensión alta, plétora), arterioesclerosis.

Aurum jodatum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Arterioesclerosis y otras indicaciones geriátricas. Aneurisma aórtico. Quiste ovárico. Miomas. Queratitis. Como medicamento complementario en ocena (rinitis atrófica).
Contraindicaciones: No se debe administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.

Avena sativa-Injeel D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Insomnio. Agotamiento nervioso. Se recomienda en todas las adicciones.

Baptisia-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.
Fiebre tifoidea con aturdimiento. Situaciones de sepsis. Estomatitis.

Baryum carbonicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Linfatismo, escrofulismo glandular. Sensibilidad al frío. Arterioesclerosis. Acufenos. Hipoacusia. Vértigo. Insomnio. Lipomas.

Belladonna-Injeel S D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Fases de reacción localizadas (rubor, tumor, calor, dolor). Sensibilidad cerebral con calambres y delirios. Cólicos biliares (necesidad de acostarse estirando todo el cuerpo).

Bismutum subnitricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Vómitos inmediatamente después de ingerir alimentos. Ulcera gástrica y duodenal, gastritis.

Borax-Injeel D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.

Borax-Injeel forte D 4, D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estomatitis aftosa. Diarreas estivales en lactantes. Psoriasis.

Bothrops lanceolatus-Injeel D 15, D 30, D 200 ana partes.
Hemorragias, trastornos del lenguaje.

Bryonia-Injeel S D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Inflamación de todas las serosas. Reumatismo inflamatorio. Hepatomegalia acompañada de sed intensa, lengua saburral.

Bufo-Injeel D 15, D 30, D 200 ana partes
Convulsiones. Eccemas con formación de vesículas.

Cadmium sulfuricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Gastralgia con ardor. Vómitos. También hematemesis.
Contraindicaciones: En caso de disfunción renal, sólo debe administrarse bajo prescripción médica.

Calcium carbonicum-Injeel: Calcium carbonicum Hahnemanni D 12, D 30, D 200 ana partes.
Adenopatías escrofulósicas. Sudores de la cabeza. Costra láctea. Enfermedades de las mucosas con tendencia a la formación de pólipos y ulceraciones.

Calcium fluoratum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Caries y fístulas óseas, tumefacción glandular (adenopatías de dureza pétrea).

Calcium phosphoricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Debilidad en niños subdesarrollados. Trastornos del metabolismo del calcio. Sensibilidad a la mínima corriente de aire.

Calcium sulfuricum-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Supuraciones (por ejemplo, furúnculos, piodermia, acné). Queratitis.

Cantharis-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Fuerte estranguria con dolor ardiente. Hidrofobia.

Carbo vegetabilis-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estomatitis y glositis aftosa. Meteorismo. Intolerancia al alcohol. Aversión a la leche y grasa. Disnea (deseo de abrir las ventanas). Asma. Enfisema. Colapso y fallo circulatorio, también, por ejemplo, en apoplejía cerebral. Piel helada, manos y pies fríos.

Causticum-Injeel S: Causticum Hahnemanni D 12, D 30, D 200 ana partes.
Quemaduras. Debilidad de la vejiga con dolor y ardor. Ronquera y resecación de la laringe (”como si estuviese en carne viva”). Verrugas duras y secas. Crujidos articulares.

Cepa-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Rinitis aguda y laringitis dolorosa, con agravación por el calor y mejoramiento al aire libre. Neuralgias faciales con epífora. Causalgias.

China-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.
Debilidad. Gran postración y debilidad con fuerte tendencia a sudar. Ardores y debilidad interescapular (enfermedad de Scheuermann). Anemia, sensibilidad al frío.

Cimicifuga-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.
Dolores que aparecen repentinamente y cambio rápido de la

sintomatología. Dolores de espalda o nuca que a través de la cabeza se irradian hasta las aletas nasales. Osteocondrosis, en particular de la columna dorsal y cervical. Neuralgias del nervio ciático. Menorragias.

Cina-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Niños tercos e inquietos. Contracciones espasmódicas. Tos ferina. Ojeras.

Cineraria maritima-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Cataratas seniles.

Clematis-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estrechez uretral, prostatitis, epididimitis. Eccemas vesiculosos muy irritados. Agravación al lavarse con agua fría.

Coffea-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Coffea-Injeel forte D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Hipersensibilidad. Inquietud. Insomnio. Hemicránea.

Conium-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.

Conium-Injeel forte S D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Mareos en cada cambio de posición. Disuria. Tos irritante, como si tuviera su origen en un sitio reseco de la laringe. Disminución de la memoria. Debilidad con temblor. Parálisis ascendentes. Nódulos indurados (dureza pétrea). Fases de neoformación. Medicamento geriátrico.

Crotalus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Hemorragias en todos los órganos y en todos los orificios naturales del cuerpo, enfermedades de Werlhof. Tendencia a la gangrena y septicemias.

Cuprum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Véase también Cuprum aceticum-Injeel. Acción especial en bronquios y a nivel del tracto gastrointestinal.

Curare-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Parálisis y estados de debilidad de la musculatura después de exceso de trabajo muscular. Disnea y mareos en caso de enfisema. Erupciones cutáneas escrofulosas, especialmente detrás de las orejas y en la cara.

Cyclamen-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Migrañas con trastornos de la visión. Catarro nasal. Dismenorrea. Pechos duros y tumefactos.

Cynara scolymus-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Tónico. Estimulación de la función detoxicante hepática y de la diuresis.

Damiana-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Impotencia, neurastenia.

Digitalis-Injeel D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Pulso débil y lento, cianosis (labios, lengua, etc.). Traumatismos por caídas. Náuseas. Hepatomegalia. Trastornos en la micción.

Echinacea angustifolia-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estímulo de las defensas mesenquimatosas. Procesos inflamatorios de diverso tipo y localización. Procesos sépticos.

Equisetum arvense-Injeel D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Cistitis. Cistopielitis. Nefrolitiasis. Enuresis nocturna. Vejiga irritable.

Euphrasia-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Blefaroconjuntivitis. Catarro nasal con rinorrea y epífora. Quemosis. Fotofobia . Dacriocistitis.

Ferrum metallicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Anemia secundaria. Síndrome hombro-brazo (izquierdo). Vómitos y diarreas. Epistaxis.

Ferrum phosphoricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Fiebre y situaciones de inflamación. Síndrome hombro-brazo (derecho).

Formica rufa-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estimulante general en caso de reacciones alérgicas (por ejemplo, en asma bronquial, fiebre del heno, eccemas), afecciones reumáticas, neuralgias, además en todas las fases celulares.

Fucus vesiculosus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tumefacción glandular escrofulosa. Gota. Adiposis.
Contraindicaciones: No se debe administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.
Reacciones adversas: Puede aumentar un hipertiroidismo existente.

Galphimia-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Alergias. Asma. Rinitis vasomotora. Fiebre del heno. Dermatitis atópica.

Ginseng-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados de agotamiento de cualquier clase.

Glonoinum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Palpitaciones cardiacas que irradian hasta el cuello. Pulsaciones por todo el cuerpo, angina de pecho. Como coadyuvante en caso de insolación.

Graphites-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Graphites-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Piel seca y agrietada, también eccemas con costras amarillo miel. Eccema del conducto auditivo. Inflamación crónica de la parte externa del ojo. Orzuelos. Estreñimiento crónico (especialmente atónico).

Guajacum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Guajacum-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Procesos reumáticos en músculos, articulaciones y especial - mente en tendones. Angina folicular. Bronquiectasias.

Hamamelis-Injeel D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Estasis venosa. Varices. Tromboflebitis. Ulcera crural. Hemorroides. Hemorragias venosas.

Hekla lava-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Exostosis, especialmente en la mandíbula y en los pies (espolón calcáneo).

Heloderma-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Parálisis agitante (enfermedad de Parkinson). Neuralgias. Trastornos circulatorios y tendencia al colapso circulatorio con sudores fríos.

Hepar sulfuris-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tendencia a las supuraciones, especialmente en la piel y glándulas linfáticas (furúnculos, piodermitis, panadizos, flemones). Absceso amigdalar. Orzuelos. Hemicránea (especialmente derecha). Trastornos de la micción. Hipersensibilidad al frío y corrientes de aire.

Hirudo medicinalis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Púrpura hemorrágica, petequias, equimosis, tendencia a derrames sanguíneos.

Hydrastis-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Medicamento para las afecciones mucosas. Secreciones gruesas, viscosas, blanco amarillentas de todas las mucosas (nariz, senos paranasales, útero, vejiga, etc.). Estomatitis aftosa. Menorragia. Metrorragia. Hemorragias miomatosas.

Hydrocotyle asiatica-Injeel D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Eccemas escamosos y fuertemente pruriginosos. Psoriasis.

Hyoscyamus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados de confusión (delirium tremens, psicosis de Korsakoff). Trastornos epileptiformes. Muecas. Insomnio. Bruxismo. Hipo.

Hypericum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Lesiones nerviosas y cerebrales como, por ejemplo, conmoción cerebral. Dolores neurálgicos después de la lesión.

Ignatia-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.

Ignatia-Injeel forte S D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Respiración suspirante, no se logra respirar profundamente. Bostezos espasmódicos. Cambios de humor. Tendencia a llorar. Tos irritativa nerviosa. Globo histérico. Migrañas (mejora después de orinar).

Insektizid-Injeel (paratión) D 12, D 30, D 200 ana partes.
Dermatitis. Lesiones hepáticas después de intoxicaciones con tóxicos de aspersión (insecticidas, fungicidas, etc.).

Ipecacuanha-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Náuseas y vómitos (con la lengua limpia). Tos con náuseas. Hemorragias masivas. Conjuntivitis. Quemosis. Epífora.

Jodum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Adelgazamiento a pesar de un buen apetito. Bocio (se requiere dosificación individual). Bulimia, dolor por hambre. Catarro de todas las mucosas.
Contraindicaciones: No se debe administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.

Kalium arsenicosum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Nefrosis crónica. Eccemas crónicos. Psoriasis. Prurito con agravación por el calor y al desvestirse. Liquen rojo plano.

Kalium bichromicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Ulceraciones penetrantes, “como si la piel fuera perforada”. Secreciones espesas y viscosas de todas las mucosas. Catarro crónico de nariz, oído medio y conducto auditivo. (Poli-) sinusitis. Estomatitis aftosa y especialmente ulcerosa.
Reacciones adversas: En casos aislados, pueden aparecer reacciones cutáneas. En estos casos se debe consultar al médico.

Kalium bromatum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Pérdida de la memoria. Trastornos del lenguaje (se olvidan pa-

labras y sílabas), temblor de manos, intranquilidad. Acné pustuloso.

Kalium carbonicum-Injeel D 12, D 30, D 200, D1000 ana partes.
Antiasténico. Dolores de espalda (interescapulares). Debilidad miocárdica. Arritmia cardiaca. Tendencia a la sudoración.

Kalium jodatum-Injeel D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Rinitis con secreciones malolientes y acres de coloración verdosa. Esputos salados. Ostealgias nocturnas. Erupciones en el cuero cabelludo.
Contraindicaciones: No se debe administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.

Kalium phosphoricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Situaciones de agotamiento. Disminución de la memoria. Ulcera duodenal. Sensación de hambre después de haber comido bien. Lengua pastosa (color mostaza).

Kalium sulfuricum-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Inflamaciones de las mucosas con secreciones amarillentas (medicamento funcional según Schüssler).

Kalmia-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.
Punzadas cardiacas que irradian al brazo derecho (pero a veces también al izquierdo). Dolores reumáticos y neurálgicos, sobre todo en el lado derecho. Iritis reumática.

Kreosotum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Catarro de las mucosas con secreciones acres y malolientes, por ejemplo, en bronquitis (fétida), leucorrea. Prurito vulvar. Caries dental. Eccemas en la mano.

Lac caninum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Cambio de lugar diario de las afecciones, tanto en caso de cefaleas y migrañas como de amigdalitis. Resfriados con congestión nasal que cambia de lado. Dolores reumáticos erráticos en articulaciones, músculos y extremidades, incluso neuralgias. Mastopatías con marcada mastodinia (pre-) menstrual. Menstruación muy adelantada o que se presenta muy intensa. Agalactia de las puérperas, pero también en galactorrea durante la lactación. Secuelas de difteria. Gastritis con trastornos nerviosos del apetito; estreñimiento con tenesmo rectal, trastornos gástricos en caso de alergia a la leche. Lengua saburral con bordes rojos. Agravación con el frío (temblores en general) y por las mañanas durante los periodos. Mejoría al inclinarse hacia atrás (dolores dorsales y lumbares, dolores abdominales y dolores en el dedo índice).

Lachesis-Injeel S D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Despreocupación ante la agravación de la sintomatología. Las afecciones empeoran con el calor del sol. Locuacidad, desconfianza, sensación de ser envenenado. Sofocos, con la sensación de llevar la ropa demasiado pequeña. La lengua tiembla al extenderla. Cara amarillenta con las venas pronunciadas. Sensación de globo. Amigdalitis con tumefacción rojo azulada. Medicamento que actúa sobre el lado izquierdo del cuerpo.

Ledum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Reumatismo articular crónico y agudo, reumatismo muscular. Gota. Mejoría por el frío o el agua fría.

Lilium tigrinum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Ptosis uterina. Dismenorrea. Trastornos cardiacos nerviosos con sensación de ansiedad. Pulsaciones de las arterias por todo el cuerpo.

Lithium carbonicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Artritis reumatoide. Diátesis reumática y gotosa. Cefalea (mejora al comer algo).

Lycopodium-Injeel S D 8, D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Enfermedades de los conductos hepáticos y vesiculares con falta de apetito o bulimia y sensación de estar saciado con sólo comer un poco. Meteorismo. Palidez facial con tinte amarillento. Diátesis úrica. Amigdalitis (inicialmente derecha). Los pacientes se vuelven desconfiados, suspicaces y susceptibles.

Magnesium carbonicum-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Catarro gastrointestinal con diarreas ácidas (”olor ácido de todo el cuerpo del niño”). Gran nerviosismo e inquietud corporal. Las afecciones mejoran con el movimiento al aire libre.

Magnesium manganum phosphoricum-Injeel: Magnesium phosphoricum D 12, D 30, D 200, Manganum phosphoricum D 12, D 30, D 200 ana partes.
Las principales indicaciones son: acción catalítica de los oligoelementos, especialmente como apoyo al ciclo de Krebs.

Magnesium phosphoricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Diátesis espasmódica. Neuralgias. Afecciones dentales (niños). Dismenorrea.

Mercurius auratus-Injeel forte S D 10, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tumores glandulares indurados.
Reacciones adversas: En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras la administración del medicamento. En estos casos se debe consultar al médico.

Mercurius jodatus flavus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Amigdalitis, angina lateral (especialmente de origen vírico). Anexitis.
Contraindicaciones: En caso de enfermedades tiroideas, no debe utilizarse sin consultar al médico.
Reacciones adversas: Tras la administración del medicamento es posible la aparición de sialorrea, ante la cual debe suspenderse su utilización.

Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Supuraciones. Abscesos. Gingivitis. Estomatitis. Catarro nasofaríngeo. Catarro paranasal. Colangitis.
Reacciones adversas: En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras la administración del medicamento. En estos casos se debe consultar al médico.

Mercurius sublimatus corrosivus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Las mismas indicaciones que Mercurius solubilis Hahnemanni-Injeel, pero sobre todo en caso de síntomas especialmente agudos y afecciones muy severas, dado que actúa muy rápidamente.
Reacciones adversas: En casos aislados, puede aparecer un aumento de la salivación tras la administración del medicamento. En estos casos se debe consultar al médico.

Muira puama-Injeel D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Afrodisíaco. Tonificante del sistema nervioso central.

Myristica sebifera-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Myristica sebifera-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Inflamaciones del tejido conjuntivo como, por ejemplo, flemones, abscesos, furúnculos, linfadenitis (este medicamento contribuye a "deshacer" rápidamente este tipo de inflamaciones, por lo que se le llama el "bisturí de la homeopatía").

Natrium choleinicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Hepatopatías con y sin ictericia. Gastroenteritis crónica. Dolores en la nuca.

Natrium muriaticum-Injeel: Natrium chloratum D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Rinitis vasomotora. Rinitis alérgica estacional (fiebre del heno). Tricofitosis ungueal. Acné especialmente en la línea frontal del cabello. Rágades en la nariz, boca y ano. Irritabilidad nerviosa con hipersensibilidad a las influencias externas. Adelgazamiento a pesar de comer bien. Gran deseo de alimentos picantes y salados.

Natrium nitricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Asma. Disnea. Tendencia a las hemorragias. Coroiditis.

Natrium sulfuricum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Natrium sulfuricum-Injeel forte D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Agravación con tiempo húmedo (niebla). Asma. Crujidos articulares. Talalgia. Hepatopatías crónicas. Gastroenteritis.

Niccolum metallicum-Injeel D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Ronquera. Tos espasmódica. Epistaxis. Dismenorrea. Pancreatopatías.

Nux vomica-Injeel S D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Medicamento gastrointestinal y hepático. Consecuencias del abuso de estimulantes (alcohol, nicotina). Vómitos matutinos. Estreñimiento espasmódico. Hemorroides.

Oleander-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Afecciones anginosas con palpitaciones cardiacas. Cefaleas frontales e inquietud. Meteorismo. Debilidad y parálisis de las extremidades, especialmente de las piernas. Disminución de la memoria.

Paeonia officinalis-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Hemorroides. Fisura anal. Eccema anal.

Petroleum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Eccemas húmedos (detrás de las orejas). Sabañones. Acufenos. Mareos y náuseas (cinetosis). Aumento de la sudoración axilar y de los pies.

Phosphorus-Injeel S D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.

Phosphorus-Injeel forte S D 6, D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.

Medicamento parenquimatoso. Lesiones del parénquima hepático. Bronconeumonía. Diátesis hemorrágica. Enfermedad de Werlhof. Laringitis con ronquera (dolorosa). Glomerulonefritis con hematuria.

Phytolacca-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.
Amigdalitis con anillo linfático inflamado y de color rojo oscuro.

Platinum metallicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Situaciones de histeria. Depresiones. Globo histérico. Menorragias. Miomas sangrantes. Prurito vulvar. Parestesias.

Plumbum metallicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Nefrosclerosis. Albuminuria. Arterioesclerosis. Paresias con adelgazamiento. Atrofia muscular. Estreñimiento espasmódico.

Pulsatilla-Injeel S D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Afecciones erráticas (empeoran antes de la menstruación). Medicamento de las mucosas. Retraso de la menstruación. Dismenorrea. Congestiones venosas. Conjuntivitis. Pacientes femeninas deprimidas, lloran con facilidad, necesitan consuelo.

Quassia amara-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Hepatopatías. Colecistopatías. Pancreatopatías.

Rhododendron-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Poliartritis primaria crónica. Palpitaciones. Agravación de la sintomatología en tiempo lluvioso y durante las tormentas.

Rhus Tox-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.

Rhus Tox-Injeel forte S D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Reumatismo y neuralgias que empeoran en tiempo húmedo y frío, al mojarse y con el reposo; mejoran en tiempo seco y cálido y con el movimiento, por ejemplo, neuralgias intercostales y ciática. Dolores en las extremidades. Conjuntivitis. Parotiditis. Mastitis. Panadizo. Carbunco de coloración rojo oscura, tendencia a las supuraciones. Erisipela. Herpes zoster. Gran inquietud y debilidad.
Contraindicaciones (Injeel forte S): Hipersensibilidad a las plantas de la familia de las anacardiáceas.

Ruta-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Astenopía con ardor de los ojos y cefalea tras sobreesfuerzo de la vista. Consecuencias de contusiones. Gangliones en la articulación de la muñeca. Congestiones venosas.

Sabina-Injeel D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.

Sabina-Injeel forte D 4, D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Menorragia. Aborto inminente. Leucorrea. Dolores en las articulaciones de las manos y pies en caso de artritis y gota.

Scrophularia nodosa-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Inflamaciones y tumefacción de las glándulas linfáticas y mamas. Escrofulismo (especialmente en la región ocular). Eccemas.

Selenium-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Selenium-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Falta de concentración, falta de memoria, neurastenia (debilidad e irritabilidad). Debilidad sexual e incluso eyaculación precoz. Adenoma prostático (primer estadío) con goteo de orina.

Senega-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Catarro de vías respiratorias altas. Bronquitis seca. Bronquitis enfisematosa. Asma bronquial. Blefaroconjuntivitis con tendencia a la xeroftalmía. Dacriocistitis.

Sepia-Injeel D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Afecciones menopáusicas, agotamiento nervioso, depresiones, apatía. Inflamaciones crónicas del útero y anexos. Congestión portal. Granuloma anular. Helmintiasis. Exantemas papulosos, hiperhidrosis y sudoración maloliente. Coloración amarillenta de la cara. El calor agrava los síntomas, el frío y el movimiento los mejoran.

Silicea-Injeel D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.

Silicea-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Medicamento constitucional. Debilidad del tejido conjuntivo. Supuraciones agudas y crónicas. Niños raquíticos, distróficos, exudativos y escrofulósicos. Linfatismo. Otitis con supuraciones. Eccema del conducto auditivo. Piodermitis. Furunculosis. Sudoración nocturna ácida y maloliente. El calor mejora la sintomatología, el frío la agrava.

Spongia-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tos seca de tipo crupal. Laringitis. Adenopatías. Bocio coloide y parenquimatoso. Miocarditis, palpitaciones. Orquitis. Epididimitis.
Contraindicaciones: No se debe administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.

Staphisagria-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Irascibilidad, irritabilidad. Eccema del cuero cabelludo, alope-

cia. Orzuelos, blefaroconjuntivitis, dacriocistitis. Caries dental, periodontosis. Atonía gástrica y estreñimiento atónico. Consecuencias de heridas incisas, queloides.

Sticta-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Mucosas secas, como en caso de rinitis, laringo-faringitis, bronquitis, tos ferina. Artritis, especialmente de la rodilla.

Stramonium-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Delirio con locuacidad, inquietud, movimiento incesante. Estados maníacos, alucinaciones, estados epileptiformes y de corea. Delirium tremens de los dipsómanos. Convulsiones febriles.

Strontium carbonicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Artrosis. Luxaciones crónicas. Fístulas óseas. Afecciones cutáneas pustulosas. Mejoría del dolor de extremidades.

Sulfur-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.
Medicamento reactivo en todo tipo de enfermedades crónicas como, por ejemplo, en eccemas húmedos y pruriginosos, sudor axilar maloliente, prurito vulvar, sofocos, inflamación glandular escrofulósica, dificultades para conciliar y continuar el sueño. Pies calientes, sintiendo la necesidad de sacarlos fuera de la cama. Aspecto sucio como de no haberse lavado. Es característico el ardor y picor de la piel y mucosas, que empeora con el calor de la cama. Sulfur-Injeel debe - rá interponerse en todo el tipo de lesiones cutáneas, hepatopatías, catarro de las vías respiratorias altas y asma bronquial.

Sulfur jodatum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Medicamento de acción reabsorbente en todas las enfermedades de la piel, de las mucosas y glándulas linfáticas como, por ejemplo, en caso de acné vulgar, furunculosis, bronquitis (fétida), amigdalitis crónica e hiperplásica, inflamación de las glándulas linfáticas.
Contraindicaciones: No se debe administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.

Symphytum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Symphytum-Injeel forte D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Este medicamento es llamado “árnica de los huesos”. Para acelerar la formación del callo óseo en fracturas. Periostitis. También en causalgias y afecciones derivadas de muñones de amputación.

Tabacum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Colapso con palidez y sudor frío, temblores, miedo a la muerte. Espasmos vasculares. Migrañas. Neuralgias. Parestesias. Mareos.

Tanacetum vulgare-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Irritaciones nerviosas en caso de helmintiasis, por ejemplo, contracciones musculares involuntarias, tics, irritabilidad nerviosa y estados de intranquilidad en niños.

Tarantula-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Tarantula-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Inquietud motora con temblores y espasmos. Histeria. Dismenorrea. Hiperexcitabilidad sexual, por ejemplo, ninfomanía.

Tartarus stibiatus-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Bronquitis, (bronco-) neumonía. Enfisema pulmonar. Tos con flemas. Gastroenteritis. Afecciones cutáneas vesiculopustulosas, por ejemplo, varicela, urticaria crónica infantil, rubéola.

Thuja-Injeel S D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.

Thuja-Injeel forte S D 4, D 12, D 30, D 200, D 1000 ana partes.
Medicamento constitucional, especialmente en enfermedades con tendencia a procesos proliferativos como verrugas, condilomas, papilomas, pólipos, orzuelos. Sudoración maloliente. Hemicránea (especialmente en el lado frontal izquierdo). Dificultad en encontrar palabras y otros trastornos del lenguaje.

Urtica-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Dermatosis urticantes y pruriginosas. Diátesis úrica. Agalactia e hipogalactia, pero también galactorrea de las lactantes, incluyendo mastitis con mastodinia (Voisin).

Valeriana-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Valeriana-Injeel forte D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Situaciones de inquietud. Insomnio. Intranquilidad.

Veratrum-Injeel S D 12, D 30, D 200 ana partes.

Veratrum-Injeel forte S D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tendencia al colapso, estados de colapso con piel cianótica y fría, así como con sudoración helada. Psicosis, tendencia a la violencia. Gastroenteritis aguda. Calambres en la pantorrilla.

Vipera berus-Injeel D 15, D 30, D 200 ana partes.
(Trombo-) flebitis. Gangrena. Sensación de pesadez en las

piernas. Paresias. Debilidad cardiocirculatoria y diátesis hemorrágica especialmente en los orificios naturales del cuerpo. Trastornos del lenguaje.

Zincum metallicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Irritaciones del sistema nervioso central y periférico, como por ejemplo, pseudomeningitis, neuralgias, inquietud de las piernas, espasmos. Trastornos gastrointestinales de tipo nervioso. Trastornos nerviosos en la micción. Dismenorrea (menstruación copiosa y adelantada).

Zincum valerianicum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Insomnio nervioso. Inquietud motora, especialmente (por las noches) en las piernas, “piernas del conductor”, acroparestesias nocturnas.

Medicamentos simples o unitarios contenidos en los medicamentos compuestos

Abrotanum (abrótano) en Abropernol N®, Proinum®.
Absinthium (ajenjo) en Tanaheel®.
Acidum acetylosalicylicum (ácido acetilsalicílico) en Ubicheel®.
Acidum alpha-ketoglutaricum (ácido alfa-cetoglutárico) en Causheel®, Cymeheel®, Corcompo®, Cuticom®, Hepaheel ®, Syzyheel compositum®, Thyrheel®.
Acidum alpha-liponicum (ácido tioctánico) en Cymeheel®, Disheel®, Hepaheel®, Ubicheel®, Zeel T®.
Acidum ascorbicum (vitamina C) en Cymeheel®, Disheel®,Tesheel C®, Tonsi heel®, Ubicheel®.
Acidum benzoicum e resina (ácido benzoico) en Cirheel®,Heelarn®, Atropheel®, Atropinum compositum, Rhodoneel®.
Acidum cis-aconiticum (ácido cis-aconítico) en Cymeheel®, Ovarheel®.
Acidum citricum (ácido cítrico) en Cymeheel®.
Acidum formicicum (ácido fórmico) en Angio Heel®, Cuticom®.
Acidum fumaricum (ácido fumárico) en Causheel®, Cymeheel®, Corcompo®, Cuticom®, Hepaheel®, Thyrheel®.
Acidum hydrochloricum (ácido clorhídrico) en Podyllum®.
Acidum DL-malicum (ácido málico) en Cymeheel®, Corcompo®, Hepaheel®, Thyrheel®.
Acidum nitricum (ácido nítrico) en Abropernol N®, Galheel®, Hormeel S®, Lamioflur®, Peoneel®, Renheel®.
Acidum oroticum (ácido orótico) en Hepaheel®.
Acidum phosphoricum (ácido fosfórico) en Cerheel®, Cuticom®, Ner heel®, Nerinjeel®, Syzyheel compositum®.
Acidum picrinicum (ácido pícrico) en Altriheel®, Disheel®, Valheel®.
Acidum sarcolacticum (ácido láctico) en Corcompo®, Gincompositum®, Placom®, Stropheel®, Syzyheel compositum®, Thyrheel®, Tonsi heel®, Ubicheel®.
Acidum silicicum (ácido silícico) en Cruroheel®, Disheel®, Spigelon®, Strumeel T®, Zeel T®.
Acidum silicicum colloidale (ácido silícico coloidal) en Strumeel F®.
Acidum succinicum (ácido succínico) en Cymeheel®.
Acidum sulfuricum (ácido sulfúrico) en Syzyheel compositum®.
Aconitum (acónito) en Acoheel®, Barijodeel®, Bryaconeel®, Cerheel®, Echicomp®, Echiheel F®, Griheel®, Pectus-Heel, Rhodoneel®, Spascupreel®, Spascupreel S®, Stropheel®, Trameel S®.
Adenosinum triphosphoricum (ATP) (trifosfato de adenosina) en Cymeheel®, Gincompositum®, Thyrheel®, Ubicheel®.
Aesculus (castaño de Indias) en Cirheel®, Aesheel®, Cerheel®, Cuticom®, Disheel®, Placom®, Tonsi heel®.
Aethiops mineralis (mercurio negro) en Viseel®.
Aethusa (apio de perro) en Stropheel®, Omittusheel®, Vomitusheel S.
Agaricus (agárico) en Abropernol N®, Spascupreel®, Spascupreel S®.
Agnus castus (sauzgatillo) en Tesheel C®.
Ailanthus glandulosa (ailanto) en Mercureel®.
Alchemilla vulgaris (alquémila) en Lamioflur®.
Aletris farinosa (aletris farinosa) en Altriheel®.
Aloe (aloe) en Veraccord®.
Alumina (arcilla) en Lamioflur®, Renheel®.
Ambra (ámbar gris) en Cerheel®, Vertheel®.
Ammonium bituminosulfonicum (ictiol) véase en Ichthyolum.
Ammonium bromatum (bromuro amónico) en Gynaheel®, Spascupreel®, Spascupreel S®, Valheel®.
Ammonium carbonicum (carbonato amónico) en Nasheel®.
Ammonium chloratum (cloruro amónico) en Disheel®.
Anacardium (nuez de Malaca) en Anacheel®, Barijodeel®,Cerheel®, Duoheel®, Mucs heel®.
Anisum stellatum (anís estrellado) en Tarephedreel®.
Anthrachinonum (antraquinona) en Ubicheel®.
Antimonium crudum (trisulfuro de antimonio) en Gastheel®.
Apisinum (veneno de abeja) en Apiccord®, Ovarheel®, Soliheel®.
Apis mellifica (abeja melífera) en Cirheel®, Albumoheel®, Angeel®, Apiccord®, Heelarn®, Cruroheel®, Galheel®, Gynaheel®, Metro-Adnex®, Viseel®, Popucompositum®.
Apomorphinum hydrochloricum (hidrocloruro de apomorfina) en Omittusheel®, Vomitusheel S.
Aquilegia vulgaris (aquilegia) en Hormeel S®, Ovarheel®.

Aralia racemosa (nardo americano) en Luaheel®.
Aranea diadema (araña diadema) en Dulcaccord®, Lymphomyosot®, Osteoheel S®.
Arctium lappa (bardana) en Cuticom®.
Argentum (plata) en Circulo heel®, Disheel®, Galheel®.
Argentum nitricum (nitrato de plata) en Atropheel®, Atropinum Compositum S, Areel®, Duoheel®, Echicomp®, Echiheel F®, Euphoheel®, Euphoheel compositum®, Gastheel®, Momorheel®, Mucs heel®, Nerinjeel®, Pectheel®, Phosphaccord®, Soliheel®.
Arnica montana (árnica) en Cirheel®, Angeel®, Heelarn®, Arniheel®, Artheel®, Auheel®, Barijodeel®, Carbocomp®, Cardiheel®, Causheel®, Cerheel®, Corcompo®, Echicomp®, Echiheel F®, Pectheel®, Rauwheel®, Rheutheel®, Trameel S®, Zeel T®.
Arsenicum album (trióxido de arsénico) en Atropheel®, Atropinum Compositum S, Cantheel®, Causheel®, Circulo heel®, Corcompo®, Areel®, Echicomp®, Echiheel F®, Gastheel®, Lepdra®, Mezeheel®, Soliheel®, Stropheel®, Sulfeel®, Syzyheel compositum®.
Arsenicum iodatum (yoduro de arsénico) en Husteel®, Luaheel®, Tarephedreel®.
Artemisia vulgaris (artemisa) en Tanaheel®.
Arteria suis (arteria) en Cirheel®, Placom®.
Arum maculatum (aro) en Nasheel®.
Asa foetida (asa fétida) en Kalheel®, Osteoheel S®, Ypsiloheel®.
Asclepias tuberosa (asclepias) en Angio heel®, Ranuheel®, Rhodoneel®.
Asterias rubens (estrella de mar) en Lamioflur®.
Atropinum sulfuricum (sulfato de atropina) en Atropheel®, Atro-Pinum compositum S, Spascupreel®, Spascupreel S®.
Aurum chloratum natronatum (cloruro de oro-cloruro sódico) en Auheel®, Nasheel®.
Aurum iodatum (yoduro de oro) en Gynaheel®, Rauwheel®.
Aurum metallicum (oro) en Galheel®, Toni inj®.
Avena sativa (avena) en Hepaheel®, Nerinjeel®, Valheel®.
Bacillinum (Bacillinum-Nosode) en Psorinoheel N®.
Bacterium coli (Escherichia coli-Nosode) en Mucs heel®, Soliheel®.
Baptisia (índigo salvaje) en Cirheel®, Heelarn®, Atropheel®, Atropinum compositum S, Echicomp®, Echiheel F®, Popucompositum®, Soliheel®.
Barium carbonicum (carbonato bárico) en Barijodeel®, Placom®, Tonsi heel®.
Barium iodatum (yoduro bárico) en Cirheel®, Artheel®, Circulo Heel®.
Barium oxalsuccinicum (oxalsuccinato bárico) en Cymeheel®.
Bellis perennis (chirivita) en Trameel S®.
Belladonna (belladona) en Angeel®, Belaccord®, Bronheel®, Carbocomp®, Chelccord®, Husteel®, Chol Inj®, Mercureel®, Mucs heel®, Planheel®, Rauwheel®, Spigelon®, Tarephedreel®, Trameel S®, Viburcol®.
Berberis (agracejo) en Atropheel®, Atropinum compositum S, Berbaccord®, Disheel®, Popucompositum®, Proinum®, Renheel®, Soliheel®.
Beta vulgaris conditiva (beta) en Cymeheel®.
Betonica (betónica) en Tarephedreel®.
Betula alba (abedul) en Galheel®.
Bismutum kalium iodidum (tetrayodo bismutato potásico) en Psorinoheel N®.
Blatta orientalis (cucaracha) en Tarephedreel®.
Bothrops lanceolatus (Serpiente jararacá) en Cerheel®.
Bovista (cuesco de lobo) en Ovarheel®.
Bryonia (brionia) en Heelarn®, Atropheel®, Atropinum compositum S, Bronheel®, Bryaconeel®, Echicomp®, Echiheel F®, Griheel®, Nux homaccord®, Rheutheel®, Spigelon®.
Bucco (hojas de Bucco) en Popucompositum®, Soliheel®.
Bufo (sapo) en Psorinoheel N®.
Bursa pastoris véase en Thlaspi bursa pastoris.
Cactus (reina de la noche) en Angio heel®, Cactheel®, Cactus Compositum S, Cardiheel®, Corcompo®, Stropheel®.
Caladium seguinum (aro) en Sulfeer®, Tesheel C®.
Calcium carbonicum Hahnemanni (parte interna blanca de la concha de la ostra) en Calcoheel®, Circulo heel®, Graf homaccord®, Hepaheel®, Hormeel S®, Chol Inj®, Viburcol®.
Calcium fluoratum (floruro cálcico) en Abropernol N®, Cuticom®, Galheel®, Thyrheel®.
Calcium iodatum (yoduro cálcico) en Barijodeel®, Strumeel T®, Strumeel F®.
Calcium phosphoricum (fosfato cálcico) en Disheel®, Lymphomyosot®, Osteoheel S®, Tonsi heel®.

Calendula officinalis (caléndula) en Calheel®, Trameel S®.
Caltha palustris (hierba centella) en Galheel®.
cAMP (monofosfato de adenosina cíclico) en Thal heel®, Vischeel Medium®, Viheel F®.
Camphora (alcanfor) en Popucompositum®.
Cantharis (mosca española) en Atropheel®, Atropinum compositum S, Cantheel®, Popucompositum®, Renheel®, Soliheel®, Tesheel C®.
Capsicum annum (pimiento español) en Popucompositum®, Soliheel®, Sulfeel®.
Carbo vegetabilis (carbón vegetal) en Calcoheel®, Carbocomp®, Corcompo®, Cruroheel®, Droperteel®, Gastheel®, Lepdra®, Momorheel®, Stropheel®.
Carduus marianus (cardo mariano) en Hamaccord®, Hepaheel®, Hepeel®, Chol Inj®.
Cartilago suis (cartílago) en Disheel®, Zeel T®.
Castoreum sibiricum (castor siberiano) en Angio heel®, Cardiheel®.
Causticum Hahnemanni (mezcla de bisulfato potásico incinerado e hidróxido cálcico) en Barijodeel®, Causheel®, Husteel®, Nerheum®, Renheel®, Rheutheel®.
Ceanothus americanus (té de Nueva Jersey) en Ceanheel®, Momorheel®, Mucs heel®.
Cedron (cedro) en Klimakt-Heel®.
Cerebrum suis (cerebro) en Cerheel®.
Cerium oxalicum (oxalato ceroso) en Cymeheel®, Molybdan®.
Chamomilla (camomila) en Calcoheel®, Kamillen®, Spascupreel®, Spascupreel S®, Trameel S®, Valheel®, Viburcol®.
Chelidonium (celidonia) en Atropheel®, Atropinum compositum S, Chelccord®, Hepaheel®, Heepel®, Chol-Inj®.
Chenopodium anthelminticum (quenopodio) en Tanaheel®.
China (corteza de quina) en Cerheel®, Chinccord®, Disheel®, Gincompositum®, Hepaheel®, Hepeel®, Chol Inj®, Proinum®.
Chininum arsenicosum (arsenito de quinina) en Aletris heel, Toni Inj®.
Cholesterinum (colesterol) en Hepaheel®.
Cicuta virosa (cicuta) en Psorinoheel N®.
Cimicifuga (cimicifuga) en Cimiheel®, Disheel®, Gels homaccord®, Metro-Adnex®.
Cinnabaris (cinabrio) en Nasheel®.
Cinnamomum (canela) en Cinnaheel®.
Cistus canadensis (jara canadiense) en Nasheel®.
Clematis (clemátide) en Atropheel®, Atropinum compositum S, Galheel®.
Cobaltum gluconicum (gluconato de cobalto) en Molybdan®.
Cocculus (cóculo) en Altriheel®, Cerheel®, Coccuheel®, Vertheel®.
Coccus cacti (cochinilla) en Droperteel®, Tonsi heel®.
Cochlearia officinalis (coclearia) en Oculoheel® (colirio).
Coenzima A en Cymeheel®, Disheel®, Gincompositum®, Ubicheel®, Zeel T®.
Colchicum (cólquico) en Cirheel®, Heelarn®, Cochicom mite®, Areel®, Gincompositum®, Lithimeel®, Nerheum®, Thyrheel®, Ubicheel®, Omittusheel®, Vomitusheel S.
Colocynthis (coloquíntida) en Atropheel®, Atropinum compositum S, Berbaccord®, Colt homaccord®, Areel®, Disheel®, Hepeel®, Nerheum®, Nux homaccord®, Spascupreel®, Spascupreel S.
Colon suis (colon) en Hepaheel®.
Condurango (condurango) en Mucs Heel®.
Conium (cicuta) en Cerheel®, Colchicom mite®, Gincompositum®, Rauwheel®, Tesheel C®, Thyrheel®, Tonsi heel®, Ubicheel®, Vertheel®.
Convallaria majalis (convalaria) en Auheel®.
Cor suis (corazón) en Corcompo®, Tesheel C®.
Corpus pineale suis (epífisis) en Thal heel®, Thyrheel®.
Cortex glandulae suprarenalis suis (corteza de las glándulas suprarrenales) en Tonsi heel®.
Cortisonum aceticum (acetato de cortisona) en Cuticom®, Echicomp®, Echiheel F®, Pulcom®, Tesheel C®, Thyrheel®, Tonsi heel®.
Coxsackie-Virus A_9 (Coxsackie-Virus A_9-Nosode) en Soliheel®.
Crabro vespa (avispa) en Gynaheel®, Metro-Adnex®.
Crataegus oxyacantha (espino albar) en Angio heel®, Auheel®, Cactheel®, Cactus compositum, Corcompo®, Cralonin®, Crataegus-Heel S, Glonheel®, Meliccord®, Valheel®.
Cubeba (cubeba) en Popucompositum®.
Cucurbita pepo (calabaza) en Popucompositum®.

Cuprum (cobre) en Cirheel®.
Cuprum aceticum (acetato de cobre) en Atropheel®, Atropinum compositum S, Disheel®, Dros homaccord®, Husteel®.
Cuprum sulfuricum (sulfato de cobre) en Molybdan®, Placom®, Soliheel®, Spascupreel®, Spascupreel S®.
Curare (curare) en Circulo heel®, Syzyheel compositum®, Tesheel C®.
Cutis suis (piel) en Cuticom®.
Cyanocobalaminum (vitamina B_{12}) en Hepaheel®.
Cyclamen (ciclamen) en Hormeel S®.
Cynara scolymus (alcachofa) en Hepaheel®, Rauwheel®.
Cypripedium pubescens (zapatito de dama) en Hormeel S®, Ovarheel®.
Damiana (damiana) en Tesheel C®.
Diencephalon suis (diencéfalo) en Tesheel C®.
Discus intervertebralis suis (disco intervertebral) en Disheel®.
Drosera (drosera) en Droperteel®, Dros homaccord®.
Dulcamara (dulcamara) en Cirheel®, Angeel®, Heelarn®, Calcoheel®, Dulcaccord®, Rhodoneel®, Tonsi heel®, Viburcol®, Zeel T®.
Duodenum suis (duodeno) en Hepaheel®.
Echinacea angustifolia (equinácea de hojas estrechas) en Cirheel®, Heelarn, Belaccord®, Echicomp®, Echiheel F®, Galheel®, Mercureel®, Oculoheel®, Tonsi heel®,Trameel S®.
Echinacea purpurea (equinácea purpurea) en Trameel S®.
Embryo suis (embrión) en Causheel®, Cerheel®, Disheel®, Placom®, Tesheel C®, Tonsi heel®, Zeel T®.
Ephedra vulgaris (efedra) en Tarephedreel®.
Equisetum hyemale (cola de caballo) en Lymphomyosot®, Popucompositum®, Soliheel®.
Erigeron canadensis (erigeron) en Hormeel S®.
Erythraea centaurium (centáurea) en Erigotheel®.
Eucalyptus (eucalipto) en Acoheel®, Heelarn®.
Eupatorium cannabinum (canabina) en Cirheel®, Heelarn®.
Eupatorium perfoliatum (eupatorio) en Echicomp®, Echiheel F®, Griheel®.
Euphorbia cyparissias (lechetrezna) en Rhodoneel®.
Euphorbium (euforbia resinífera) en Echicomp®, Echiheel F®, Euphoheel®, Euphoheel compositum® gotas nasales.
Euphrasia officinalis (eufrasia) en Oculoheel®.
Fel tauri (vesícula de toro) en Chelccord®, Hepaheel®.
Ferrum fumaricum (fumarato férrico) en Molybdan®.
Ferrum iodatum (yoduro férrico) en Lymphomyosot®.
Ferrum metallicum (hierro metálico) en Ferrheel®, Nerheum®.
Ferrum muriaticum véase en Ferrum sesquichloratum.
Ferrum phosphoricum (fosfato férrico) en Ferrheel®, Lithimeel®, Rheutheel®, Tesheel C®, Tonsi heel®.
Ferrum sesquichloratum (cloruro férrico) en Ferrheel®.
Ferrum sulfuricum (sulfato férrico) en Ferrheel®.
Fucus vesiculosus (fucus) en Strumeel T®, Strumeel F®, Thyrheel®.
Fumaria officinalis (fumaria) en Lymphomyosot®.
Funiculus umbilicalis suis (cordón umbilical de Wharton Sulze) en Cuticom®, Disheel®, Placom®, Thyrheel®, Tonsi heel®, Zeel T®.
g-Strophanthinum (g-estrofantina) en Corcompo®.
Galium album (galio) en Galheel®.
Galium aparine (amor del hortelano) en Cochicom mite®, Cuticom®, Galheel®, Gincompositum®, Thyrheel®, Tonsi heel®, Ubicheel®.
Gelsemium (jazmín) en Cardiheel®, Cerheel®, Echicomp®,Echiheel F®, Gels homaccord®, Spascupreel®, Spascupreel S®, Spigelon®.
Gentiana lutea (genciana) en Lymphomyosot®, Tonsi heel®.
Geranium robertianum (hierba de San Roberto) en Lymphomyosot®, Tonsi heel®.
Geum urbanum (cariofilada) en Lamioflur®.
Ginseng (raíz del ginseng) en Gincompositum®, Proinum®, Tesheel C®.
Glandula lymphatica suis (glándula linfática) en Tonsi heel®.
Glandula suprarenalis suis (glándula suprarrenal) en Cuticom®, Disheel®, Tesheel C®, Thal heel®.
Glonoinum (nitroglicerina) en Angio heel®, Cactheel®, Cardiheel®, Corcompo®, Glonheel®, Stropheel®, Ypsiloheel®.
Glyoxal (aldehído oxálico) en Glyheel®.

Gnaphalium polycephalum (gnafalio) en Colt homaccord®, Disheel®, Nerheum®.
Graphites (grafito) en Graf homaccord®, Peoneel®.
Grippe-Nosode (Influenzinum-Nosode) en Echicomp®, Echiheel F®.
Hamamelis (hamamelis) en Abropernol N®, Cirheel®, Cinnaheel®, Cruroheel®, Hamaccord®, Hmelheel®, Peoheel®, Trameel S®.
Hedera helix (hiedra) en Galheel®.
Hekla lava (lava del volcán Hekla) en Osteoheel S®.
Helonias dioica (falsa raíz del unicornio) en Aletris-Heel, Gynaheel®, Toni Inj®.
Hepar suis (hígado) en Cerheel®, Corcompo®, Cuticom®, Hepaheel®, Rauwheel®, Syzyheel compositum®, Thyrheel®, Tonsiheel®.
Hepar sulfuris (hígado de azufre calcáreo) en Angeel®, Cantheel®, Cymeheel®, Echicomp®, Echiheel F®, Euphoheel®, Euphoheel compositum®, Mercureel®, Viseel®, Sabheel®, Soliheel®, Trameel S®.
Hepar sulfuris kalinum (sulfato potásico) en Lamioflur®.
Hepatica triloba (hepática) en Tarephedreel®.
Histaminum (histamina) en Causheel®, Hepaheel®, Luffheel®, Ubicheel®
Humulus lupulus (lúpulo) en Valheel®.
Hydrargyrum bichloratum (cloruro mercúrico) en Albumoheel®, Areel®, Echicomp®, Echiheel F®, Metro-Adnex®, Podyllum®, Popucompositum®, Soliheel®.
Hydrargyrum bicyanatum (cianuro mercúrico) en Angeel®.
Hydrastis (hidrastis) en Cochicom mite®, Gincompositum®, Lamioflur®, Mucs heel®, Nasheel®, Ovarheel®, Ubicheel®.
Hydrochinonum (hidroquinona) en Ubicheel®.
Hyoscyamus (beleño) en Bronheel®, Cerheel®.
Hypericum (hipérico) en Toni Inj®, Trameel S®, Valheel®.
Hypophysis suis (hipófisis) en Ovarheel®, Placom®.
Hypothalamus suis (hipotálamo) en Tonsi heel®.
Ichthyolum (bituminosulfonato amónico) en Cuticom®.
Ignatia (haba de San Ignacio) en Albumoheel®, Barijodeel®, Cerheel®, Corcompo®, Cuticom®, Hormeel S®, Ign homaccord®, Klimakt-Heel®, Ner heel®, Nerinjeel®, Planheel®, Podyllum®, Syzyheel compositum®, Omittusheel®, Vomitusheel S, Ypsiloheel®.
Iodum (yodo) en Anacheel®, Duoheel®, Momorheel®.
Ipecacuanha (ipecacuana) en Acoheel®, Anacheel®, Bronheel®, Duoheel®, Mucs heel®, Ovarheel®, Tarephedreel®, Omittusheel®, Vomitusheel S.
Juglans regia (nogal) en Lymphomyosot®.
Juniperus communis (enebro) en Galheel®.
Kalium asparaginicum (aspartato potásico) en Molybdan®.
Kalium bichromicum (dicromático potásico) en Cerheel®, Mucs heel®, Nasheel®.
Kalium bromatum (bromuro potásico) en Ner heel®, Valheel®.
Kalium carbonicum (carbonato potásico) en Altriheel®, Cactheel®, Cactus compositum, Cardiheel®, Corcompo®, Cralonin®, Disheel®, Droperteel®.
Kalium iodatum (yoduro potásico) en Osteoheel S®.
Kalium phosphoricum (fosfato potásico) en Barijodeel®, Cerheel®, Selaccord®, Toni Inj®.
Kalium picrinicum (picrato potásico) en Syzyheel compositum®, Tesheel C®.
Kalium sulfuratum véase en Hepar sulfuris kalinum.
Kalmia (laurel de montaña) en Corcompo®, Kalheel®, Rauwheel®.
Kreosotum (creosota) en Bronheel®, Gincompositum®, Lamioflur®, Mucs heel®, Ovarheel®, Popucompositum®, Syzyheel compositum®.
L-Cysteinum (cisteína) en Cymeheel®.
Lachesis (serpiente surucucú) en Carbocomp®, Ceanheel®, Droperteel®, Duoheel®, Echicomp®, Echiheel F®, Griheel®, Klimakt-Heel®, Mercureel®, Metro-Adnex®, Momorheel®, Mucs heel®, Ovarheel®, Ypsiloheel®.
Lamium album (ortiga blanca) en Lamioflur®.
Lapathum acutum (romaza) en Lamioflur®.
Latrodectus mactans (viuda negra) en Stropheel®.
Ledum (ledón) en Cuticom®, Disheel®, Rhodoneel®.
Lemna minor (lenteja de agua) en Nasheel®.
Leptandra (verónica de Virginia) en Lepdra®.
Levothyroxinum (L-tiroxina) en Lymphomyosot®, Tonsi heel®.
Lilium tigrinum (lirio) en Gynaheel®, Metro-Adnex®, Ovarheel®.

Lithium benzoicum (benzoato de litio) en Nerheum®, Rhodoneel®.
Lithium carbonicum (carbonato de litio) en Lithimeel®.
Lobelia inflata (lobelia) en Bronheel®, Luaheel®, Tarephedreel®.
Luffa operculata (lufa) en Euphoheel®, Euphoheel compositum® gotas nasales, Luffheel®, Luaheel®.
Lupulus (lúpulo) véase en Humulus lupulus.
Lycopersicum véase en solanum lycopersicum.
Lycopodium (licopodio) en Cruroheel®, Hepaheel®, Hepeel®, Chol Inj®, Metro-Adnex®, Momorheel®, Nux homaccord®, Rauwheel®, Syzyheel compositum®, Tesheel C®.
Lycopus virginicus (pie de lobo) en Glonheel®.
Magnesium asparaginicum (aspartato magnésico) en Molybdan®.
Magnesium gluconicum (gluconato magnésico) en Ubicheel®.
Magnesium oroticum (orotato magnésico) en Cymeheel®.
Magnesium phosphoricum (fosfato magnésico) en Cerheel®, Ovarheel®, Spascupreel®, Spascupreel S®, Tesheel C®.
Majorana (mejorana) en Hormeel S®.
Mandragora (mandrágora) en Momorheel®, Mucs heel®.
Manganum gluconicum (gluconato de manganeso) en Molybdan®.
Manganum phosphoricum (fosfato de manganeso) en Cerheel®, Cymeheel®, Tesheel C®, Ubicheel®.
Medorrhinum (Medorrhinum-Nosode) en Atropheel®, Atropinum compositum S, Cerheel®, Disheel®, Psorinoheel N®, Tarephedreel®.
Medulla ossis suis (médula ósea) en Disheel®, Thyrheel®, Tonsi heel®.
Melilotus officinalis (meliloto) en Carbocomp®, Gynaheel®, Meliccord®, Meliccord®, Nasheel®, Placom®, Rauwheel®, Spigelon®.
Melissa officinalis (melisa) en Valheel®.
Mercurialis perennis (mercurial perenne) en Heelarn®.
Mercurius bijodatus (yoduro mercúrico) en Euphoheel®, Euphoheel®, Nasheel®.
Mercurius iodatus flavus (yoduro mercúrico amarillo) en Vischeel medium® y Viheel F®.
Mercurius praecipitatus ruber (yoduro de mercurio rojo) en Cruroheel®, Disheel®, Kalheel®, Osteoheel®.
Mercurius solubilis Hahnemanni (mezcla que contiene esencialmente mercuroamidonitrato) en Cantheel®, Cuticom®, Mercureel®, Momorheel®, Ovarheel®, Tonsi heel®, Trameel S®.
Mercurius sublimatus corrosivus véase en Hydrargyrum bichloratum.
Methylglyoxal (metil glioxal) en Glyheel®.
Mezereum (dafne) en Lamioflur®, Mezeheel®, Sulfeel®.
Millefolium (milenrama) en Cinnaheel®, Trameel S®.
Momordica balsamina (momordica) en Momorheel®, Mucs heel®.
Moschus (secreción glandular del macho de la cabra almizclera) en Hormeel S®, Ign homaccord®, Ypsiloheel®.
Mucosa coli suis (mucosa del intestino grueso) en Mucs heel®.
Mucosa ductos choledochi suis (mucosa del colédoco) en Mucs heel®.
Mucosa duodeni suis (mucosa duodenal) en Mucs heel®.
Mucosa ilei suis (mucosa del segmento inferior del intestino delgado) en Mucs heel®.
Mucosa jejuni suis (mucosa del segmento superior del intestino delgado) en Mucs heel®.
Mucosa naris suis (mucosa nasal) en Mucs heel®.
Mucosa nasalis suis (mucosa nasal y paranasal) en Euphoheel®, Euphoheel compositum®.
Mucosa oculi suis (conjuntiva del ojo) en Mucs heel®.
Mucosa oesophagi suis (mucosa del esófago) en Mucs heel®.
Mucosa oris suis (mucosa oral) en Mucs heel®.
Mucosa pulmonis suis (mucosa de los bronquios) en Mucs heel®.
Mucosa pylori suis (mucosa de la región pilórica) en Mucs heel®.
Mucosa recti suis (mucosa del recto) en Mucs heel®.
Mucosa vesicae felleae suis (mucosa de la vesícula biliar) en Mucs heel®.
Mucosa vesicae urinariae suis (mucosa de la vejiga urinaria) en Mucs heel®.
Myosotis arvensis (nomeolvides) en Lymphomyosot®.
Myrtillus (arándano) en Ubicheel®.
Nadidum (NAD) (nicotinamida adenina dinucleótido) en Cymeheel®, Disheel®, Gincompositum®, Ubicheel®, Zeel T®.
Naja tripudians (serpiente de anteojos) en Corcompo®,Gynaheel®.
Naphthalinum (naftalina) en Tarephedreel®.
Naphthochinonum (naftoquinona) en Ubicheel®.
Nasturtium aquaticum (berro) en Lymphomyosot®.
Natrium bromatum (bromuro sódico) en Valheel®.

Natrium carbonicum (carbonato sódico) en Lamioflur®, Lithimeel®, Natheel®, Spigelon®.
Natrium chloratum (cloruro sódico) en Altriheel®, Natheel®, Viseel®, Psorinoheel N®.
Natrium choleinicum (colato sódico) en Syzyheel compositum®.
Natrium molybdaenicum (molibdato disódico) en Molybdan®.
Natrium muriaticum véase en Natrium chloratum.
Natrium nitrium (nitrato sódico) en Natheel®.
Natrium nitrosum (nitrito sódico) en Pectheel®.
Natrium oxalaceticum (oxalacetato sódico) en Causheel®, Cymeheel®, Corcompo®,Cuticom®, Disheel®, Gincompositum®, Hepaheel®, Mucs heel®, Thyrheel®, Ubicheel®, Zeel T®.
Natrium pyruvicum (piruvato sódico) en Cirheel®, Cymeheel®, Placom®, Soliheel®.
Natrium sulfuricum (sulfato sódico) en Lymphomyosot®, Osteoheel®, Syzyheel compositum®, Tarephedreel®.
Niccolum aceticum (acetato de níquel) en Molybdan®.
Niccolum metallicum (níquel) en Lepdra®.
Nicotinamidum (nicotinamida) en Cymeheel®, Disheel®, Ubicheel®.
Nux moschata (nuez moscada) en Albumoheel®, Hepeel®, Hormeel S®.
Nux vomica (nuez vomica) en Gastheel®, Lithimeel®, Mucs heel®, Nux homaccord®, Peoneel®, Toni Inj®, Omittusheel®, Vomitusheel S.
Oleander (adelfa) en Psorinoheel N®.
Ononis spinosa (gatuña) en Galheel®, Popucompositum®.
Origanum majorana véase en Majorana.
Origanum vulgare (orégano) en Erigotheel®.
Orthosiphon stamineus (té de java) en Popucompositum®, Soliheel®.
Ovarium suis (ovario) en Ovarheel®.
Oxalis acetosella (oxalis) en Mucs heel®.
Paeonia officinalis (peonia) en Peoneel®, Paeoheel®.
Palladium (paladio) en Gynaheel®.
Pankreas suis (páncreas) en Hepaheel®, Mucs heel®, Syzyheel compositum®.
Para-Benzochinonum (para-benzoquinona) en Ubicheel®.
Pareira brava (pareira brava) en Atropheel®, Atropinum composi - tum S, Renheel®, Soliheel®.
Paris quadrifolia (hierba de París) en Phosphaccord®, Ypsiloheel®.
Passiflora incarnata (pasionaria) en Spascupreel®, Spascupreel S®.
Petroleum (petróleo) en Abropernol N®, Coccuheel®, Duoheel®, Vertheel®.
Petroselinum (perejil) en popucompositum®.
Phloridzinum (floricina) en Syzyheel compositum®.
Phosphorus (fósforo) en Albumoheel®, Artheel®, Bryaconeel®,Echicomp®, Echiheel F®, Galheel®, Griheel®, Hepeel®, Lepdra®, Molybdan®, Mucs heel®, Nasheel®, Pectheel®, Phosphaccord®, Tesheel C®.
Phytolacca (hierba carmín) en Angeel®, Echicomp®, Echiheel F®, Mercureel®.
Pilocarpus jaborandi (pilocarpo) en Oculoheel®.
Pinus sylvestris (pino silvestre) en Lymphomyosot®.
Pix liquida (alquitrán vegetal) en Sulfeel®.
Placenta suis (placenta) en Cerheel®, Cuticom®, Ovarheel®, Placom®, Zeel T®.
Plantago major (llantén mayor) en Planheel®, Viburcol®.
Platinum metallicum (platino) en Gynaheel®, Lamioflur®, Nerinjeel®.
Plumbum aceticum (acetato de plomo) en Renheel®.
Plumbum jodatum (yoduro de plomo) en Angio heel®, Placom®.
Plumbum metallicum (plomo) en Syzyheel compositum®.
Podophyllum (podofilo) en Cochicom mite®, Areel®, Lepdra®, Momorheel®, Podophyllum®, Ubicheel®.
Populus tremuloides (álamo) en popucompositum®.
Procainum hydrochloricum (clorhidrato de procaína) en Proinum®.
Psorinum (Psorinum-Nosode) en Gincompositum®, Ner heel®, Psorinoheel N®, Tonsi heel®.
Pulsatilla (pulsátila) en Abropernol N®, Causheel®, Cymeheel®, Cruroheel®, Disheel®, Echicomp®, Echiheel F®, Euphoheel®, Euphoheel compositum®, Gastheel®, Gincompositum®, Hormeel S®, Metro-Adnex®, Mucs heel®, Ovarheel®, Pulcom®, Rhodoneel®, Thyrheel®, Tonsi heel®, Viburcol®,

Ypsiloheel®.
Pyelon suis (pelvis renal) en Soliheel®.
Pyridoxinum hydrochloricum (vitamina B_6)en Cymeheel®, Disheel®, Ubicheel®.
Pyrogenium (Pyrogenium-Nosode) en Cuticom®, Echicomp®, Echiheel F®, Galheel®, Soliheel®, Tonsi heel®.
Quassia amara (cuasi amarga) en Lepdra®.
Quebracho (quebracho) en Tarephedreel®.
Ranunculus bulbosus (ranúnculo) en Cardiheel®, Corcompo®, Disheel®, Ranuheel®.
Rauwolfia serpentina (rauwolfia) en Rauwheel®.
Ren suis (riñón) en Rauwheel®.
Rheum (ruibarbo) en Veraccord®.
Rhododendron (rododendro) en Rhodoneel®.
Rhus toxicodendron (hierba venenosa) en Cirheel®, Heelarn®, Echicomp®, Echiheel F®, Gels homaccord®, Lithimeel®, Nerheum®, Viseel®, Rheutheel®, Zeel T®.
Riboflavinum (vitamina B_2) Cymeheel®, Disheel®, Ubicheel®.
Robinia pseudacacia (robina) en Duoheel®.
Rubidium hydrochloricum (clorhidrato de rubidio) en Molybdan®.
Ruta (ruda) en Cirheel®, Cerheel®.
Sabal serrulatum (sabal) en Popucompositum®, Renheel®, Sabheel®.
Salpinx suis (oviducto) en Ovarheel®.
Sanguinaria canadensis (sanguinaria del Canadá) en Echicomp®, Echiheel F®, Klimakt-Heel®, Zeel T®.
Sanguinarinum nitricum (nitrato de sanguinaria) en Cuticom®.
Saponaria (jabonera) en Galheel®.
Sarsaparilla (zarzaparrilla) en Lymphomyosot®, Soliheel®.
Scilla (escila) en Apiccord®, Husteel®, Popucompositum®.
Scrophularia nodosa (escrofularia) en Lymphomyosot®, Popucompositum®.
Secale cornutum (cornezuelo del centeno) en Cirheel®, Artheel®, Circulo heel®, Disheel®, Placom®, Syzyheel compositum®.
Sedum acre (pampajarito) en Galheel®, Thyrheel®.
Selenium (selenio) en Cerheel®, Cuticom®, Selaccord®, Tesheel C®, Toni Inj®.
Sempervivum tectorum (siempreviva) en Galheel®, Gincompositum®, Thyrheel®.
Senecio fuchsii (senecio) en Hormeel S®.
Sepia (sepia) en Aletris-Heel®, Chinccord®, Disheel®, Hormeel S®, Klimakt-Heel®, Ner heel®, Nerinjeel®, Ovarheel®.
Serpyllum (Thymus serpyllum) (serpol) en Tanaheel®.
Silicea véase en Acidum silicicum.
Sinusitis-Nosode (nosode de sinusitis) en Euphoheel®, Euphoheel compositum®.
Solanum dulcamara véase en Dulcamara.
Solanum lycopersicum (tomate) en Heelarn®.
Solanum nigrum (hierba mora) en Cirheel®, Heelarn®, Artheel®, Circulo heel®, Placom®.
Solidago virgaurea (vara de oro) en Popucompositum®, Soliheel®.
Spartium scoparium (escobón) en Auheel®.
Spigelia anthelmia (espigelia) en Angio heel®, Cactheel® gotas, Cactheel®, Cardiheel®, Corcompo®, Cralonin®, Viseel®, Pectheel®, Spigelon®, Stropheel®.
Spiraea ulmaria (ulmaria) en Ferrheel®, Nerheum®, Rhodoneel®.
Splen suis (bazo) en Cuticom®, Thyrheel®, Tonsi heel®.
Spongia (esponja de mar) en Strumeel T®, Strumeel F®, Thyrheel®.
Stannum (estaño) en Klimakt-Heel®.
Staphisagria (estafisagria) en Viseel®.
Staphylococcinum (Staphylococcus-Nosode) en Echicomp®, Echiheel F®.
Stellaria media (alsina) en Rhodoneel®.
Sticta (líquen pulmonar) en Bronheel®, Nasheel®.
Stillingia sylvatica (estilingia) en Osteoheel S®.
Stramonium (estramonio) en Barijodeel®.
Streptococcinum (Streptococcus-Nosode) en Echicomp®, Echiheel F®.
Strontium carbonicum (carbonato de estroncio) en Cimiheel®.
Strophantus (estrofanto) en Placom®, Stropheel®.
Strychninum phosphoricum (fosfato de estricnina) en Tesheel C®.
Sulfur (azufre) en Cardiheel®, Causheel®, Cerheel®, Cymeheel®, Cuticom®, Disheel®, Echicomp®, Echiheel F®, Engystol®, Gincompositum®, Hepaheel®, Klimakt-Heel®, Luffheel®, Molyb-

dan®, Mucs heel®, Peoneel®, Psorinoheel N®, Pulcom®, Rauwheel®, Schwef-Heel®, Sulfeel®, Thyrheel®, Tonsi heel®, Ubicheel®, Zeel T®.
Symphytum (consuelda) en Trameel S®, Zeel T®.
Syzygium jambolanum (jambul) en Syzyheel compositum®.
Tabacum (tabaco) en Cirheel®, Heelarn®, Circulo heel®, Placom®, Stropheel®.
Tanacetum vulgare (tanaceto) en Tanaheel®.
Taraxacum (diente de león) en Hepaheel®, Chol Inj®.
Tartarus stibiatus (tartrato potásico antimónico) en Apiccord®, Bronheel®, Tarephedreel®, Tonsi heel®.
Terebinthina (aceite de trementina) en Albumoheel®, Popucompositum®, Soliheel®.
Testis suis (testículo) en Tesheel C®.
Teucrium scorodonia (escorodonia) en Lymphomyosot®.
Thalamus opticus suis (tálamo óptico) en Thal heel®.
Thallium sulfuricum (sulfato de talio) en Cuticom®.
Thiaminum (vitamina B_1) en Cymeheel®, Disheel®, Ubicheel®.
Thlaspi bursa pastoris (bolsa de pastor) en Hormeel S®.
Thryallis glauca (lluvia de oro) en Luffheel®.
Thuja (tuya) en Atropheel®, Atropinum compositum S, Cerheel®, Cuticom®, Echicomp®, Echiheel F®, Galheel®, Psorino heel N®, Spigelon®, Ypsiloheel®.
Thymus serpyllum véase en Serpyllum.
Thymus suis (glándula del timo) en Hepaheel®, Thyrheel®.
Thyreoidea suis (tiroides) en Thyrheel®.
Thyroxinum véase en Levothyroxinum.
Tonsilla suis (amígdala) en Tonsi heel®.
Tormentilla (tormentilla) en Areel®, Stropheel®, Veraccord®.
Toxicodendron quercifolium véase en Rhus toxicodendron.
Trichinoylum (inositol) en Ubicheel®.
Ubichinonum (ubiquinona) en Ubicheel®.
Ureter suis (uréter) en Soliheel®.
Urethra suis (uretra) en Soliheel®.
Urtica urens (ortiga menor) en Cuticom®, Galheel®, Popucompositum®.
Uterus suis (útero) en Ovarheel®.
Uva ursi (gayuba) en Popucompositum®.
Vaccininum (Vaccininum-Nosode) en Psorinoheel N®.
Valeriana (valeriana) en Auheel®, Nerinjeel®, Valheel®.
Vena suis (vena) en Placom®.
Ventriculus suis (estómago) en Mucs heel®.
Veratrum (vedegambre) en Albumoheel®, Atropheel®, Atropinum compositum S, Berbaccord®, Areel®, Hepaheel®, Hepeel®, Chol-Inj®, Momorheel®, Mucs heel®, Spascupreel®, Spascupreel S®, Stropheel®, Veraccord®.
Veronica (verónica) en Lymphomyosot®, Nasheel®.
Vesica fellea suis (vesícula biliar) en Hepaheel®.
Vesica urinaria suis (vejiga urinaria) en Soliheel®.
Viburnum opulus (viburno) en Gynaheel®, Hormeel S®.
Vinca minor (vinca) en Nasheel®.
Vincetoxicum hirundinaria (vincetósigo) en Engystol®, Engystol N.
Viola tricolor (violeta) en Lamioflur®.
Vipera berus (víbora) en Placom®.
Viscum album (muérdago) en Cirheel®, Artheel®, Gincompositum®, Proinum®, Rauwheel®, Thal heel®, Thyrheel®, Vischeel medium®, Viheel F®.
Vitamina B_1 véase en Thiaminum.
Vitamina B_2 véase en Riboflavinum.
Vitamina B_6 véase en Pyridoxinum hydrochloricum.
Vitamina B_{12} véase en Cyanocobalaminum.
Vitamina C véase en Acidum ascorbicum.

Zincum gluconicum (gluconato de cinc) en Molybdan®.
Zincum metallicum (cinc) en Disheel®, Echicomp®, Echiheel F®, Tesheel C®.
Zincum valerianicum (valerianato de cinc) en Ner heel®.

Introducción

Homeopatía

La homeopatía es un método científico de tratamiento médico el cual se orienta a la estimulación de los procesos curativos propios del cuerpo con miras a llegar a la curación de enfermedades. La homeopatía se basa en el descubrimiento de cómo una sustancia determinada es capaz de curar los síntomas que ella misma es susceptible de producir.

La palabra homeopatía se deriva etimológicamente del vocablo griego "**homoios**", que significa similar y de la palabra "**pathos**", que significa sufrimiento (enfermedad).

La ciencia de la homeopatía fué descubierta por el médico y químico alemán, Dr. Samuel Hahnemann, a principios del siglo XIX. A través de una numerosa auto-experimentación logró establecer una terapéutica que era continuación de la conocida teoría de la semejanza entre los efectos y los síntomas (**similia similibus curentur**). El Dr. Hahnemann llegó a comprobar que los medicamentos que experimentaba en él mismo, tenían un efecto demasiado severo si se suministraban en las dosis convencionales. Fué así como descubrió que una dilución apropiada de los mismos medicamentos producía un efecto curativo más rápido y sin efectos colaterales. Este principio se halla en la base de los modernos medicamentos homeopáticos y en su cada vez más extendido uso por parte de médicos y pacientes a través de todo el mundo.

La prescripción homeopática

La prescripción de un medicamento homeopático se basa en los principios de la curación establecidos por Hahnemann, según los cuales una determinada enfermedad puede ser curada si al paciente se le administran aquellas sustancias que, en un paciente sano, producen síntomas similares a aquellos de la enfermedad que se pretende curar. Desde luego que esas sustancias no pueden administrarse en la dosis y concentración convencionales sino que deben ser sometidas a un procedimiento de dilución (**dinamización**).

El homeópata experimentado reúne una lista de todos los síntomas del paciente, incluyendo los de índole física, psicológica y emocional. A todo esto habrá que agregarle factores que de una u otra forma contribuyan a la condición, tales como el agravamiento en tiempo húmedo, por ejemplo, o la mejoría como consecuencia del reposo. Toda esta información llega a conformar la "**imagen**" sintomatológica del paciente. Esta "**imagen**" es de carácter absolutamente individual y se correlacionará con el remedio o medicamento apropiado para el tratamiento.

En vista de la enorme cantidad de medicamentos homeopáticos disponibles, se hace necesario que quien prescriba homeopatía tenga un conocimiento serio y profundo de la Materia Médica Homeopática para así poder escoger el medicamento que mejor se ajuste a la "**imagen**" sintomatológica del enfermo.

Las enfermedades agudas son aquellas que se manifiestan en forma súbita y con síntomas claramente definidos, tales como enfriamientos, influenzas y heridas o lesiones. La mayoría de las enfermedades son de esta naturaleza. Se trata de condiciones no complejas y muy limitadas en su duración. Este tipo de enfermedades, incluyendo los primeros auxilios, pueden tratarse fácil y rápidamente con medicamentos homeopáticos, y no se requiere necesariamente de una muy vasta experiencia para ello. Para este tipo de tratamientos se emplean generalmente las diluciones o dinamizaciones de la 3X a la 12X o 30X.

Condiciones de tipo crónico, aquellas que han venido atormentando al paciente por un período más prolongado de tiempo, son de carácter más serio y requieren de un abordaje ligeramente diferente. Algunas condiciones crónicas pueden deberse a factores constitucionales y de predisposición del paciente. Son las condiciones a las que nos referimos como enfermedades constitucionales o predisposiciones. Una adecuada y seria prescripción constitucio-

nal ya requiere de un mayor nivel de conocimiento de la homeopatía por parte del médico y de una extensa familiaridad con la Materia Médica. En la mayoría de los casos estas condiciones se abordan con diluciones del rango de la 200X o más elevadas.

En el mercado farmacéutico homeopático encontramos miles de medicamentos hoy en día. Estos pueden clasificarse en dos grandes grupos: el de los preparados unicistas y el de los preparados combinados o complejos. Los medicamentos unicistas son diluciones o dinamizaciones de un solo ingrediente homeopático. Estos preparados se consiguen en una amplia gama de dinamizaciones y se emplean para el tratamiento de condiciones agudas o crónicas siguiendo los principios de la ley de los similares.

Preparados combinados

Los medicamentos combinados son una mezcla de dos o más ingredientes homeopáticos de la misma o de diversas dinamizaciones. Este tipo de combinaciones son diseñadas por médicos o farmaceutas y presuponen un conocimiento bastante extenso de la Materia Médica. Según la terapéutica que se persiga con el medicamento se hace la selección de los componentes. La meta terapéutica buscada será la que determine si éstos son muchos o pocos.

Aquellos elementos que estén correlacionados en su "**imagen**" sintomatológica se combinan según la necesidad de ampliar la "**imagen**" total en el medicamento combinado. Los ingredientes combinados ejercen una fuerza sinérgica entre ellos mismos en lo que a sus efectos se refiere y facilitan así al médico una manera sencilla de tratar afecciones agudas comunes. Al combinar las "**imágenes**" de varios ingredientes dentro de un medicamento de espectro más amplio, el médico no requiere de un conocimiento tan profundo de la Materia Médica. De esa forma, tampoco necesita pasar por el trabajo de seleccionar cada uno de los elementos individuales que se ajusten al caso que esté tratando. Los medicamentos combinados no se utilizan muy frecuentemente en el tratamiento de casos crónicos o constitucionales. Estos tienen el propósito de tratar los síntomas agudos que muchas veces acompañan a las condiciones constitucionales. Ayudando a eliminar los síntomas agudos se destaca mucho más claramente la verdadera "**imagen**" constitucional de una determinada patología.

Es absolutamente cierto que el tratamiento con medicamentos individuales que correspondan exactamente al "**símil**" de la patología del paciente es el ideal. Sin embargo, no todo practicante de la homeopatía dispone del conocimiento suficiente como para escoger exactamente los medicamentos en cada uno de los casos; más aún, en muchos casos tampoco es necesario. El médico de hoy en día se las tiene que ver con tantas condiciones diferentes como pacientes, y en este sentido, utilizar siempre los medicamentos individuales simplemente no es práctico. En la mayoría de los casos, las enfermedades tratadas son condiciones agudas y banales. Es precisamente para estos casos en los que mejor se encontrará equipado nuestro médico al utilizar los medicamentos combinados.

En caso de patologías comunes y de casos agudos puede prescribirse un medicamento combinado con toda confianza. Así se permite el tratamiento seguro y efectivo de males menores y se le da el tiempo necesario al médico para profundizar en patologías más serias. La utilización de medicamentos combinados también le brinda al médico menos experimentado la posibilidad de utilizar la homeopatía en una gran gama de patologías mientras se va familiarizando más profundamente con la Materia Médica y logra de esa manera prescribir en casos más severos, en los cuales, de acuerdo a la experiencia ganada, ya podrá entrar a tratar con medicamentos individuales.

A la homeopatía la acompaña toda una historia y un pasado de seguridad, efectividad y ausencia de efectos colaterales. No obstante, algunos pacientes pueden llegar a percibir un empeoramiento inicial de toda su sintomatología. Este fenómeno es seguido posteriormente de una clara fase de mejoría y alivio. Esto no es un efecto secundario, es lo que se ha dado en llamar una "**crisis curativa**". Estas crisis son la señal del cuerpo de haber aumentado su actividad en dirección a la curación, y por lo general son pasajeras.

En la mayoría de los casos se recomienda, de ser posible, que se suspenda toda otra medicación no esencial durante el tiempo en el que se esté utilizando la medicación homeopática. Son dos las razones: la primera consiste en que muchas de las medicaciones suprimen o enmascaran los síntomas que pueden tener relevancia en la configuración de la "**imagen**" sintomatológica del paciente. Por otra parte, existen algunos medicamentos, como por ejemplo los jarabes para la tos, que contienen una serie de ingredientes que pueden interferir con la acción de los medicamentos homeopáticos. Por supuesto que si un paciente depende necesariamente de una medicación alopática, o si la salud del paciente llega a correr peligro por la suspensión del medicamento, los medicamentos homeopáticos pueden ser utilizados en conjunción con otros fármacos. A este respecto cabe anotar que los medicamentos homeopáticos pueden llegar a tener una acción más lenta y sus resultados pueden ser menos efectivos si se administran en presencia de medicaciones alopáticas.

Los medicamentos homeopáticos deben tratarse con el mismo cuidado y precaución utilizados con cualquier otro medicamento. Deben ser administrados siguiendo las instrucciones y la dosificación indicadas. Como cualquier otro medicamento conllevan el potencial para producir resultados inesperados, por esa misma razón se les debe tener el debido respeto y manejarlos con cuidado.

Una última anotación de importancia para el médico: puede llegar a presentarse el caso de que el efecto deseado o esperado no llegue a presentarse. Esto puede deberse a alguna acción inadvertida por parte del paciente y que puede llevar a la interrupción del tratamiento. A todo paciente debe por eso advertírsele acerca de cómo el fumar, el ingerir alcohol y el consumir café pueden interrumpir el tratamiento. También ciertos inhaladores, pastillas para la garganta, sazones hechas a base de menta, y hasta algunos tés de hierbas, pueden contener ingredientes que interrumpan la efectividad del tratamiento homeopático.

Presentaciones comerciales

Líquidos (Gotas)

Uno de los principales y tradicionales vehículos que se utilizan para la presentación de medicamentos homeopáticos homotoxicológicos, son las formas líquidas, las cuales son en base a: agua destilada y alcohol etílico.

Tabletas

El creciente uso e interés en medicamentos homeopáticos ha traído consigo un cambio en las presentaciones comerciales de los productos mismos.
La presentación en tabletas parece haberle ganado algún terreno a la forma líquida. Los medicamentos homeopáticos preparados en forma sólida se mezclan con lactosa y luego se presentan en forma de píldoras o de tabletas. Muchos prefieren este tipo de presentación debido a la facilidad de producción, almacenamiento y distribución. Debido a que la dosis de medicamento contenida en la tableta es predeterminada y uniforme, es una forma de medicación muy consistente. Para aquellos que por primera vez se acercan a la homeopatía les resulta la tableta un poco más familiar.

Tanto las **Gotas** como las **Tabletas** deben ser colocadas bajo la lengua y permitir que se diluyan o disuelvan gradualmente sin masticarlas o sin movimientos de la lengua. Los ingredientes activos serán absorbidos por toda la estructura mucosa de la cavidad oral. Este es un proceso supremamente importante. La reabsorción mucosa permite que el medicamento llegue a su destino sin necesidad de pasar por el estómago, los intestinos y el hígado. Este es un hecho definitivo debido a que los jugos gástricos y los procesos digestivos pueden llegar a destruir o desactivar los ingredientes del medicamento.
En caso de condiciones agudas las tabletas y las gotas pueden administrarse cada hora o de 6 a 8 veces al día hasta que se observe una mejoría. Para casos muy agudos o en situaciones de

primeros auxilios, ambas pueden administrarse cada diez o quince minutos hasta que ceda la crisis. Para tratamientos más prolongados (posteriores a una situación crónica, por ejemplo) la dosis normal es de tres tabletas o treinta gotas al día, hasta que los síntomas hayan desaparecido casi completamente.

La administración de varias formas de presentación homeopáticas al mismo tiempo no está contraindicada. Normalmente lo que se hace es alternar los medicamentos de acuerdo al plan que se haya señalado.

Utilizando la presentación en forma sólida como líquida, se obtendrán los mejores resultados si la cavidad oral se encuentra limpia y libre de residuos de bebidas y alimentos. La presencia de otro tipo de sustancia en la boca limita la acción de reabsorción mucosa y por consiguiente disminuye la efectividad del medicamento.

Administración

Los síntomas de una enfermedad en un momento dado pueden justificar el empleo de más de un medicamento combinado. Estos pueden ser de la misma o de diferente presentación. Si se está tomando tabletas de diferente fórmula, deben dejarse pasar por lo menos diez (10) minutos entre una y otra para permitir una completa absorción. Lo mismo es válido cuando se están administrando varios medicamentos líquidos o en la combinación de tabletas y líquidos.

Plan de administración

	Crisis o primeros auxilios	Patologías agudas	Patologías crónicas	Patologías constitucionales
Diluciones más frecuentes	3X-12X	3X-30X	12X-30X	200X o más
Presentación	gotas tabletas	gotas tabletas	gotas tabletas	gotas tabletas
Frecuencia	Cada 5-30 minutos	Cada 30 min. hasta cada hora. Decrecer hasta 3 a 4 veces al día	1-3 veces al día	una sola vez

Indice Terapéutico B.H.I.

Aborto, peligro de

Medicamento principal: **Bhi Femm®**
Medicamento acompañante: **Bhi Injury®**: después de accidentes

Abscesos

Medicamentos principales: **Bhi Flamm®** , **Bhifection®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Cold®**: subsiguientes a reintoxicaciones, envenenamientos. **Bhi Injury®**: subsiguientes a heridas o accidentes

Acedia

Medicamentos principales: **Bhi Nau®**, **Bhi Spasm Pain®**, **Bhi Stom ®**
Medicamento acompañante: **Bhi Liver ®**

Acné-Rosacea

Medicamentos principales: **Bhi Femm®** o **Bhimale®**
Medicamento acompañante: **Bhiskin®**: renovación del tejido cutáneo

Acné vulgaris

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**: supuraciones
Medicamentos acompañantes: **Bhi Femm®**: adolescentes femeninas, **Bhimale®**: adolescentes masculinos

Acroparestesia

Medicamento principal: **Bhi Neralgia®**
Medicamentos acompañantes: **Bhisciat®**: piernas y pies
Bhi Variose®: piernas y pies, congestión venosa

Adinamia

Medicamento principal: **Bhi Exhaustion®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Enzy®**: reactivador enzimático

Afonía

Medicamento principal: **Bhitroat®**
Medicamentos acompañantes: **Cou Bhi®**: en alternancia con el remedio principal, **Bhi Sin®**: mucosa de la naríz, catarro

Aftas

Medicamento principal: **Bhi Cold®**
Medicamento acompañante: **Bhilymp®**: limpia los vasos linfáticos

Agalactia

Medicamento principal: **Bhi Femm®**: remedio constitucional
Medicamentos acompañantes: **Bhi Exhaustion®**: estimula la secreción de leche, **Bhilymp®**: estimula la circulación linfática

Agotamiento

Medicamentos principales: **Bhi Exhaustion®** y **Bhi Enzy®**

Albuminuria

Medicamento principal: **Bhi Kidney®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Bladder®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhi Flamm®**: fiebre, cistitis, pielitis **Bhiprost®**: hipertrofia prostática

Alergias (respiratorias, a comidas, dérmicas)

Medicamentos principales: **Aller Bhi®**, **Bhi Hayfever**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flamm®**: hinchazón, fiebres **Bhi Sin®**: catarro crónico nasal, ojos llorosos, **Bhiskin®**: salpullido, hinchazón, ampollas

Alopecia

Medicamento principal: **Bhihairskin®**

Amenorrea

Medicamento principal: **Bhi Femm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Calm®** : stress,
Bhi Mens® : desórdenes histológicos

Amigdalitis

Medicamentos principales: **Bhi Flamm®**, **Bhifection®** y **Bhitroat®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Cold®**: situación homotóxica extraordinaria, **Bhi Flu Plus®**: síntomas de influenza, **Bhilymp®**: amigdalitis crónica, escrofulosis

Anemia

Medicamento principal: **Bhi Enzy®**
Medicamentos acompañantes: **Bled Bhi®**: luego de pérdida de sangre, **Bhi Exhaustion®**: debilidad causada por la pérdida de sangre

Aneurismas

Medicamento principal: **Bhi Circul®**
Medicamento acompañante: **Hert Bhi®** : estimula la circulación

Angina de pecho (Angina pectoris)

Medicamento principal: **Hert Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Circul®**: presión alta, arterioesclerosis, **Bhirecov®**: amenaza de un infarto o después de sucedido éste

Ano (fisuras y picazón)
(Véase Hemorroides)

Apoplejía

Medicamento principal: **Bhirecov®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Alertness®**: estimula la curación de daños cerebrales
Hert Bhi®: en alternancia con el medicamento principal
Bhi Restorative®: paresia

Arritmia
Medicamento principal: **Hert Bhi®**

Arterioesclerosis

Medicamento principal: **Bhi Circul®**
Medicamento acompañante: **Hert Bhi®** : en alternancia con el medicamento principal

Artritis

Medicamento principal: **Bhi Artrhan®**
Medicamentos acompañantes: **Bon Bhi®**: inflamación de los huesos, dolores nocturnos, **Bhi Flamm®**: hinchazón, inflamación
Bhi Spasm Pain® : dolores severos

Asma

Medicamento principal: **Bhi Asth®**
Medicamentos acompañantes: **Bhibron®**: tos crónica, **Bhi Calm®**: insomnio, ataques nocturnos de asma

Atrofia producida por consunción dorsal

Medicamento principal: **Bon Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Alertness®**: desorientación
Bhi Lightheaded®: cerrar los ojos debido a mareo o vértigo,
Bhi Neralgia®: dolor neural, **Bhisciat®**: dolor lancinante en las piernas

Bazo, desórdenes del

Medicamento principal: **Bhipanc®**: dolor en la región epigástrica izquierda
Medicamentos acompañantes: **Bhi Enzy®** : regenera y estimula el sistema de defensa, **Bhi Flamm®**: fiebre alta e inflamaciones
Bhi injury®: trauma abdominal

Biliares, desórdenes

Medicamento principal: **Bhiceld®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Inte®**: cuando se presentan junto con estreñimiento, **Bhi Liver®**: detoxicación, **Bhi Spasm Pain®**: cólicos y dolores

Blefaritis

Medicamento principal: **Bhiey®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flamm®**: inflamaciones **Bhi Neralgia®**: acompañada por neuralgias

Bronquitis

Medicamento principal: **Bhibron®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Chest**: afecciones pleurales **Bhi Sin®**: afecciones nasales, **Bhitroat®**: inflamación de la laringe

Bursitis

Medicamento principal: **Bhi Artrhan®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Neralgia®**: parte superior del cuerpo, **Bhi Restorative®**: mejora el movimiento muscular, **Bhisciat®**: parte inferior del cuerpo

Calambres musculares

Medicamento principal: **Bhi Rendimax®**: durante o después del ejercicio

Carbunclos
(véase Forunculosis)

Cardiaca, insuficiencia

Medicamento principal: **Hert Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Circul®**: presión sanguínea alta, **Bhirecov®**: amenaza de infarto, o después de sucedido éste.

Cardiaco, espasmo
(véase Angina de Pecho)

Caspa

Medicamento principal: **Bhihairskin®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Enzy®**: regeneración enzimática, con utilización periódica, **Bhiskin®**: eczema, picazón

Catarro
(véase indicaciones individuales)

Cefalalgia
(véase Jaqueca)

Ciática

Medicamento principal: **Bhisciat®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Neralgia®**: reacciones severas y excesivas, **Bhi Spasm Pain®**: en alternancia con el medicamento principal

Circulatorios, desórdenes

Cardíacos: **Hert Bhi®**
Cerebrales: **Bhirecov®**
Periféricos: **Bhi Circul®** y **Bhi Variose®**

Cistitis, Cistalgia, Cistopielitis

Medicamento principal: **Bhi Bladder®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Kidney®**: tenesmo, **Bhiprost®**: hipertrofia prostática

Colangitis, Colecistitis, Colelitiasis
(véase Biliares, desórdenes)

Cólico

Medicamento principal: **Bhi Spasm Pain®**
Medicamentos acompañantes: ver indicaciones individuales **Bhi Ear®**, **Bhi Inte®**, **Bhipanc®**, **Bhi Stom®**

Colitis

Medicamentos principales: **Bhi Flamm®**, **Bhi Inte®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Direa®**, **Bhiconstipation®**: acompañando la irregularidad, **Bhi Liver®**, **Bhi Spasm Pain®**, **Bhi Stom®**: dispepsia

Colpitis
(Véase Vaginitis)

Conjuntivitis

Medicamento principal: **Bhiey®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flamm®**: hinchazón, **Bhi Spasm Pain®**: dolor

Contusiones

Medicamento principal: **Bhi Injury®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Calm®**: situaciones emocionales difíciles, stress, **Bhi Lightheaded®**: contusiones en la cabeza, **Bhi Spasm Pain®**: dolor

Corazón
(véase Cardíaca, Insuficiencia)

Debilidad

Medicamento principal: **Bhi Exhaustion®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Enzy®**: restaura las funciones enzimáticas, **Bhi Rendimax®**: debilidad producida por ejercicio intenso

Dentición, Desórdenes de la
(Véase Dolor de Muelas)

Depresión

Medicamentos principales: **Bhi Alertness®:** con cansancio, fatiga o dependencia química, **Bhi Calm®**: con el Síndrome Pre-Menstrual, **Inko Bhi®:** tristeza o pesadumbre excesiva

Dermatitis/Dermatosis

Medicamento principal: **Bhiskin®**
Medicamentos acompañantes: **Bhihairskin®**: reparación y crecimiento de la piel, **Bhi Flamm®**: salpullido

Diarrea

Medicamentos principales: **Bhi Direa®**, **Bhi Flamm®**
Medicamentos acompañantes: **Emord Bhi®**: dolor en el ano, **Bhi Inte®**: regula las funciones del intestino, **Bhi Liver®**, **Bhi Spasm Pain®**: dolor

Dislocaciones
(Véase Lesiones)

Dismenorrea

Medicamento principal: **Bhi Spasm Pain®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Mens®**: descargas uterinas, funcional, **Bhi Femm®**: menstruaciones irregulares, constitucional **Bhi Calm®**: stress, irritabilidad, depresión, síndrome pre-menstrual **Bhi Exhaustion®**: fatiga

Dispepsia

Medicamento principal: **Bhi Stom®**

Distonía

Medicamento principal: **Bhi Restorative®**: tono muscular y movilidad

Distrofia Adiposogenital

Medicamentos principales: **Bhi Femm®** y **Bhi Male®**

Diverticulitis

Medicamento principal: **Bhi Inte®**
Medicamentos acompañantes: **Bhiconstipation®**: cuando sea necesario, **Bhi Spasm Pain®**: dolor

Dolor
(Véase también Jaqueca, Migraña, Neuralgia, Ciática, etc.)

Medicamento principal: **Bhi Spasm Pain®**

Dolor de Muelas

Medicamento principal: **Bon Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flamm®**: parulis, **Bhi Neralgia®**: dolor que se irradia a la mandíbula, **Bhi Spasm Pain®**: dolores agudos o que se irradian, **Bhifection®**: inflamaciones severas, abscesos

Dolor de oído
(Véase Otitis)

Duodenitis
(Véase también Ulceras)

Medicamento principal: **Bhi Inte®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Nau®**: náusea, dolor, **Bhi Spasm Pain®**: dolor, cólicos, **Bhi Stom®**: dispepsia

Eczema

Medicamento principal: **Bhiskin®**
Medicamentos acompañantes: **Bhihairskin®**: verrugas, condilomas, **Bhilymp®**: limpia los vasos linfáticos

Embarazo, Dificultades del

Medicamento principal: **Bhi Femm®**
Medicamentos acompañantes: **Bled Bhi®**: peligro de aborto, **Bhi Mens®**: leucorrea, **Bhi Nau®**: vómito debido a embarazo, **Bhi Spasm Pain®**: dolores del parto y alumbramiento, **Bhi Mulimen®**: molestias matutinas

Embolismo

Medicamentos principales: **Bhi Circul®** y **Bhi Variose®**

Empiema

Medicamento principal: **Bhinfection®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Chest**: cavidad pleural, **Bhi Flamm®**: fiebre, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos

Enfisema

Medicamento principal: **Bhibron®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Asth®**: dificultad al respirar, **Bhi Chest**: dolor al respirar

Enterocolitis
(Véase Colitis)

Enuresis

Medicamento principal: **Bhi Bladder®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Alertness®**: en niños, **Bhi Calm®**: insomnio, desórdenes del sueño, **Bhi Kidney®**: cistopielitis y supuraciones

Epistaxis

Medicamento principal: **Bled Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Injury®**: accidentes

Erisipelas

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**
Medicamento acompañante: **Bhi Skin®**: en casos recurrentes

Escrofulosis

Medicamento principal: **Bhilymp®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flamm®**: fiebre acompañada de glándulas inflamadas, **Bhi Skin®**: erupciones escrofulosas de la piel, **Bhi Spasm Pain®**: glándulas inflamadas

Espasmo abdominal/cólicos

Medicamento principal: **Bhi Spasm Pain®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Chamomilla**, **Bhi Echina PC®**

Espasmos

Medicamento principal: **Bhi Spasm Pain®**

Espinales, Irritaciones

Medicamento principal: **Bhisciat®**
Medicamentos acompañantes: **Bon Bhi®**: alteraciones de la columna vertebral, **Bhi Neralgia®**: jaqueca y otras neuralgias, **Bhi Spasm Pain®**: en alternancia con el medicamento principal

Estangurria

Medicamento principal: **Bhi Bladder®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flamm®**: desarrollo febril, **Bhi Kidney®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos y tenesmo

Estomatitis

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Cold®**: aftas e infecciones virales, **Bhifection®**: inflamación severa

Estrabismo

Medicamento principal: **Bhiey®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Neralgia®**: cuando va acompañado de neuralgias, **Bhi Restorative®**: estrabismo reumático constitucional

Estreñimiento

Medicamento principal: **Bhiconstipation®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Inte®**: ayuda a mejorar su funcionamiento, **Bhi Liver®**, **Bhi Spasm Pain®**: dolor, espasmos, cólicos, **Bhi Stom®**

Exantema
(Véase Eczema)

Faringitis

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhibron®**: faringitis crónica de fumadores, **Bhi Flu Plus®**: excreción catarral, **Bhitroat®**: afonía y tos

Fiebre

Medicamentos principales: **Bhi Echina PC®**, **Bhifection®, Bhi Flamm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Cold®:** estimula el sistema de defensa contra las enfermedades virales, **Bhi Flu Plus®**: cuando se presenta acompañada de escalofríos

Fiebre del heno

Medicamentos principales: **Bhi Hayfever**, **Aller Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Cou Bhi®**: tos y catarro, **Bhi Sin®**: fosas nasales congestionadas, disnea

Flatulencia
(Véase Dispepsia)

Flebitis

Medicamento principal: **Bhi Variose®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Circul®**: mejoría circulatoria, **Bhi Flamm®**: tromboflebitis

Forúnculos
(Véase Forunculosis)

Forunculosis

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhifection®**: supuraciones, **Bhi Perspiration®**: abscesos producidos por el sudor

Gastralgia

Medicamento principal: **Bhi Nau®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Spasm Pain®**: cólico gástrico, **Bhi Stom®**: dolor en la región epigástrica, acedía, gastritis

Gastritis, Gastroenteritis

Medicamentos principales: **Bhi Stom®** y **Bhi Inte®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Nau®**: dolor, náusea, **Bhi Spasm Pain®**: dolor, cólico

Glaucoma

Medicamento principal: **Bhiey®**
Medicamento acompañante: **Bon Bhi®**: en alternancia con el medicamento principal

Glomerulonefritis
(Véase Nefritis)

Gota

Medicamento principal: **Bhi Artrhan®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flamm®**: hinchazón, **Bhilymp®**: transporte del ácido úrico, **Bhi Spasm Pain®**: dolor

Hemorragia

Medicamento principal: **Bhi Injury®**: (accidentes)
Medicamento acompañante: **Bled Bhi®**: hemorragia

Hemorroides

Medicamento principal: **Emord Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Direa®**: dolor y dificultad crónica, **Bhi Inte®**: en alternancia con el remedio principal o cuando se demuestre mejoría

Hepatitis

Medicamento principal: **Bhi Liver®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Cold®**: complicación viral, **Bhipanc®**: en alternancia con el remedio principal

Heridas
(Véase Lesiones)

Herpes (Zoster)

Medicamento principal: **Bhi Cold®**
Medicamento acompañante: **Bhi Spasm Pain®**: herpes doloroso

Hidronefrosis
(Véase Nefritis)

Hígado, Desórdenes funcionales
(Véase Biliares, desórdenes; Ictericia; Hepatitis)

Hiperhidrosis

Medicamento principal: **Bhi Perspiration®**

Hipertensión

Medicamento principal: **Bhi Circul®**
Medicamentos acompañantes: **Hert Bhi®**: mejoría en el sistema cardiovascular, **Bhi Variose®**: éstasis venoso

Hordeolo (orzuelos)

Medicamento principal: **Bhiey®**
Medicamento acompañante: **Bhifection®**: estimula el sistema de defensa, casos crónicos

Hormonal, Balance

Medicamentos principales: **Bhi Femm®** o **Bhimale®**
Medicamento acompañante: **Bhi Mulimen®**

Huesos, Afecciones de los

Medicamento principal: **Bon Bhi®**
Medicamento acompañante: **Bhi Neralgia®**: en alternancia con el medicamento principal

Ictericia

Medicamentos principales: **Bhiceld®** y **Bhi Liver®**
Medicamentos acompañantes: **Bhilymp®**: estimula la función linfática, **Bhipanc®**: afecciones del páncreas, lado epigástrico izquierdo

Ileo
(Véase Estreñimiento)

Impétigo

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**

Impotencia

Medicamento principal: **Bhimale®**

Medicamentos acompañantes: **Bhi Enzy®**: en alternancia en todos los casos, **Bhi Liver®**: en alternancia con el medicamento principal, estimula la síntesis de albúmina

Inflamación
(Véase también la referencia de localización o tipo de)

Medicamentos principales: **Bhi Flamm®** y **Bhi Echina PC®**

Influenza

Medicamento principal: **Bhi Flu Plus®**
Medicamentos acompañantes: **Cou Bhi®**: estimula la expectoración, **Bhi Exhaustion®**: dolores en todo el cuerpo, fatiga después de una enfermedad, **Bhi Inte®**: influenza intestinal

Insolación

Medicamento principal: **Bhirecov®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Lightheaded®**: vértigo, **Bhi Exhaustion®**: debilidad, **Cabdol Bhi®**: jaqueca

Insomnio

Medicamento principal: **Bhi Calm®**

Intestino (espasmos, cólicos)

Medicamentos principales: **Bhi Inte®** y **Bhi Spasm Pain®**

Iritis

Medicamento principal: **Bhiey®**
Medicamentos acompañantes: **Bon Bhi®**: en alternancia en todos los casos, **Cabdol Bhi®**: dolores que se irradian

Jaqueca

Medicamento principal: **Cabdol Bhi®**

Medicamentos acompañantes: **Aller Bhi®**, **Bhimigrain®**: dolores en la frente, sensación de adormecimiento, ofuscamiento, migrañas, **Bhi Neralgia®**: jaqueca con visión de manchas enfrente de los ojos

Laringitis

Medicamento principal: **Bhitroat®**
Medicamentos acompañantes: **Cou Bhi®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhi Flamm®**: fiebre alta y dolor

Lesiones

Medicamento principal: **Bhi Injury®**
Medicamentos acompañantes: **Bled Bhi®**: heridas que sangran, **Bon Bhi®**: fracturas y causalgias, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos

Leucorrea

Medicamento principal: **Bhi Mens®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Femm®**: en alternancia con el remedio principal, **Bhi Spasm Pain®**: dolores en la región pélvica **Bhi Mulimen®**: flujo amarillo-verdoso, con picazón

Lumbago

Medicamento principal: **Bhisciat®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Neralgia®**: dolor a lo largo de la espina dorsal, **Bhi Spasm Pain®**: dolor

Mal de Meniere

Medicamento principal: **Bhi Lightheaded®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Circul®**: arterioesclerosis, **Cabdol Bhi®**: sensación de adormecimiento con jaqueca, **Hert Bhi®**: sensación de palpitación notoria en el corazón

Mareo

Medicamento principal: **Bhi Lightheaded®**
Medicamento acompañante: **Bhi Nau®**: náusea, vómito

Mastitis

Medicamento principal: **Bhi Flamm®** o **Bhifection®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Femm®**: regula la secreción de leche, **Bhilymp®**: estimula la circulación linfática

Mastoiditis

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Ear®**: en todas las afecciones óticas, **Bhifection®**: en alternancia con el medicamento principal

Memoria, Pérdida o deficiencia de la
(Véase Olvido, calidad de olvidadizo)

Menopausia

Medicamentos principales: **Bhi Femm®**, **Bhi Mulimen®**
Medicamento acompañante: **Bhi Calm®**: depresión, irritabilidad

Menorragia

Medicamento principal: **Bled Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Femm®**: desórdenes regulatorios, **Bhi Mens®**: desórdenes histológicos, **Bhi Mulimen®**: agotamiento y debilidad

Menstruación, Dolorosa
(Véase Dismenorrea)

Metritis, Metrorragia

Medicamento principal: **Bhi Femm®**

Medicamentos acompañantes: **Bled Bhi®**: metrorragia y menorragia, **Bhi Mens®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhi Spasm Pain®**: inflamación con dolor

Migraña

Medicamento principal: **Bhimigrain®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Neralgia®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos

Nasal, Congestión
(Véase Sinusitis)

Náusea

Medicamento principal: **Bhi Nau®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Spasm Pain®**: dolores abdominales, cólicos, **Bhi Stom®**: dispepsia, acedía

Nefritis

Medicamento principal: **Bhi Kidney®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Bladder®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhilymp®**: estimula la función renal por medio de la eliminación de desechos

Neumonía

Medicamento principal: **Bhi Flu Plus®**
Medicamentos acompañantes: **Bhibron®**: neumonía bronquial **Bhi Chest**: afecciones pleurales, **Cou Bhi®**: estimula la expectoración, **Bhi Flamm®**: abscesos pulmonares, fiebre

Neuralgia

Medicamento principal: **Bhi Neralgia®**
Medicamentos acompañantes: **Cabdol Bhi®**: dolor que se irradia desde la parte posterior de la cabeza hasta la parte superior **Bhisciat®**: dolores desde el cuello hasta el talón, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos, calambres punzantes

Ocena
(Véase Sinusitis)

Oftalmia

Medicamento principal: **Bhiey®**
Medicamentos acompañantes: **Bon Bhi®**: casos crónicos, **Bhi Flamm®**: fiebre

Olvido, Calidad de olvidadizo

Medicamentos principales: **Bhi Alertness®**, **Inko Bhi®**

Onicomicosis

Medicamento principal: **Bhihairskin®**
Medicamentos acompañantes: **Bon Bhi®**: efectos neurales que se irradian, **Bhi Flamm®**: dolor o hinchazón

Orquitis

Medicamento principal: **Bhi Cold®**
Medicamento acompañante: **Bhimale®**: desarrollo crónico

Orzuelos
(Véase Hordeolo)

Osteitis

Medicamento principal: **Bon Bhi®**
Medicamento acompañante: **Bhi Flamm®**: fiebre alta, desarrollo séptico

Osteomalacia

Medicamentos principales: **Bhi Femm®**: pacientes femeninas, **Bhi Male®**: pacientes masculinos
Medicamentos acompañantes: **Bon Bhi®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos

Otalgia
(Véase Otitis y Amigdalitis)

Otitis

Medicamento principal: **Bhi Ear®**
Medicamentos acompañantes: **Bhifection®**: fiebre severa, supuración, **Bhi Flamm®**: fiebre severa, mastoiditis, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos, otalgia

Ovaralgia, Ovaritis

Medicamento principal: **Bhi Femm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Mens®**: después de una descarga suprimida o en vicariaciones regresivas **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos

Páncreas, Problemas del

Medicamento principal: **Bhipanc®**
Medicamentos acompañantes: **Bhiceld®**: sistema de la vesícula biliar irritado, **Bhi Flamm®**: fiebre y dolores, **Bhi Liver®**: desórdenes de la función hepática, **Bhi Nau®**, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos y fiebre, cólicos

Paperas

Medicamento principal: **Bhi Cold®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flu Plus®**: complicación de influenza, **Bhifection®**: desarrollo séptico, **Bhi Flamm®**: fiebre, supuración

Parálisis

Medicamento principal: **Bhi Restorative®**
Medicamento acompañante: **Bhirecov®**: situaciones apopléticas y difteria

Paranasal, Catarro
(Véase Sinusitis)

Paraplejía, Paraplegia
(Véase Apoplejía, Parálisis)

Parotitis
(Véase Paperas)

Pénfigo

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Cold®**: periódicamente, **Bhihairskin®**: periódicamente, **Bhilymp®**: en alternancia con el medicamento principal

Pericarditis

Medicamento principal: **Hert Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flamm®**: inflamación, fiebre, **Bhirecov®**: circulación sanguínea, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos y fiebre

Periostitis

Medicamento principal: **Bon Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Neralgia®**: dolores que se irradian en la parte superior del cuerpo, **Bhisciat®**: dolores en la parte inferior del cuerpo, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos

Peritonitis

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Inte®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhilymp®**: detoxicación del sistema linfático, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos y fiebre

Picaduras y mordeduras de insectos
(Véase también Alergias)

Medicamento principal: **Bhiskin®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Echina PC®**: también en picaduras de serpientes y con plantas venenosas

Bhi Injury®: inflamación, **Bhi Flamm®**: inflamaciones severas de las glándulas linfáticas y/o de los vasos linfáticos, fiebre

Picazón

Medicamento principal: **Aller Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhihairskin®**: picazón del cuero cabelludo, **Bhilymp®**: limpia el sistema linfático, **Bhiskin®**: eczemas con picazón

Pielitis

Medicamento principal: **Bhi Kidney®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Bladder®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhi Flamm®**: fiebre alta y escalofríos, **Bhi Lymp®**: estimula la producción de orina de los vasos linfáticos **Bhi Spasm Pain®**: dolores y cólicos

Pirosis
(Véase Dispepsia)

Pitiriasis
(Véase Dermatitis)

Pleuresia, Pleuritis

Medicamento principal: **Bhi Chest**
Medicamentos acompañantes: **Cou Bhi®**: tos severa continua, **Bhi Flamm®**: supuraciones, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos y fiebre

Proctitis

Medicamento principal: **Bhi Direa®**
Medicamentos acompañantes: **Emord Bhi®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhi Inte®**: periódicamente

Prosopalgia
(Véase Migraña y Jaqueca)

Prostatitis

Medicamento principal: **Bhiprost®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Bladder®**: irritación del sistema urinario, **Bhi Flamm®**: Inflamación, hinchazón, **Bhi Male®**: armonización hormonal, descargas

Prurigo, Prurito

Medicamento principal: **Bhiskin®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flamm®**: inflamación, salpullido, hinchazón, **Bhilymp®**: eliminación de desechos linfáticos en casos de prurigo

Ptosis

Medicamento principal: **Bhi Restorative®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Enzy®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhiey®**: inflamación de los ojos, **Bhi Neralgia®**: dolores irradiando en la cara

Quemaduras

Medicamento principal: **Bhi Injury®**
Medicamentos acompañantes: **Bhihairskin®**: crecimiento de piel nueva, **Bhifection®**: previene supuraciones, **Bhi Spasm Pain®**: dolor

Queratitis

Medicamento principal: **Bhiey®**
Medicamentos acompañantes: **Bon Bhi®**: iritis, **Bhi Flamm®**: tendencias hacia el deterioro

Ragadias

Medicamento principal: **Bhiskin®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Femm®**: menopausia, **Bhi Male®**: hombres mayores

Raquitismo, Raquitis

Medicamento principal: **Bon Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Ear®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhilymp®**: escrofulosis

Renales, Desórdenes

Medicamento principal: **Bhi Kidney®**
Medicamento acompañante: **Bhi Bladder®**: sistema urinario irritado, cálculos renales, mala diuresis, hidronefrosis (en alternancia con el medicamento principal)

Reumatismo

Medicamento principal: **Bhi Artrhan®**
Medicamentos acompañantes: **Bon Bhi®**: inflamación de los huesos con dolores predominantemente por la noche, **Bhi Flamm®**: poliartritis febril, **Bhisciat®**: dolor en las piernas, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos

Rinitis
(Véase Sinusitis)

Riñón, Afecciones del
(Véase Renales, Desórdenes)

Medicamento principal: **Bhi Kidney®**

Ronquera
(Véase Laringitis)

Sarampión

Medicamento principal: **Bhi Cold®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flu Plus®**: síntomas de influenza, **Bhi Flamm®**: fiebre

Septicemia, Sepsis, Piemia

Medicamentos principales: **Bhi Flamm®**, **Bhifection®** y **Bhi Echina PC®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Cold®**: infecciones virales, **Bhi Flu Plus®**: síntomas de influenza, **Bhi Injury®**: desarrollo séptico de otras enfermedades

Singultus

Medicamento principal: **Bhi Stom®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Inte®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhi Nau®**: condición espasmódica del estómago, **Bhi Spasm Pain®**: en alternancia con el medicamento principal cuando haya dolor

Sinovitis

Medicamento principal: **Bhi Artrhan®**
Medicamentos acompañantes: **Bon Bhi®**: afecciones de los huesos y el periostio, **Bhi Flamm®**: edema e inflamación

Sinusitis

Medicamento principal: **Bhi Sin®**
Medicamentos acompañantes: **Cabdol Bhi®**: jaqueca, **Bhi Flamm®**: fiebre, **Bhi Neralgia®**: dolores en el rostro

Soriasis

Medicamento principal: **Bhiskin®**
Medicamentos acompañantes: **BhiHairskin®**: en alternancia con el medicamento principal, **Bhilymp®**: estimula la eliminación de desechos linfáticos

Supuración

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**
Medicamento acompañante: **Bhifection®**: desarrollo séptico severo

Tinnitus Aurium

Medicamento principal: **Bon Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Ear®**: inflamaciones, **Bhi Enzy®**: reactivación de enzimas obstruídas, **Inko Bhi®**: ruidos crepitantes

Torceduras

Medicamento principal: **Bhi Injury®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Artrhan®**: dolores persistentes, **Bhi Flamm®**: inflamación causada por lesión, **Bhi Spasm Pain®**: dolores severos causados por lesiones, torceduras, fracturas, etc.

Torticolis

Medicamento principal: **Bhi Spasm Pain®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Artrhan®**: en alternancia con o siguiendo al medicamento principal, **Bhi Neralgia®**: dolor irradiando en los hombros, **Bhisciat®**: dolor irradiando en la espalda hacia abajo

Tos

Medicamento principal: **Cou Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Sin®**: afecciones nasales, **Bhitroat®**: aspereza en la garganta

Tosferina

Medicamento principal: **Cou Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flu Plus®**: estimula la expectoración, **Bhilymp®**: detoxicación a través de los vasos linfáticos, **Bhi Spasm Pain®**: tos espástica

Traqueítis
(Véase Laringitis)

Ulceras del estómago y duodeno

Medicamento principal: **Bhi Nau®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Inte®**: estreñimiento, **Bhi Spasm Pain®**: dolor severo, **Bhi Stom®**: gastritis

Ulceras de las piernas

Medicamento principal: **Bon Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhifection®**: estimula el sistema de defensa, **Bhi Flamm®**: supuraciones, **Bhilymp®**: regula el funcionamiento de los vasos linfáticos

Uremia

Medicamento principal: **Bhilymp®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Bladder®**: estimula la función renal, **Bhifection®**: estimula la excreción, **Bhi Kidney®**: estimula la función renal

Urinarios, Desórdenes
(Véase Vejiga, Renales, Desórdenes, Albuminuria, Uremia, Hepatitis, etc.)

Urticaria

Medicamento principal: **Aller Bhi®**
Medicamentos acompañantes: **Bhihairskin®**: casos crónicos, **Bhiskin®**: periódicamente, en alternancia con el medicamento principal

Utero, Afecciones diversas del

Medicamento principal: **Bhi Femm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Enzy®**: estimula la función enzimática, **Bhi Flamm®**: parametritis, endometritis, salpinguitis, ovaritis y reacciones febriles, **Bhi Mens®**: ulceraciones del útero, eliminación de pus

Vacunas, Reacciones a

Medicamento principal: **Bhi Flamm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Cold®**: infecciones virales, **Bhifection®**: inflamaciones severas con desarrollo séptico

Vaginismo

Medicamento principal: **Bhi Calm®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Femm®**: regulación hormonal **Bhi Mens®**: sensibilidad en la vagina y leucorrea

Vaginitis

Medicamento principal: **Bhi Mens®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Calm®**: regulación nerviosa, **Bhi Femm®**: estimula la función de los órganos femeninos, **Bhi Flamm®**: inflamación severa de los órganos circundantes

Varicela

Medicamento principal: **Bhi Flu Plus®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Cold®**: fiebre, infecciones virales, **Bhifection®**: estimula el sistema de defensa

Varices

Medicamento principal: **Bhi Variose®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Enzy®**: utilización de oxígeno **Bhilymp®**: regula la función de los vasos linfáticos

Vejiga, Desórdenes de la

Medicamento principal: **Bhi Bladder®**
Medicamentos acompañantes: **Bhifection®**: cistitis crónica, **Bhi Flamm®**: inflamaciones del sistema renal, **Bhi Kidney®**: complicaciones con pielitis

Venas Varicosas

Medicamento principal: **Bhi Variose®**

Verrugas

Medicamentos principales: **Aller Bhi®** y **Bhiskin®**
Medicamento acompañante: **Bhi Cold®**: en alternancia con el medicamento principal

Vértigo

Medicamento principal: **Bhi Lightheaded®**
Medicamento acompañante: **Inko Bhi®**: confusión

Vesícula Biliar y Cálculos Biliares

Medicamento principal: **Bhiceld®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Flamm®**: empiema, **Bhi Liver®** : estimula las funciones hepáticas, **Bhi Spasm Pain®**: cólicos y dolores (ver Biliares, Desórdenes)

Vómito

Medicamento principal: **Bhi Nau®**
Medicamentos acompañantes: **Bhi Spasm Pain®**: dolor, **Bhi Stom®**: dispepsia

Zoster
(Véase Herpes Zoster)

Materia Médica de los preparados B.H.I.

Ingredientes y síntomas correspondientes

Bhi Alertness®

Phosphoricum acidum 4X, 10X
Insomnio; agotamiento; confusión: dificultades en la comprensión; pérdida de la memoria; lentitud en las respuestas.

Anacardium orientale 6X
Ansiedad; pérdida de la memoria; mente en blanco al presentar exámenes.

Arsenicum iodatum 6X
Postración profunda; pulso irritable: agotamiento; estimula el apetito.

Kali phosphoricum 6X
Debilidad después de trabajo mental.

Staphysagria 6X
Desinterés por el trabajo mental; debilidad de la memoria; prurito en el reborde de los párpados.

Lycopodium clavatum 8X
Pensamientos confusos; estados de confusión sobre los hechos cotidianos; tendencia al mutismo; depresión de espíritu.

Calcarea phosphorica 10X
Olvidadizo; dificultad en desarrollar actividades intelectuales; dolores de cabeza de niñas en edad escolar.

Ignatia amara 10X
Jaqueca aplastante en el lado derecho de la frente; dolor como si un clavo atravesara un lado de la cabeza; errores al hablar y al escribir.

Silicea 10X
Asustadizo con el menor ruido; debilidad y sensación de gran extenuación.

Selenium metallicum 12X
Fatiga debida a trabajo mental; dificultad en la comprensión; vértigo como si se estuviera intoxicado; gran deseo de dormir.

Nux Vomica 30X
Irritabilidad; furia; carácter crítico excesivo; ansiedad; confusión; intolerancia a la luz y al ruido; modorra durante el día.

Aller Bhi®

Arnica montana 6D
Inflamaciones; traumatismos tisulares; neurodermatitis.

Ignatia amara 6D
Sensación de constricción en la laringe y en la tráquea; tos; dificultad en la respiración; coriza fluyente.

Lycopodium clavatum 6D
Dolor de cabeza punzante; tos; inflamación de los ojos; catarro violento; dificultad en la respiración.

Thuja occidentalis 6D
Inflamaciones de la piel; verrugas; catarro nasal; asma; eczemas.

Lappa major 8D
Inflamaciones crónicas de la piel.

Arsenicum album 8D
Eczemas; prurito; inflamaciones dérmicas.

Formicum acidum 8D
Factor estimulante para la eliminación de toxinas.

Histaminum 8D, 12D, 30D, 200D
Efectividad antialérgica específica.

Ledum palustre 8D
Opresión constrictiva en el pecho; paros respiratorios sofocantes; tos; respiración dolorosa.

Antimonium crudum 10D
Afecciones de las membranas mucosas; catarro nasal y bronquial; eczema; erupciones de la piel con prurito.

Graphites 10D
Desórdenes dérmicos con erupciones eczematosas; afecciones escrofulosas.

Pix liquida 10D
Eczemas en las manos; prurito; erupciones.

Tellurium metallicum 10D
Eczemas; condiciones escrofulosas; erupciones y dolor.

Selenium metallicum 12D
Catarros nasales; tos con moco y expectoración; tirantez en el pecho; inflamaciones dérmicas; ampollas; prurito.

Sulphur 12D
Condiciones dérmicas; erupciones; afección de las mucosas bronquiales; reacciones alérgicas.

Sulphuricum acidum 30D
Nariz con corriente continua de líquido, con obstrucción de una fosa nasal; pérdida del olfato y el gusto; ojos enrojecidos; picazón en todo el cuerpo.

Bhi Artrhan®

Bryonia alba 4D, 8D, 12D, 30D
Articulaciones enrojecidas, endurecidas e hinchadas; dolor al menor movimiento, mejorando después de continuar el movimiento.

Rhus toxicodendron 4D, 8D, 12D, 30D
Hinchazón dolorosa de las articulaciones; dolores reumáticos en todas las extremidades, mejorando con el movimiento; rigidez en la nuca; pesadez paralítica de las piernas y de los pies; gran debilidad y dolor en todo el cuerpo, especialmente durante el reposo; dolor en las

articulaciones de las extremidades superiores, empeorando con tiempo frío y húmedo.

Colocynthis 5D
Distensión reumática; endurecimiento de los músculos de la nuca especialmente al mover la cabeza; calambres dolorosos en todos los músculos.

Arnica montana 6D
Dolores paralizantes en todas las articulaciones durante el movimiento; sensación de cansancio y de estar molido, con síntomas empeorando al atardecer; sensación de pesadez en las extremidades.

Colchicum autumnale 6D
Reumatismo articular, empeorando con el movimiento, diátesis gotosa; inflamación del dedo gordo del pie; dolores reumáticos en las articulaciones de los dedos.

Dulcamara 6D
Afecciones reumáticas causadas por exposición a tiempo frío y húmedo; exostosis.

Ledum palustre 6D
Enfriamientos, los dolores mejoran con el frío, reumatismo iniciándose en las piernas, luego asciende al cuerpo; crujir de las articulaciones; temblor de las manos al empuñarlas o moverlas.

Ranunculus bulbosus 6D
Reumatismo intercostal; dolores en las costillas; dolores espasmódicos en los brazos; dolores artríticos en los músculos.

Berberis vulgaris 8D
Afecciones artríticas y reumáticas asociadas con trastornos urinarios; dolores paralizantes en el hombro derecho; constitución gotosa.

Causticum Hahnemaniani 8D
Dolores sordos en manos y brazos; rigidez dolorosa de la nuca; dolores artríticos a lo largo de las extremidades.

Rhododendron 8D
Dolores reumáticos en las extremidades, empeoran antes de una tormenta; el dolor empeora durante el reposo.

Lycopodium clavatum 10D
Rigidez del cuello; dolores tirantes en todas las articulaciones.

Sulphur 10D
Gota reumática; gran debilidad y trémulo; síntomas empeorando durante el reposo, mejorando con el movimiento.

Ferrum phosphoricum 12D
Reumatismo articular con fiebre; dolores súbitos que empeoran con el movimiento.

Bhi Asth®

Arsenicum album 12X
Sensación de sofocación al yacer bocabajo, ansiedad, agotamiento y sed; resuellos continuos, empeorando en la noche; ardor en el pecho; cansancio.

Carbo vegetabilis 12X
Región laríngea áspera; deseo de aire fresco; sensación de ardor en el pecho; respiración fría.

Sulphur 12X
Voz ronca y áspera; disnea; afonía; debilidad en el pecho al hablar; eczema crónico; prurito profuso.

Bhi Bladder®

Belladonna atropa 4X
Cistitis; retención de orina; orina escasa.

Apis mellifica 6X
Debilidad urinaria; dolor al orinar.

Argentum nitricum 6X
Cistitis; inflamación de la uretra.

Cantharis vesicatoria 6X
Tenesmo urinario; la uretra se siente inflamada.

Equisetum hyemale 6X
Catarro vesical; dolor y sensibilidad en la región de la vejiga; deseo constante de orinar; dolor agudo y punzante en la uretra.

Pulsatilla nigricans 6X
Ardor en la abertura uretral durante y después del acto de orinar; enuresis con accesos de tos, dolor espasmódico en la vejiga; sólo se orinan algunas gotas con dificultad.

Sarsaparrilla 6X
Deseo frecuente de orinar; irritación del sistema urinario con tenesmo.

Causticum 8X
Debilidad de la vejiga; pérdida de orina al reírse, al toser y al estornudar.

Petroselinum sativum 8X
Severa presión urinaria, ardor en la fosa navicular al orinar.

Terebinthina 8X
Inflamación de la vejiga; ardor en la vejiga y en la uretra al orinar.

Bled Bhi®

Thlaspi bursa pastoris 4X
Hemorragias internas.

Acidum aceticum 6X
Hemorragias crónicas; hemorragias nasales, pulmonares, estomacales e intestinales.
Crocus sativus 6X
Sangre negra y densa; hemorroides coaguladas; corea con la hemorragia nasal característica o con metrorrhagia; hemorragias activas.
Ipecacuanha 6X
Hemorragias acompañadas de vómito; tosferina con hemorragia nasal; hemorragia de sangre de color rojo vivo.
Arnica montana, radix 8X
Hemorragias nasales; hematoceles; expectoración de sangre espumosa; hemorragias generalizadas.
Erigeron canadensis 8X
Hemorragias nasales e intestinales; sangre de color rojo vivo; metrorragia.
Hamamelis virginica 8X
Hemorragias venosas pasivas de cualquier parte; sangre color rojo oscuro.
Millefolium 8X
Hemorragias arteriales; hemorragias nasales, pulmonares e intestinales de sangre color rojo vivo; hemorroides sangrantes.
Bovista 12X
Hemorragias ginecológicas; hemorragias nasales.
Phosphorus 12X
Fluído sanguíneo sin tendencia a coagular; hemorragias de órganos parenquimatosos; heridas menores con tendencia a sangrar excesivamente.
Crotalus horridus 15X
Hemorragias cerebrales; hemorragias.

Bon Bhi®

Asafoetida 6X
Hinchazón y caries en los huesos de los pies y en la tibia; palpitación dolorosa en la punta del dedo gordo del pie.
Kalmia latifolia 8X
Dolor neurálgico que va desde la nuca hasta los dedos; presión en el brazo izquierdo; dolores reumáticos en las extremidades; endocartitis reumática; dolores reumáticos migrando por todo el cuerpo.
Aurum metallicum 12X
Dolores óseos nocturnos; los huesos se encuentran muy sensibles al tacto; dolor en la rodilla; exostosis craneana.
Hekla lava 12X
Dolores por exostosis.
Mercurius praecipitatus ruber 12X
Alteraciones del periostio; dolor tirante en la tibia.
Natrum sulphuricum 12X
Dolores que empeoran con tiempo húmedo; magullamiento en la parte inferior de la espalda.
Aranea diadema 15X
Claro deterioro con tiempo frío; periostitis simple; dolores de muela.
Lycopodium clavatum 30X
Rigidez de las articulaciones; las articulaciones de los dedos se encuentran inflamadas e hinchadas; gota crónica.

Bhibron®

Lobelia inflata 4X
La respiración se hace extremadamente difícil; bronquiolitis; bronquitis capilar; tosferina; enfisema.
Hyoscyamus niger 5X
Tos seca y espasmódica durante la noche, se empeora al acostarse; -mucho moco.
Sticta pulmonaria 5X
Tos seca y tortuosa; estadio espasmódico de la tosferina; resecamiento de las membranas mucosas.
Antimonium tartaricum 5X
Tos seca con secreción mucosa.
Belladonna atropa 6X
Voz ronca; tos seca; ataques violentos de tos durante el sueño; tos de perro.
Bryonia alba 6X
Tos al entrar en una habitación caliente; tos seca, como si proviniera del estómago; punzadas intensas en el pecho.
Hepatica triloba 6X
Faringitis; bronquitis; flema viscosa.
Ipecacuanha cephaelis 6X
Disnea con gran ansiedad; respiración resollante; tos que conduce a vomitar sin náuseas.
Kreosotum 6X
Secreciones malolientes; prurito; tos de fumador.
Pertussinum 30X
Específico contra la tosferina.

Bhi Calm®

Chamomilla matricaria 2D
Tendencia al llanto y furia; irritabilidad, ansiedad, insomnio, molestias

durante la dentición.

Humulus lupulus 2D
Efecto calmante y tranquilizante.

Passiflora incarnata 2D
Insomnio debido a nerviosismo, excitación o agotamiento; antiadictivo.

Valeriana officinalis 2D
Gran desasosiego; excitabilidad; imposibilidad de conciliar el sueño; jaqueca de origen nervioso; carácter histérico; sensación de estiramiento en diversas partes del cuerpo.

Veratrum album 4D
Manía persistente con deseo de desgarrar la ropa; bajonazo de espíritu; palpitaciones cardíacas con ansiedad.

Ignatia amara 8D
Carácter cambiante; cambio de risa a tristeza con lágrimas; sentimiento de aflicción contenido; contracciones convulsivas.

Coffea cruda 10D
Insomnio debido a gran excitación; los dolores parecen intolerables; desmayo debido a emociones súbitas; hipersensibilidad acústica.

Moschus 10D
Tremor nervioso; confusión para entablar una conversación; tendencia a entrar fácilmente en pánico.

Sulphur 12D
Melancolía, tendencia al llanto; gran ansiedad y aprehensión particularmente en la noche; somnolencia durante el día; imposibilidad de conciliar el sueño.

Nux vomica 30D
Para las consecuencias propias del abuso de café, alcohol y tabaco; gran somnolencia en las tardes y luego falta de sueño en las noches; despertar a las 3 A.M.; se levanta en las mañanas cansado y con dolor de cabeza sordo.

Bhi Chest

Bryonia 4X
Punzadas en el esternón al toser; inspirar profundamente se hace casi intolerable; pleuritis.

Ranunculus bulbosus 4X
Reumatismo intercostal; el pecho se siente adolorido; respiración entrecortada, con sensación de opresión; punzadas en el pecho; empeora con el movimiento y el contacto.

Asclepias tuberosa 6X
Dolor pleurítico agudo del lado derecho; pleuresía; pleurodinia; respiración dolorosa.

Kali carbonicum 6X
Dolores punzantes en el pecho durante la tarde; punzadas en el pecho al inspirar; debilidad del pecho.

Natrum sulphuricum 6X
Asma y disnea en tiempo húmedo; presión en el pecho como si tuviera un gran peso encima; se empeora con el movimiento y con la presión.

Sticta pulmonaria 6X
Tos seca que empeora en la tarde y en la noche; estadio espasmódico de la tosferina; tos incesante y temblorosa.

Arsenicum iodatum 8X
Pleuritis exudativa; neumonía aguda y crónica.

Dulcamara 8X
Pleuritis reumática; esputo grueso e incoloro; empeorando con el tiempo frío húmedo.

Colocynthis 10X
Opresión en el pecho; dolores en la región deltoide derecha y desde la cadera hasta la rodilla; tos.

Sulphur 30X
Tos violenta con dolor en el esternón; debilidad en el pecho al hablar; punzadas en el pecho que se extienden hacia la espalda y más concretamente hacia la escápula izquierda.

Bhi Circul®

Kali phosphoricum 6X
Estimula la actividad cerebral.

Rauwolfia serpentina 6X
Factor antihipertónico.

Arnica montana 8X
Tónico para el sistema arterial y para la mala memoria.

Plumbum metallicum 8X
Taquicardia y palpitaciones; hipertensión y arterioesclerosis, atrofia muscular progresiva.

Aurum iodatum 10X
Promueve la hipertonia.

Lycopodium clavatum 10X
Memoria débil; pulso acelerado; factor de detoxicación hepática.

Stramonium datura 10X
Contra las irritaciones cerebrales; convulsiones; congestión violenta en la cabeza.

Baryta iodata 12X
Efectividad antihipertónica.

Conium maculatum 12X
Arterioesclerosis; debilidad del cuerpo; tremor; palpitaciones; vértigo al girarse en la cama; endurecimiento de los tejidos.
Sulphur 12X
Presión en la frente; zumbido en los oídos; factor de detoxicación.

Bhicold®

Pulsatilla nigricans 6X
Inflamación de los ojos y de los párpados; dolores violentos en los oídos; congestión nasal al atardecer; cosquilleo y carraspera en la laringe; dificultad para respirar; mucosidad tenaz en la garganta.
Sulphur 8X
Detoxicación de infecciones virales; aspereza y sequedad de la garganta; coriza masiva y fluyente con estornudos; prurito y quemazón en las fosas nasales; dolores de cabeza insoportables; sensación de ardor en los párpados; campaneo en los oídos; trastornos respiratorios crónicos; catarros laríngeos y bronquiales.

Bhiconstipation®

Dioscorea villosa 4X
Estreñimiento; dolores estomacales al ingerir alimentos; el dolor es tan fuerte que el paciente prefiere no seguir comiendo.
Nux vomica 8X
Deposición incompleta; alternancia de estreñimiento y diarrea después del uso de laxantes; estreñimiento con hemorroides.
Natrum muriaticum 200X
Estreñimiento alternado con diarreas y frecuentemente acompañando con debilidad intestinal.

Cou Bhi®

Ephedra vulgaris 4X
Disnea en casos de asma; sensación de apatía.
Illicium anisatum 4X
Expectoración en todas las membranas mucosas en casos de catarro.
Ipecacuanha 4X
Sonidos roncos en las vías respiratorias; tosferina con hemorragias nasales; respiración entrecortada.
Stachys betonica 4X
Estimula la expectoración; catarros; dolores abdominales al igual que en la región hepática y vesicular.
Hepatica triloba 5X
Esputo seroso y profuso ronquera con catarro faríngeo; irritación de la garganta.
Lobelia inflata 5X
Opresión en el pecho con disnea; se agrava con el trabajo, se mejora al caminar rápidamente.
Arsenicum iodatum 6X
Tos seca e irritante; neumonía subaguda y crónica.
Belladonna atropa 6X
Tos corta y seca originada por cosquilleo en la laringe; sueño interrumpido con dolor en la laringe y comienzo de sofocación.
Naphthalinum 6X
Fiebre alta y asma espasmódica con dolor en el pecho; enfisema; la inspiración se dificulta sobre todo en pacientes mayores con asma.
Natrum sulphuricum 6X
Respiración entrecortada al caminar; se siente alivio al levantarse y sostener el pecho con ambas manos; tos en tiempo húmedo.
Quebracho 6X
Disnea con asma y cianosis; estimula la expectoración.
Antimonium Tartaricum 6X
Tos seca con vómito.
Blatta orientalis 8X
Tos con bronquitis; asma con abundante moco purulento; afecta principalmente a pacientes gordos y corpulentos.
Bryonia alba 8X
Pleuresía o neumonía con dolores punzantes en el pecho; tos fuerte seca de carácter agudo y doloroso; al toser, apoyar firmemente cabeza y pecho para disminuir el dolor.

Bhi Direa®

Aloe socotrina 4X
Excreción involuntaria, el ano está inflamado y se siente dolor.
Tormentilla 4X
Para excreciones sanguinolentas.
Veratrum album 5X
Diarrea, catarro intestinal.
Arsenicum album 6X
Excreción intestinal pesada y acuosa; agotamiento; severos estados de debilidad.
Colocynthis 6X
Cólicos y retortijones.
Cuprum aceticum 6X
Retortijones intestinales y calambres en las piernas.

Mercurius corrosivus 6X
Secreciones intestinales viscosas y sanguinolentas.
Podophyllum peltatum 6X
Diarreas en casos de patologías hepáticas.
Ferrum phosphoricum 10X
Medicamento antihomotóxico para la fiebre e inflamación.
Carbo vegetabilis 12X.
Diarrea por intoxicación con alimentos; digestión lenta; deposición involuntaria con olor pútrido; retortijones abdominales y gases.

Bhi Lightheaded®

Conium maculatum 5X
Vértigo al acostarse y al darse vuelta en la cama, al girar la cabeza o los ojos; vértigo con dolor de cabeza.
Cocculus indicus 6X
Vértigo con inclinación al vómito; náusea; jaqueca.
Phosphorus 6X
Vértigo, especialmente al levantarse o al cambiar de posición rápidamente; debilidad con extremidades temblorosas; vértigo con desalien to, náusea y dolor de cabeza.
Petroleum 8X
Vértigo al agacharse o levantarse; sensación de presión y pesadez en la región occipital.
Ambra grisea 12X
Vértigo con sensación de debilidad en el estómago; dolor de cabeza violento.

Bhiear®

Chamomilla matricaria 4X
Dolor de oído con presión; también indicado en enfermedades infantiles en las cuales el desasosiego es factor común.
Plantago major 4X
Dolores punzantes en los oídos; dolores que migran de un oído al otro.
Pulsatilla nigricans 4X
Dolores de oído violentos; sensación de fuertes rugidos en el oído; otorrea; flujo espeso y blando.
Aconitum napellus 5X
El oído externo se siente rojo, caliente, adolorido e hinchado; dolor de oído; gran sensibilidad al ruido.
Capsicum annuum 6X
Hinchazón dolorosa detrás de los oídos; inflamación del mastoides; extrema sensibilidad del peñasco del temporal; otorrea y problemas del mastoides anteriores a supuraciones.
Kali chloricum 6X
Catarro parenquimatoso de la trompa de Eustaquio.
Ferrum phosphoricum 10X
Primer estadio de la otitis; tímpano enrojecido y ligeramente hinchado; otitis aguda.
Hepar sulphuris calacareum 10X.
Descarga del oído.

Bhi Echina PC®

Echinacea angustifolia 6D, 12D, 30D, 200D
Echinacea purpurea 6D, 12D, 30D, 200D

La Echinacea es bien conocida por su habilidad para estimular el sistema de respuesta inmune no-específica del cuerpo. Bhi Echina PC® ofrece la efectividad de un espectro de potencias de las dos principales variedades de echinacea en forma de tabletas.

Bhi Enzy®

Nocotinamidum 4X, Thiaminum hydrochloricum 4X, Riboflavinum 4X Pyridoxinum hydrochloricum 4X, Cyanocobalaminum 6X, Acidum ascorbicum 4X
Estas vitaminas apoyan a las enzimas que son esenciales para el metabolismo orgánico, estabilizan el estado de oxidación del cuerpo y reducen los efectos del stress.
Cysteinum 6x
Factor importante de detoxicación de las enzimas del grupo sulfidrilo.
Magnesia phosphorica 6x
Importante elemento huella para el funcionamiento del ciclo de Krebs.
Natrum oxalacetium 6X
Componente del ciclo de Krebs que permite la metabolización del azúcar en energía.
Lipoicum acidum 8X
Factor de detoxicación del ácido pirúvico.
Cerium oxalicum 8X
Estimula la utilización de oxígeno.
Cis-aconitate 8X, Citricum acidum 8X
Componentes del ciclo de Krebs de utilización del oxígeno.
Coenzyme A 8X
Factor importante en el mejoramiento de las funciones metabólicas de utilización de energía y síntesis.

Fumaricum acidum 8X, ketoglutaricum 8x, Malonicum acidum 8X, Natrum pyruvicum 8X, Succinicum acidum 8X, Baryta oxalsuccinicum 10X
Componentes del ciclo de Krebs.
Pulsatilla pratensis 8X
Estimula las vicariaciones regresivas; efectos sobre el sistema simpático.
Adenosin triphosphoricum 10X
Factor intermediario importante en el metabolismo energético.
Manganum gluconicum 10X
Elemento huella, importante para el funcionamiento del ciclo de Krebs.
Nadidum 10X
Estimula las funciones enzimáticas.
Hepar sulphuris calcareum 10X
Factor regenerativo de las enzimas del grupo sulfidrilo.
Sulphur 30X
Acción detoxicante en casos de fases retóxicas.

Bhi Exhaustion®

Cinchona officinalis 4X
Agotamiento por pérdida excesiva de sangre o después de amamantar; gran debilidad; dolor generalizado del cuerpo; excesiva sensibilidad de todos los nervios; dolor intolerable en la parte inferior de la espalda.
Cocculus indicus 5X
Ataques de debilidad paralizante; debilidad de los músculos cervicales; imposibilidad de soportar el peso de la cabeza; vértigo.
Aletris farinosa 6X
Agotamiento con sensación de peso y aturdimiento en la cabeza; anemia con debilidad, especialmente en las mujeres, y proveniente de una alimentación inadecuada.
Citricum acidum 6X
Factor del ciclo del ácido cítrico; mejora la utilización del oxígeno.
Kali phosphoricum 6X, Phosphorus 6X
Estupor; apatía; letargo; agotamiento de tipo nervioso; pesadez dolorosa de todo el cuerpo.
Picricum acidum 6X
Gran debilidad con enorme deseo de acostarse; indiferencia; postración general, tanto física como mental.
Muriaticum acidum 8X
Gran debilidad después de fiebres bajas; se mejora un poco estando en cama; postración excesiva.
Sepia officinalis 12X
Agotamiento y tendencia a desmayarse en la mañana; gran apatía; desgano y aversión por todo tipo de trabajo.

Bhiey®

Euphrasia officinalis 6X
Conjuntivitis aguda o sub-aguda; descargas acuosas y purulentas de los ojos; fotofobia.
Kalmia latifolia 8X
Iritis reumática, escleritis; dolor que aumenta al mover los ojos; transtornos en la visión.
Rhus toxicodendron 8X
Ojos y párpados inflamados, hinchados y rojos; inflamaciones edematosas y pustulosas.
Staphysagria 8X
Afecciones de los párpados; orzuelos; oftalmia artrítica; ardor en los ojos, hundidos y con ojeras; chalazión.
Aethiops mercurialis mineralis 10X
Erupciones escrofulosas; hinchazón.
Apis mellifica 12X
Párpados hinchados y rojos; conjuntiva inflamada y edematosa; fotofobia.
Graphites 12X
Oftalmia escrofulosa; ardor, prurito, orzuelos.
Belladonna atropa 30X
Pupilas dilatadas; los ojos se sienten hinchados y con protrusión; conjuntiva enrojecida y seca.

Bhi Femm®

Pulsatilla nigricans 4D
Amenorrea; estimula la menstruación suprimida debido a pies húmedos; leucorrea acre, quemante y cremosa; dolor en la espalda.
Palladium metallicum 10D
Prolapso y retroversión del útero; menorragia; dolores en la espalda, y en particular en el lado derecho.
Sanguinaria canadensis 4D
Leucorrea fétida, corrosiva; menstruaciones profusas y dolorosas; pólipos uterinos.
Sepia officinalis 10D
Dolor en el útero; sensación de peso que se escapa en todos los órganos pélvicos; resequedad de la vagina y la vulva especialmente después de la menstruación.

Lilium tigrinum 5D
Menstruación adelantada, oscura y escasa; sensación de peso en la región uterina como si todos los órganos fueran a salirse por la vagina.
Sulphur 10D
Prurito en la región pudenda; ardor en la vagina; menstruación retardada; leucorrea profusa, amarillenta y corrosiva.
Apis mellifica 6D
Ovaritis, peor en el ovario derecho; especialmente en chicas con menstruaciones suprimidas aparecen síntomas cerebrales y en la región de la cabeza.
Lachesis mutus 12D
Trastornos propios del climaterio; fogonazos, metrorragia; dolor agravado por la simple presión de la ropa; menstruación irregular.
Cocculus indicus 6D
Menstruación oscura y profusa; dismenorrea; menstruaciones adelantadas con coágulos y cólicos espasmódicos, leucorrea.
Oophorinum 12D
Trastornos propios del climaterio; quistes ováricos.

Bhi Flu Plus®

Aconitum napellus 4X
Fiebre; escalofríos al atardecer; sudores calientes y profusos; piel brillante, caliente e hinchada; gran ansiedad y desasosiego.
Bryonia alba 4X
Fiebres intermitentes; gran debilidad y agotamiento; sed insoportable; dolor desde el despertar en las mañanas; todos los síntomas se empeoran con el movimiento.
Eupatorium perfoliatum 4X
Fiebres catarrales y biliares; dolor de cabeza; influenza con mucha estornudadera; fiebre con perspiración escasa; dolor en todos los huesos.
Ipecacuanha 6X
Náuseas y vómitos persistentes; acumulación profusa de saliva; rigidez en todo el cuerpo; diarrea.
Pulsatilla 6X
Ardor y rasquiña en los ojos; estornudos frecuentes; pérdida del olfato y del gusto; sed insaciable; náusea matutina.
Mercurius corrosivus 8X
Tiene efectos antivirales contra las supuraciones e inflamaciones de las membranas mucosas.
Phosphorus 8X
Fiebre de tifo; neumonía; bronquitis; escalofríos con temblor, sin sed; tos seca.
Sulphur 8X
Vértigo; jaqueca con presión, especialmente en las mañanas; calor y ardor en la cara; debilidad.
Influenzinum 12X
Efecto símil contra infecciones gripales.
Lachesis mutus 12X
Debilidad de todo el cuerpo desde el momento de levantarse en la mañana; la tos se empeora después del sueño; frío en la espalda; dolor en los oídos; garganta con dolor.
Zincum gluconicum 3X
Componente de las células y fluídos tisulares; importante para el curso normal de numerosos procesos metabólicos (grupo prostestico de la carboanhidrasa, fosfatasas tisulares, insulina).
Zincum metallicum 3X
Irritaciones del sistema nervioso central y periférico como, por ejemplo pseudomeningitis, neuralgias, inquietud de las piernas, espasmos. Trastornos gastrointestinales de tipo nervioso. Trastornos nerviosos en la micción. Dismenorrea (menstruación copiosa y adelantada).
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200CK
Obstrucción nasal y estornudos.

Bhiceld®

Belladonna atropa 8X
Hipo espasmódico; dolores en la región del epigastrio; distensión abdominal dolorosa.
Chelidonium majus 8X
Ictericia producida por cálculos biliares y cólicos de la vesícula biliar; la lengua se encuentra cubierta de un velo amarillento en el cual se demarcan las huellas de los dientes; deposiciones de color amarillo barroso; orina de color amarillo oscuro; dolores en el omóplato derecho.
Cinchona officinalis 8X
Retención de gases en el estómago; neuralgia y mareos al levantarse de la cama.
Veratrum album 8X
Cólico, como si se estuvieran retorciendo los intestinos; hambre violenta; sed excesiva.
Calcarea carbonica 10X
Crecimiento del hígado; ictericia; expulsión de cálculos biliares; abdomen endurecido.
Cholesterinum 10X
Ruidos producidos por gases hepáticos obstinados.

Lycopodium clavatum 10X
Dolor contundente en la región hepática; abdomen distendido por flatulencia; cólicos biliares.

Inko Bhi®

Ginkgo biloba 2X
Vértigo, temores irracionales, insuficiencia vascular generalizada del cerebro.
Baryta carbonica 8X
Síntomas diversos de la infancia y la vejez; pérdida de la memoria; debilidad mental.

Bhihairskin®

Galium aparine 6X
Promueve las vicariaciones regresivas.
Ignatia amara 6X
Depresiones con pérdida del cabello; prurito que mejora al rascar levemente.
Lycopodium clavatum 6X
Prurito en las "manchitas hepáticas"; urticaria crónica; tumores vasculares.
Thuja occidentalis 6X
Epitelioma; úlceras en la región anogenital; piel reseca con manchas marrones; pérdida de cabello y horquilla; resquebrajamiento de las uñas; excrecencias en forma de verrugas, especialmente en manos y en los genitales.
Urtica urens 6X
Urticaria; estimula el crecimiento del cabello; formicación (hormigueo).
Phosphoricum acidum 8X
Pérdida del cabello debido especialmente a estados de ansiedad y depresiones; hormigueo de todo el cuerpo.
Arsenicum album 10X
Piel con ardor y prurito; piel escamosa, reseca y áspera que se agrava con el frío y el rascarse; urticaria.
Natrum muriaticum 12X
Vejigas producidas por la fiebre, erupciones herpéticas, especialmente en los labios; porciones agrietadas en la boca; urticaria, erupción o eczema; caspa y seborrea; dermatitis.
Selenium 12X
Debilidad y pérdida del cabello después de haber pasado por una enfermedad agotadora; pérdida del cabello en cejas, barba genitales; alopecia, seborrhea oleosa.

Cabdol Bhi®

Cimicifuga racemosa 4X
Neuralgia en relación con osteocondritis; migraña cervical; dolores severos en la cabeza y en los ojos.
Gelsemium sempervirens 4X
Neuralgias, migrañas; dolores de cabeza provocados por desplazamientos en la columna vertebral.
Rhus toxicodendron 4X
Reumatismo; neuralgias; se agravan los síntomas antes de tiempo lluvioso y se produce rigidez al moverse; hay mejoría al continuar el movimiento.

Hert Bhi®

Cactus grandiflorus 4X
Endocarditis con insuficiencia mitral; debilidad cardíaca propia de la arterioesclerosis; sensación de constricción en el corazón; palpitaciones fuertes del corazón; dolores que se irradian a lo largo del brazo izquierdo; irregularidad de la acción cardíaca.
Kali carbonicum 6X
Palpitaciones violentas y ardor del corazón; latidos cardíacos intermitentes.
Gelsemium sempervirens 10X
Sensación como si la actividad cardíaca fuera a detenerse; latidos irregulares; pulso lento.
Sulphur 12X
Palpitaciones y ansiedad; empeora en la noche, en la cama; pulso acelerado.
Glonoinum 6X
Angina pectoris; acción cardíaca violenta; pulsaciones diferentes en todo el cuerpo; dolores agudos del corazón; pulso intermitente.
Spigelia anthelmia 8X
Dolor precordial; palpitaciones audibles; temblor cardíaco, agravado por el movimiento.
Ranunculus bulbosus 10X
Neuralgia de los nervios intercostales; sensación de que el corazón está afectado; dolor en el pecho.
Arnica montana 30X
Estimula al corazón luego de haber sufrido un sobreesfuerzo; angina pectoris.

Emord Bhi®

Aesculus hippocastanum 4X
Sensación en el recto como si estuviera lleno de pequeños palillos; - dolor, ardor, prurito y sensación de llenura en el recto y el ano.
Aloe socotrina 4X
Calor, dolor y pesadez en el recto y ano.
Collinsonia canadensis 4X
Estreñimiento; deposiciones claras y aterronadas con esfuerzo, seguidas de dolores sordos en el ano e hipogastrio; diarrea, descarga mucosa y sanguinolenta; tenesmo muy fuerte y punzante.
Nux vomica 5X
Hemorroides ciegas; dolor pulsante y opresivo en recto y ano.
Leptandra virginica 6X
Deposición fétida, profusa y negra; primero dura, negra y aterronada, luego pulposa.
Muriaticum acidum 6X
Prolapsos anales al orinar; protrusiones hemorroidales, como un racimo de uvas, hinchadas y azulosas.
Paeonia officinalis 6X
Síntomas importantes a nivel rectal y anal.
Sulphur 10X
Ardor y presión en el recto durante la deposición.

Bhifection®

Echinacea angustifolia 3X
Condiciones sépticas en general; sepsis puerperal; gangrenas; envenenamiento de la sangre.
Echinacea purpurea 3X
Factor de antisupuración.
Mercurius solubilis H 8X
Inflamaciones glandulares con o sin supuración; temblor involuntario de los músculos voluntarios; sudoración fría; abscesos de lenta supuración; estados de hidropesía con agotamiento.
Hepar sulphuris calcareum 10X
Estimula la supuración; sensibilidad extrema al tacto; dolores agudos como si se estuvieran astillando los huesos.

Bhi Flamm®

Echinacea purpurea 2D
Inflamaciones de todo tipo con desarrollo séptico.
Dulcamara solanum 6D
Inflamaciones catarrales y reumáticas; síntomas agravados con tiempo frío y húmedo.
Belladonna atropa 4D
Inflamaciones violentas e intensas; inflamaciones glandulares agudas; dolores de cabeza congestivos; inflamaciones de los ojos; dolor punzante.
Phytolacca decandra 6D
Inflamaciones de tejidos mucosos y glandulares con tendencia a la supuración.
Bryonia alba 5D
Inflamaciones serosas; meningitis; sinovitis; estimula la exudación; pleuritis.
Pulsatilla nigricans 6D
Afecciones catarrales con descargas espesas de color verde-amarillento; coriza aguda; otitis media.
Arnica montana 6D
Inflamaciones ocasionadas por heridas, raspaduras y contusiones, inflamaciones sépticas.
Rhus toxicodendron 6D
Inflamaciones de la piel, de las membranas mucosas, de las articulaciones y de los músculos.
Thuja occidentalis 6D
Sensibilidad constitucional al clima frío y húmedo.
Argentum nitricum 8D
Inflamación y ulceraciones de las membranas mucosas.
Arsenicum album 10D
Gran agotamiento; condiciones gastroentéricas; tendencia a las inflamaciones gangrenosas.
Hepar sulphuris calcareum 10D
Estimula las supuraciones; inflamaciones crupales, especialmente del tracto respiratorio.
Mercurius solubilis 10D
Abscesos de supuración lenta; inflamaciones catarrales reumáticas; condiciones óticas.
Lachesis mutus 12D
Debilidad de todo el cuerpo desde el momento de levantarse en la mañana; se siente la necesidad de llevar la ropa muy suelta.
Pyrogenium 12D
Septicemia; fiebres sépticas; piogénesis latente.
Staphylococcinum 12D
Contra los efectos del estafilococo.
Streptococcinum 12D
Contra los efectos del estreptococo.
Influenzinum 15D
Influenzas o gripes infecciosas.

Bhinjury®

Aconitum napellus 4X
Irritaciones arteriales; dolores agudos; inflamaciones; fiebre alta.
Calendula officinalis 4X
Dolores abrumadores con severo enrojecimiento alrededor de las contusiones; supuraciones.
Echinacea angustifolia 4X
Antiinflamatorio; tromboflebitis.
Hamamelis virginiana 4X
Equimosis dolorosas; inclinación al embolismo.
Arnica montana, radix 4X
Lesiones y heridas; excitación de los capilares; hemorragias.
Chamomilla matricaria 4X
Hipersensibilidad al dolor; lesiones de la piel; dificultad para cicatrizar.
Echinacea purpurea 4X
Antiinflamatorio.
Hypericum perforatum 4X
Lesiones de los nervios; dolores agudos en todas partes como si hubiera luxaciones generalizadas.
Aristolochia clematitis 6X
Estasis venosa.
Symphytum officinale 5X
Fracturas; causalgia.
Belladonna atropa 6X
En contra de inflamaciones localizadas; hematomas.
Bellis perennis 6X
Sensación de trituración en los músculos; rigidez muscular; raspaduras; torceduras.
Rhus toxicodendron 6X
Antiinflamatorio y antireumático.
Millefolium 6X
Hemorragias arteriales; lesiones arteriales.
Veratrum album 10X
En situaciones de schock.
Hepar sulphuris calcareum 10X
Efecto antisupurativo; regeneración de las enzimas súlfidas.
Carbo vegetabilis 12X
Contra los efectos de un schock.
Mercurius solubilis 12X
Contrasupuraciones, abscesos, inflamaciones; efecto antiviral.
Arsenicum album 15X
Contra efectos tóxicos.
Sulphur 30X
Reactivación del sistema de defensa; fiebres; en enfermedades en general.

Bhi inte®

Bryonia alba 5X
Inflamaciones graves (pleuritis, peritonitis, meningitis, etc.), apendicitis aguda (operable) o apendicitis crónica. En ambos casos se puede ayudar bastante con este medicamento; estreñimiento, deposición dura y negruzca.
Colocynthis 5X
Contra espasmos y retortijones, especialmente luego de irritaciones de tipo emocional.
Lycopodium clavatum 5X
Estimula las funciones hepáticas.
Nux vomica 5X
Enfermedades intestino-estomacales; espasmos, dispepsias, cardialgias y sensaciones de hartura; empeora en la mañana y después de consumir alcohol, nicotina o estimulantes; presión inútil para defecar.
Mercurius corrosivus 6X
En contra de las inflamaciones de la mucosa y diarreas.
Sulphur 10X
Estimula reacciones curativas y vicariaciones regresivas.

Bhi Kidney®

Solidago virgaurea 4X
Dolor en la región renal; disuria; sensibilidad a la presión.
Ammi visnaga 6X
Disfunción renal y cólico.
Berberis vulgaris 6X
Orina con sedimento pastoso; dolores cortantes intensos en la región renal.
Citricum acidum 6X
Factor componente del ciclo del ácido cítrico (ciclo de krebs).
Pareira brava 6X
Cólico renal doloroso bajo los muslos; hipertrofia prostática; micción dolorosa; apremio constante que crea esfuerzo durante el acto de orinar; goteo después de orinar.
Cantharis vesicatoria 8X
Orina sanguinolenta con tenesmo; urgencia casi intolerable de orinar.
Hepar sulphuris calcareum 8X
Hidronefrosis y supuraciones en el sistema renal: fluido urinario intermitente.

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

Nitricum acidum 8X
Orina sanguinolenta y albuminosa; olor intolerablemente fuerte, como si fuera orina de caballo.
Mercurius solubilis 10X
Orina de color rojizo oscuro; hidronefrosis.
Arsenicum album 30X
Orina albuminosa con células epiteliales y glóbulos sanguíneos; orina escasa.

Bhi Liver®

Cinchona officinalis 4X
Disturbios en la fisiología hepática e irritación del sistema biliar; endurecimiento hepático y del bazo, que se hallan hinchados y sensibilizados; cálculos biliares y cólico; digestión lenta; flatulencia; ictericia.
Leptandra virginica 6X
Deposiciones profusas y negras como brea; vómito biliar; lengua con recubrimiento amarillento; dolores punzantes en la región hepática.
Cynara scolymus 8X
Estimula las funciones hepáticas y la digestión.
Fel tauri 8X
Digestión desordenada; dolor en la nuca; cálculos biliares; ictericia.
Galium aparine 8X
Estimula las vicariaciones regresivas.
Lycopodium clavatum 8X
Gran medicamento para el hígado; sensación de tener algún cuerpo extraño en la región izquierda del abdomen; sensación de producirse procesos de fermentación en la región superior izquierda del abdomen; sabor agrio extendiéndose hacia el estómago; presión en la región estomacal.
Phosphorus 10X
Hematuria con dolor agudo en la región del hígado y de los riñones; produce ansiedad al estar acostado sobre el lado izquierdo por la noche; degeneración adiposa del hígado.
Sulphur 10X
Dispepsia y trastornos gástricos; sensación de vacío en el estómago alrededor de las 11 A.M.; dispepsia al ingerir leche; endurecimiento del hígado.
Niccolum Metallicum 12X
Gastralgias agudas que se extienden hacia el hombro; secreciones agrias y fétidas; el consumo de leche trae diarreas y tenesmo.

Bhilymp®

Equisetum hyemale 5X
Estimula las funciones del sistema urinario.
Myosotis arvensis 5X
Expectoración muco-purulenta profusa; tos bronquial; náuseas y vómito con tos.
Scrophularia nodosa 5X
Glándulas linfáticas hinchadas.
Teucrium scorodonia 5X
Catarros bronquiales.
Veronica beccabunga 5X
Bronquitis crónica y dermatosis.
Fumaria officinalis 6X
Previene situaciones homotóxicas; purificador de la sangre; mejora las funciones hepáticas; eczemas.
Gentiana lutea 6X
Tonificante general; incrementa el apetito.
Geranium robertianum 6X
Ulceraciones; hemorragias; uropatías.
Nasturtium aquaticum 6X
En afecciones hepáticas y de la vejiga.
Natrium sulphuricum 6X
Estimulante constitucional.
Pinus sylvestris 6X
Rinitis; demacración; condiciones escrofulosas.
Juglans regia 8X
Acné; crusta lactea; trastornos de la piel.
Sarsaparrilla 8X
Cólicos renales; dolores del periostio.
Aranea diadema 10X
Sensibilidad a los cambios de clima.
Calcarea phosphorica 12X
Anemia; síntomas que empeoran con los cambios de tiempo y de clima.
Ferrum iodatum 12X
Edemas escrofulosos.
Glandula thyroidea 12X
Ayuda a balancear el metabolismo.
Tuberculinum 15X, Vaccininum 15X, Variolinum 15X
Tres tipos de nosodes indicados en todos los casos de glándulas linfáticas hinchadas, en eczemas y en estados tóxicos.

Bhimale®

Agnus castus 4X
Estimula la vitalidad sexual; los testículos se sienten hinchados y fríos; pene fláccido y pequeño; impotencia con blenorrea.
Picricum acidum 6X
Erecciones nocturnas graves; sueño intranquilo; gran deseo con eyaculaciones nocturnas; priapismo casi constante.
Cinchona officinalis 4X
Debilidad después de eyaculaciones frecuentes y orquitis; después de pérdida de sangre.
Orchitinum 8X
Efecto estimulante específico sobre el sistema hormonal masculino.
Lycopodium clavatum 4X
Estimula la erección en casos de impotencia; pene pequeño, frío, relajado; prurito en el escroto; afecciones prostáticas.
Sepia officinalis 10X
Descargas (flujos) de la uretra después de gonorreas; condilomas en el pene.
Petroselinum sativum 4X
Ardor, cosquilleo y prurito en los genitales; gonorreas sub-agudas; blenorreas; priapismo con curvatura del pene.

Bhi Mens®

Aceticum acidum 4D
Metrorragias; hemorragias después del parto; senos engrosados y distendidos con leche; la leche materna tiene un color azulado, con olor y sabor amargos.
Lilium tigrinum 6D
Menstruación adelantada; prurito vaginal; leucorrea; dolores agudos en la región ovárica.
Pulsatilla nigricans 4D
Amenorreas; menstruación retardada, escasa, gruesa, oscura, con cóagulos e intermitente; leucorrea acre; diarreas durante o después de la menstruación.
Kreosotum 8D
Leucorrea amarillenta, acre, que empeora entre los períodos; hemorragias post-coito.
Caulophyllum thalictroides 6D
Menstruaciones dolorosas; irritación.
Asterias rubens 10D
Cistitis con moco y pus copiosos; excitación de los instintos sexuales con fuerte agitación nerviosa.
Hydrastis canadensis 6D
Leucorreas; erosión y excoriación del cérvix; flujo espeso, pegajoso y amarillento; ulceraciones del cérvix y de la vagina; prurito vulvar; excitación sexual; crecimientos fungosos; hipertrofia de las membranas mucosas.
Mercurius iodatus flavus 10D
Leucorrea amarillenta, especialmente en muchachas.
Thuja occidentalis 12D
Ardor y escozor en los genitales; menstruaciones muy rápidas y cortas; dolores ováricos en la parte izquierda con agravación violenta durante la menstruación; fatiga y senos sensibilizados.

Bhimigrain®

Cinchona officinalis 4X
Dolor de cabeza después de pérdida de sangre; vértigo; mejoría al estar acostado.
Condurango 4X
Dolores constitucionales.
Pulsatilla nigricans 4X
Punzadas y dolores que migran por la cabeza, se extienden hacia la cara y los dientes; vértigo.
Aceticum acidum 6X
Dolores de cabeza nerviosos.
Arsenicum album 6X
Dolores de cabeza que mejoran con el frío; otros síntomas, en cambio, empeoran con el frío.
Asafoetida 6X
Dolores como dardos en las caries y huesos; periostio doloroso, engrosado, e hinchado con úlceras; caries en los huesos de la estructura sal.
Lycopodium clavatum 6X
Estimula la detoxicación hepática y la eliminación de homotoxinas.
Natrum sulphuricum 6X
Dolor occipital y vértigo; sensación de algo que taladra en la sien derecha.
Phosphoricum acidum 6X
Cabeza con pesadez y confusa, se empeora al moverla o con ruido; dolores de cabeza intensos, en los que se siente crujir la cabeza; dolores periostiales.
Secale cornutum 6X
Dolores de cabeza y migrañas; insomnio con desasosiego; sueños con ansiedad; palidez en la cara con dolor congestivo; todas las condiciones de Secale mejoran con el frío (contrariamente a lo que sucede con las Arsenicum album); sed excesiva; espasmos de los músculos del abdomen.

Aranea diadema 8X
Periodicidad de todos los síntomas; frío y gran susceptibilidad a la humedad.
Kalmia latifolia 8X
Dolores rápidamente cambiantes; dolores reumáticos; neuralgias.
Strychninum nitricum 8X
Hiperirritabilidad y desasosiego con fuerte dolor de cabeza y calor en los ojos.
Calcarea phosphorica 10X
Dolores de cabeza, que empeoran en la región de suturas y con cambios climáticos.
Carbo vegetabilis 10X
Dolores al colocar un sombrero sobre la cabeza, sintiéndose como si fuera un gran peso.
Curare 10X
Dolores lancinantes en toda la cabeza; la cabeza tiende a irse hacia atrás; sensación de que el cerebro está lleno de líquido.
Mercurius praecipitatus 10X
Sensibilidad extrema del periostio; tendencia a la inflamación periostial con dolores.
Silicea terra 10X
Dolores que empiezan en la región occipital, se irradian por la cabeza y se localizan encima de los ojos, especialmente del lado izquierdo. Mejoran con compresas calientes.
Uranium nitricum 12X
Es uno de los elementos-huella importantes.
Bryonia alba 30X
Dolores de cabeza explosivos y agudos, como si todo el contenido del cráneo fuese a ser expulsado; se empeora con el movimiento.

Bhi Mulimen®

Agnus cactus 3D
Agotamiento y debilidad en general; depresión y abatimiento; cólicos en la región abdominal.
Cimicifuga racemosa 4D
Espasmos en la región de los órganos sexuales; dolores asociados con el ciclo menstrual; embarazo y menopausia; excitación nerviosa y temperamento depresivo; neuralgia pélvica.
Hypericum perforatum 3D
Retraso de la menstruación con tensión dolorosa en la región del útero; diarrea premenstrual, dolores de cabeza y de espalda; irritabilidad y temperamento variable.
Gelsemium sempervirens 4D
Fatiga y agotamiento; sentimientos de abatimiento; astenia; contracciones musculares; trastornos cardíacos acompañados frecuentemente de diarrea, como resultado de excitación emocional (miedo o ansiedad); dolor neural en la región craneana; calambres; dismenorrea; retraso y/o ausencia del período.
Urtica urens 3D
Retención premenstrual de líquido en los tejidos; hinchazón edematosa, v.g. en las piernas; manchas rojas en la piel en forma de urticaria, acompañadas de ardor y prurito; menorragia.
Kali carbonicum 4D
Debilidad circulatoria; parestesia; sofocación; contracciones y demás trastornos musculares; fatiga y agotamiento; tendencia a los desmayos; agotamiento con dolores de espalda; sueño intranquilo con pesadillas; fatiga durante el día; ansiedad con trastornos cardíacos; irritabidad e impaciencia; nerviosismo en los movimientos y en el habla; tendencia a ser asustadiza; hinchazón glandular; sensibilidad extrema al frío; neuralgia craneana; trastornos de las vías respiratorias; oligomenorrea; períodos prematuros o retrasados, acompañados frecuentemente de estreñimiento; hemorragia uterina; tendencia a edematizar.
Ambra grisea 4D
Trastornos funcionales, principalmente en el sistema nervioso autónomo; menorragia posterior a esfuerzo físico o excitación; insomnio debido a preocupaciones; intranquilidad e inquietud acompañadas de dificultades respiratorias; taquicardia y flujos; fluor albus; tendencia a flujos intermenstruales.
Calcarea carbonica 8D
Trastornos antes y durante la menstruación; irritabilidad y dolores de cabeza al iniciarse la ovulación; debilidad del tejido conectivo; desórdenes en el metabolismo del calcio; afecciones en la piel y las mucosas; tendencia exagerada a sacrificarse por otros.
Sepia officinalis 8D
Desasosiego e indisposición; indiferencia y apatía, v.g. con respecto a lo profesional o a la familia; baja tolerancia con respecto a la frustración y al fracaso; falta de entusiasmo y de gusto por la vida; irregularidades menstruales, principalmente en forma de amenorrea o escasez y retraso en los períodos con trastornos premenstruales; vómitos frecuentes durante el embarazo; debilidad en el tejido conectivo pélvico; prolapso del útero; flujo climatérico; estos síntomas frecuentemente en conjunción con estreñimiento.

Bhi Nau®

Anacardium orientale 6X
Tiene un gran efecto en casos de hiperirritabilidad del sistema simpático; el síntoma central se mejora al comer. Los síntomas más característicos son: dispepsia, pérdida de la memoria, depresiones, intermitencia de los síntomas, urgencia irresistible de perjurar y de maldecir. Pequeñas vejigas en la boca con olor fétido, ardor como si proviniera de la pimienta. Punzadas en la región cardíaca. Erupciones vesiculares en los dedos; urticaria; dolores en el estómago que se extienden al corazón.

Ipecacuanha 6X
Vómito y náuseas persistentes; lengua limpia; afecciones espasmódicas, tos con la sensación de que el estómago se revuelve; hemorragias uterinas profusas; tosferina; hemóptisis.

Argentum nitricum 8X
Dolor punzante en el lado izquierdo del estómago con ulceraciones; gran deseo de comer dulces; gastroenteritis; errores en la percepción; impaciencia.

Robinia Pseudocacia 10X
Hipercloridia con acidez y síntomas gástricos; eructos intensos y acres.

Carbo vegetabilis 12X
Circulación capilar insuficiente trayendo consigo cianosis, frío y equimosis; el cuerpo entero se siente helado.

Iodum 2X
Siempre con hambre y con sed.

Sepia officinalis 30X
Sistema portal congestionado; sensación de peso abdominal que va a escaparse; las mujeres cruzan las piernas como para evitar que sus entrañas sean expulsadas; sensación de preñez; flujos espesos y verdosos; taponamiento y costras en la nariz; recubrimiento amarillento atravesando la nariz; catarros nasales crónicos; catarros uretrales crónicos; leucorrea verde-amarillenta.

Bhi Neralgia®

Spigelia anthelmia 8X
Dolor de cabeza semilateral incluyendo el ojo izquierdo; dolor pulsante violento.

Gelsemium sempervirens 10X
Parálisis de algunos grupos de nervios; vértigo extendiéndose desde el occipucio.

Kali bichromicum 10X
Neuralgia y dolor de cabeza precedido de visión borrosa, mareo.

Thuja occidentalis 10X
Dolores lancinantes.

Silicea terra 12X
Dolor de cabeza que empieza en la región del occipucio, cubre la cabeza y se fija encima de los ojos; deseo de envolver la cabeza con algo caliente; neuralgias.

Stannum metallicum 12X
Dolor de cabeza de tipo neurálgico en la región temporal, el dolor empeora con el movimiento, crece y decrece como si se tuviera amarrada una banda ajustable alrededor de la cabeza.

Theridion 12X
Hiperestesia nerviosa; vértigo.

Belladonna atropa 30X
Palpitación, dolor, sensación de congestión, especialmente en la frente.

Bhipanc®

Leptandra virginica 6X
Lengua con recubrimiento amarilloso; deposiciones profusas, negras, fétidas y de tipo tifoideo; dolores de cabeza de origen biliar; estreñimiento; sabor amargo en la boca.

Momordica balsamina 6X
Dolores con acumulación de gases en la flexión esplénica del colon.

Ceanothus americanus 8X
Lado izquierdo del abdomen distendido y enorme.

Podophyllum peltatum 8X
Condiciones biliares en general; región hepática muy adolorida; cálculos biliares, cólicos con ictericia.

Carbo vegetabilis 10X
Flatulencia excesiva en el estómago y los intestinos; eructos; dispepsia; exceso en el consumo de comida sazonada y dulce.

Lycopodium clavatum 10X
Acumulación de excesiva flatulencia en el abdomen; síntomas agravándose de 4 a 8 P.M.

Mercurius iodatus flavus 10X
Base de la lengua con recubrimiento amarillo que deja ver las impresiones de los dientes.

Pancreatinum 10X
Efecto de reversión en afecciones pancreáticas.

Lachesis mutus 12X
Abdomen adolorido y sensible; se agrava con la presión de la ropa; dispepsia; gastralgia.

Bhi Perspiration®

Salvia officinalis 4X
Transpiración colicuativa.
Sambucus nigra 4X
Fiebre acompañada de fogonazos y sofocación; perspiración profusa.
Pilocarpus jaborandi 5X
Contra la hiperhidrosis; perspiración durante la convalecencia de una enfermedad aguda; fogonazos propios del climaterio.
Cedron 6X
Neuralgias con transpiración; espasmos histéricos a horas fijas.
Nitricum acidum 6X
Fogonazos; sudoración de las manos; sudoración nocturna profusa y de mal olor; sudoración matutina.
Petroleum 6X
Transpiración axilar; sudoración profusa y fétida de los pies.
Sanguinaria canadensis 6X
Perspiración con fogonazos; onda de calor por todo el cuerpo.
Thuja occidentalis 6X
Transpiración de las partes cubiertas del cuerpo; perspiración de los pies; sudoración nocturna profusa que mancha la ropa de amarillo.
Salicylicum acidum 8X
Sudoración severa.
Sulphuricum acidum 8X
Perspiración profusa con gran debilidad; fogonazos.
Calcarea carbonica 10X
Pies fríos con transpiración; sudor de las palmas de las manos.
Sepia officinalis 10X
Sudor con olor desagradable en los pies causando dolor entre los dedos; sudoración profusa al más leve movimiento.

Bhiprost®

Petroselinum sativum 4X
Dolor y prurito intenso de la uretra; priapismo con curvatura del pene.
Populus tremuloides 4X
Dispepsia y catarro vesical en pacientes de edad madura.
Sabal serrulata 4X
Irritabilidad de los órganos genitourinarios; micción difícil debida a cistitis con hipertrofia prostática.
Chimamphyla umbellata 5X
Engrosamiento prostático con sedimento mucopurulento; orina escasa.
Kreosotum 6X
Orina de olor fuerte, desagradable con prurito intenso; enuresis en la primera parte de la noche.
Succinicum acidum 8X
Componente del ciclo de Krebs; mejora la utilización del oxígeno.
Hepar sulphuris calcareum 10X
Debilidad vesical; fluido de orina intermitente; las gotas caen verticalmente sin fuerza, descargas del líquido prostático.
Conium maculatum 30X
Descargas interrumpidas; próstata endurecida como una piedra; descargas de líquido prostático con cada cambio de posición.

Bhirecov®

Arnica montana 6X
Tónico para el corazón y las arterias; dolor en la región cardíaca como si estuvieran exprimiendo el corazón; punzadas en la región cardíaca; pulso intermitente, débil.
Belladonna atropa 8X
Congestión en las arterias cerebrales; pulsaciones en el cerebro; punzadas como de un cuchillo atravesando de una siena a la otra; pulso muy acelerado.
Melilotus officinalis 8X
Congestión sanguínea en la cabeza, mejorando después de hemorragia nasal; eclampsia puerperal, hemóptisis; sangre de color rojo vivo; dolor de cabeza frontal intenso; epistaxis; sensación de ahogo, no se logra recibir suficiente aire.
Gelsemium sempervirens 3X
Vahidos en la cabeza y vértigo con una sensación de borrachera; parálisis nerviosa; deterioro en el habla; dificultad al tragar; debilidad muscular.
Carbo vegetabilis 10X
Colapso circulatorio; pulso filiforme, débil y lánguido; fuerzas vitales casi agotadas; atrofia, sensación de frío en todo el cuerpo; complexión cetrina.
Lachesis mutus 12X
Respiración entrecortada; dolores como calambres en la región cardíaca; pulso irregular; gran agotamiento en las mañanas; ansiedad.

Bhi Rendimax®

Llex aquifolium 2X
Punzadas en el costado.

Oleander 5X
Debilidad de los miembros inferiores; disminución de la energía; piernas temblorosas.
Arnica montana radix 7X
Consecuencias del sobreesfuerzo; sensación de dolor y magulladura; calambre muscular; dolores en la espalda y los miembros; torceduras en las articulaciones; todo tipo de fatiga.
Orchitinum 10X
Estados de agotamiento, eleva el nivel de vitalidad.
Sarcolacticum acidum 11X
Dolores, sensación de cansancio en el cuello, los hombros y la espalda; calambres y rigidez en los muslos y las pantorrillas; debilidad en los brazos; debilidad muscular extrema y postración (adinamia).

* La base de **Bhi Rendimax®** es una combinación de lactosa y dextrosa saborizada con ácido cítrico. La dosis normal es de hasta 5 tabletas antes, durante o después de ejercicio físico.
Las tabletas de **Bhi Rendimax®** pueden ser tomadas cada 15 minutos.

Bhi Restorative®

Causticum 8X
Parálisis post accidente cerebro-vascular, especialmente del lado derecho; condiciones paralíticas de algunas partes del cuerpo: cara, párpados, labios, lengua; parálisis a consecuencia de reumatismo; inflamaciones artríticas; fuerte dolor con presión en el dedo gordo del pie; crujir de las rodillas al caminar.
Gelsemium sempervirens 8X
Parálisis después de accidente cerebrovascular; parálisis post diftérica; reumatismo neurálgico; parálisis de los músculos laríngeos; dolores en general; tremor.
Plumbum metallicum 30X
Dolores violentos en las extremidades, especialmente en los músculos de los muslos; temblor de las manos; debilidad paralítica de las extremidades; sensibilidad disminuída en el lado derecho del cuerpo.

Bhisciat®

Colocynthis citrullus 5X
Dolor desgarrador agravado por estados de ira e indignación; mejora con calor y presión firme sobre los miembros afectados.
Gnaphallium polycephalum 5X
Específico en ciáticas, para los dolores y la pérdida de sensibilidad en la espalda, las caderas y las extremidades.
Ammonium muriaticum 6X
Ciática empeorando al sentarse, mejorando al permanecer acostado; dolores desgarradores en las extremidades.
Gelsemium sempervirens 6X
Parálisis de varios grupos de músculos.
Rhus toxicodendron 8X
Dolores desgarradores en los tendones, ligamentos y aponeurosis con rigidez; dolor en los cóndilos.
Arsenicum album 10X
Espasmos, pesadez y calambres en las pantorrillas; ciática y neuritis - periférica así como dolores con ardor durante la noche; afecciones reumáticas.
Chamomilla recutita 10X
Dolores reumáticos tan fuertes que sacan al paciente de la cama en las noches.

Bhi Sin®

Pulsatilla nigricans 4X
Coriza; moco amarillo; congestión nasal; bloqueo de las fosas nasales.
Thuja occidentalis 6X
Moco crónico, espeso y verdoso por catarro con pus y sangre.
Euphorbium officinarum 6X
Presión violenta en la cabeza y en los senos nasales y paranasales; erisipelas; prurito nasal con secreción mucosa producidos por presión naso-faríngea y con sensación de ardor en las mejillas.
Kali iodatum 8X
Descarga nasal de carácter irritativa, con consistencia acuosa o verdosa desagradable; fauces rojas, ásperas e inflamadas; descarga bucal y de la garganta; coriza con obstrucción de la garganta.
Hydrastis canadensis 6X
Secreción continua y gruesa de la parte posterior de la garganta.
Phosphorus 8X
Periostitis de los huesos nasales.
Kali bichromicum 6X
Tos seca; expectoración amarilla profusa; fauces enrojecidas, ásperas e inflamadas; descargas de boca y garganta; coriza con obstrucción - nasal.
Mercurius sulphuratus ruber 10X
Sensación de presión en la nariz, especialmente en la base, y extendiéndose a los huesos de cada lado; moco fibroso que pasa de los orificios nasales posteriores hacia la garganta.
Influenzinum 10X
Estimula efectos antihomotóxicos de reversión en casos de enferme-

dades respiratorias y sinusitis.

Bhiskin®

Berberis vulgaris 6X
Cara congestionada con parches rojos o granos; ampollas con prurito; eczemas en el ano y las manos y pigmentación parda posterior al eczema.
Rhus toxicodendron 8X
Vesículas; herpes; inflamaciones de tipo erisipelatoso; piel áspera y escoriada; salpullido rojizo en todo el cuerpo.
Arsenicum album 10X
Erupción escamosa; piel reseca y áspera, se empeora después de rascarse y con el frío; descamación de todo el cuerpo; carbunclos.
Graphites 10X
Eczemas en la parte interior del codo; herpes zoster; impétigo; prurito que empeora con el calor.
Hydrofluoricum acidum 10X
Ulceraciones que mejoran con el frío; alopecia areata; resquebrajamiento de las uñas.
Kreosotum 10X
Pústulas y herpes; equimosis; eczemas en las superficies dorsales de los dedos.
Petroleum 10X
Sabañones; piel reseca y áspera; prurito y ardor en las noches; eczema húmedo crónico.
Sepia officinalis 10X
Eczemas que no se alivian al rascar; erupciones herpéticas alrededor de la boca y la nariz; urticaria que mejora en habitaciones calientes.
Lycopodium clavatum 12X
Eczemas agudos y crónicos; erupciones supurantes húmedas; urticaria crónica; nevus maternus.
Sulphur 12X
Eczemas; prurito; ardor después de rascarse; erupciones vesiculares y herpéticas; formicación en todo el cuerpo; úlceras sangrantes con los bordes sobre salientes e hinchados.

Bhi Spasm Pain®

Aconitum napellus 4X
Enfermedades agudas con excitación, fiebre, dolores, inflamación.
Bryonia alba 4X
Inflamaciones con dolores agudos, especialmente al moverse, dolores abdominales e inflamaciones.
Colocynthis 4X
Dolores agudos y punzantes.
Atropinum sulphuricum 6X
Dolores sordos en la parte posterior del cráneo y encima de los ojos, empeorando con el movimiento; dolores neurálgicos en los ojos y alrededor de ellos; hiperestesia de algunos nervios.
Cuprum sulphuricum 6X
Espasmos musculares y orgánicos generalizados; cólicos menstruales; dolores desgarradores y punzantes en las extremidades.

Bhi Stom®

Nux vomica 4X
Después del consumo excesivo de alcohol, de haber fumado mucho o de haber comido en grandes cantidades; presión inútil para defecar; regula todas las funciones estomacales, intestinales y hepáticas; tendencias espásticas en los intestinos.
Pulsatilla nigricans 4X
Sensación de tener un nudo en el estómago después de ingerir comidas grasas (p.e. carne de cerdo).
Argentum nitricum 6X
Tónico para el sistema simpático; para el malestar estomacal, que mejora cuando se eructa.
Arsenicum album 6X
Dolores con ardor en el estómago después de haber comido alimentos rancios o demasiado fríos (helado, etc.); síntomas periódicos.
Natrum phosphoricum 6X
Gastralgia (acedía); actúa neutralizando ácidos gástricos.
Antimonium crudum 10X
Lengua recubierta como con tiza blanca; se irrita por el calor del verano; vómito acetonémico.
Carbo vegetabilis 10X
Dispepsia; flatulencia, ardor en el estómago; tendencia a colapsarse; absorbe toxinas.

Bhitroat®

Arum triphyllum 4X
Voz ronca por haber cantado o hablado demasiado; inflamación de las glándulas submaxilares, especialmente del lado izquierdo; expectoración de moco grueso; laringitis.
Hyosciamus niger 6X
Constricción de la garganta; dificultad para tragar, especialmente líquidos; tos seca nocturna.

Paris quadrifolia 5X
Ronquera indolora periódica; voz débil; dolor de garganta.
Arnica montana 8X
Tos seca por cosquilleo en la parte baja de la tráquea; expectoración sanguinolenta.
Argentum nitricum 6X
Moco grueso y fibroso en la garganta; dolor y ardor en la garganta; laringitis crónica.
Verbascum Thapsus 8X
Ronquera al leer en voz alta; tos hueca en la tarde y en la noche.
Causticum 6X
Acumulación de moco en la garganta; imposibilidad de hablar duro; carraspera en la garganta.
Carbo vegetabilis 10X
Gargajear de flema; dolor y ardor en la garganta; gran aspereza en la laringe.
Phosphorus 10X
Ronquera, sólo se puede susurrar; tos frecuente; empeora hacia la tarde.
Calcarea carbonica 30X
Ronquera matutina indolora; dolor de garganta que se extiende a los oídos; dolor en el pecho al toser.

Bhi Variose®

Hamamelis virginiana 4D
Hemorragias venosas pasivas; úlceras varicosas; phlegmasia alba dolens; dolores en las áreas congestionadas.
Picricum acidum 6D
Gran pesadez en las piernas y caderas, especialmente del lado izquierdo; sensaciones de indiferencia.
Pulsatilla nigricans 4D
Congestiones en el sistema venoso; inflamaciones de las rodillas; calambres en las piernas por las tardes.
Secale cornotum 6D
Adormecimiento y frío en los dedos de los pies; sensación de cosquilleo en las extremidades; extremidades frías, pálidas y arrugadas.
Aesculus hippocastanum 6D
Congestión hemorroidal y venosa; sensación de congestión en los órganos como si contuviesen demasiada sangre.
Carbo vegetabilis 10D
Rigidez en las piernas; venas varicosas con tendencia a la ulceración; debilidad cardíaca.
Carduus marianus 6D
Inflamaciones en el sistema venoso, venas varicosas (varices).
Mercurius praecipitatus ruber 10D
Debilidad en todas las extremidades; inflamación del sistema venoso.
Lycopodium clavatum 6D
Una pierna permanece caliente, la otra fría; calambres en las pantorrillas por la noche; debilidad después del menor esfuerzo.
Apis mellifica 12D
Inflamación edematosa de las extremidades; estadios tempranos de la tromboflebitis.

Bhi Sleep®

Chamomilla 2X
Tendencia al llanto y furia, irritabilidad, ansiedad, insomnio, molestias durante la dentición.
Passiflora incarnata 2X
Insomnio debido a nerviosismo, excitación o agotamiento; antiadictivo.
Coffea cruda 10X
Insomnio debido a gran excitación; los dolores parecen intolerables; desmayo debido a emociones súbitas; hipersensibilidad acústica.
Humulus Lupulus 2X
Efecto calmante y tranquilzante.
Valeriana officinalis 2X
Gran desasosiego; excitabilidad; imposibilidad de conciliar el sueño; jaqueca de origen nervioso; carácter histérico; sensación de estiramiento en diversas partes del cuerpo.
Nux vomica 30X
Para las consecuencias propias del abuso de café, alcohol y tabaco; gran somnolencia en las tardes y luego falta de sueño en las noches; despertar a las 3 A.M.; se levanta en la mañana cansado y con dolor de cabeza sordo.

Rubio Pharma
y Asociados
S.A. de C.V.

Compendio de Medicamentos con Registro Nacional

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
ATROPHEEL®	**ATROPINUM COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento del dolor tipo cólico como el cólico biliar y renal.	La ampolleta contiene: Bryonia cretica Ø, Cuprum aceticum D2, Berberis vulgaris Ø, Pareira brava Ø, Citrullus colocynthis Ø, Veratrum album Ø, Arsenicum album D4, Baptisia tinctoria Ø, Chelidonium majus Ø, Cantharis D5, Medorrhinum nosoda D10, Thuja occidentalis Ø, Clematis recta Ø, Acidum benzoicum e resina D2, Argentum nitricum D1, Atropinum sulfuricum D4. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Cólico biliar, cólico renal, cólico umbilical de los niños, tos espasmódica, tos ferina, dismenorrea.	Adultos: aplicar 1 ampolleta por vía i.m., s.c., i.d. en dosis única 1 vez por semana. En caso necesario aplicar 1 ampolleta por vía i.v. una vez por mes.	192H2000 SSA Fracción IV 15-Dic-2000
CACTHEEL®	**CACTUS COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de la angina de pecho.	La ampolleta contiene: Crataegus oxyacantha D2, Spigelia anthelmia D5, Kalium carbonicum D5, Cactus grandiflorus D3, Glonoinum D5. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Trastornos de circulación coronaria, afecciones anginosas, angina de pecho.	La dosificación deberá determinarse de forma individual. En caso de tratamiento a largo plazo, 1 ampolla 1 vez por semana vía i.m., .s.c., i.v. o, en caso necesario, i.d. (neural). En afecciones agudas, 1 ampolla i.v., dosificación que puede repetirse en caso necesario transcurridas 2-3 horas.	175H2000 SSA Fracción IV 13--Nov-2000
CANTHEEL®	**CANTHARIS COMPOSITUM S**	Coadyuvante en el tratamiento de cistitis, pielitis y nefritis.	La ampolleta contiene: Cantharis vesicatoria D4, Arsenicum album D8, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Hepar sulfuris D8. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de los mecanismos de defensa propios del organismo en cistitis, pielitis y nefritis.	En afecciones agudas, 1 ampolla 1-2 veces al día; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	146H2000 SSA Fracción IV 25-Ago-2000
CARBOCOMP®	**CARBO COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos circulatorios periféricos.	La ampolleta contiene: Carbo vegetabilis D10, Lachesis mutus D10, Melilotus officinalis D8, Atropa belladonna D6, Arnica montana D6. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Efecto regulador antihomotóxico en apoplejía cerebral e infarto de miocardio.	En general, de 1 ampolla diaria a 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v. No es de uso pediátrico.	178H2000 SSA Fracción IV 13-Nov-2000
CAUSHEEL®	**CAUSTICUM COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de las quemaduras leves.	La ampolleta contiene: Causticum Hahnemanni D3, Natrium diethyloxalaceticum D8, Acidum alpha-ketoglutaricum D10, Acidum fumaricum D10, Arsenicum album D10, Sulfur D12, Arnica montana D4, Pulsatilla pratensis D6, Embryo suis D10, Histaminum D18. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Como coadyuvante en quemaduras de todo tipo, síndrome de irradiación, afecciones causadas por la exposición a radio, telecobalto e isótopos radiactivos. Estados de agotamiento.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria, vía i.m., s.c., i.d. o en caso necesario i.v., En general, 1 ampolla 3 veces por semana. No es de uso pediátrico.	188H2000 SSA Fracción IV 15-Nov-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
CYMEHEEL®	**COENZYME COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de los trastornos enzimáticos en las enfermedades cronico-degenerativas.	La ampolleta contiene: Coenzima A D8, Acidum ascorbicum D6, Thiaminum hydrocloricum D6, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Pyridoxinum Hydrochloricum D6, Nicotinamidum D6, Acidum cis-aconiticum D8, Acidum citricum D8, Acidum fumaricum D8, Acidum alpha-ketoglutaricum D8, Acidum DL-Malicum D8, Acidum succinicum D8, Barium oxalsuccinicum D10, Natrium diethyloxalaceticum D6, Natrium pyruvicum D8, Cysteinum D6, Pulsatilla pratensis D6, Hepar sulfuris D10, Sulfur D10, Adenosinum triphosphoricum D10, Nadidum D8, Manganum phosphoricum D6, Magnesium oroticum D6, Cerium oxalicum D8, Acidum alpha-liponicum D6, Beta vulgaris conditiva D4. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados en enfermedades degenerativas; disfunciones enzimáticas (fases celulares).	En general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c. o i.d.	131H2000 SSA Fracción IV 16-Ago-2000
COCHICOM MITE®	**COLCHICUM COMPOSITUM MITE S**	Coadyuvante en el tratamiento de estados de agotamiento en pacientes con enfermedades degenerativas.	La ampolleta contiene: Colchicum autumnale D6, Conium maculatum D4, Galium aparine D4, Podophyllum peltatum D4, Hydrastis canadensis D4. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Como terapia auxiliar pre- y pos-quirúrgica en neoplasias.	Adultos: en afecciones agudas aplicar una ampolleta diaria en dosis única por 5 días. En general 1 ampolleta 3 veces por semana, por vía i.m., s.c., i.d. o en caso necesario aplicar 1 ampolleta por vía i.v. En dosis única una vez por semana.	189H2000 SSA Fracción IV 15-Nov-2000
COCHICOM MED®	**COLCHICUM COMPOSITUM MEDIUM S**	Coadyuvante en el tratamiento de estados de agotamiento en pacientes con enfermedades degenerativas.	La ampolleta contiene: Colchicum autumnale D5, Conium maculatum D3, Galium aparine D3, Podophyllum peltatum D3, Hydrastis canadensis D3. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Como terapia auxiliar pre- y pos-quirúrgica en neoplasias.	Adultos: en afecciones agudas aplicar una ampolleta diaria en dosis única por 5 días. En general 1 ampolleta 3 veces por semana, por vía i.m., s.c., i.d. o en caso necesario aplicar 1 ampolleta por vía i.v. En dosis única una vez por semana.	186H2000 SSA Fracción IV 15-Nov-2000
COCHICOM F®	**COLCHICUM COMPOSITUM FORTE S**	Coadyuvante en el tratamiento de estados de agotamiento en pacientes con enfermedades degenerativas.	La ampolleta contiene: Colchicum autumnale D4, Conium maculatum D2, Galium aparine D2, Podophyllum peltatum D2, Hydrastis canadensis D3. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Como terapia auxiliar pre- y pos-quirúrgica en neoplasias.	Adultos: en afecciones agudas aplicar una ampolleta diaria en dosis única por 5 días. En general 1 ampolleta 3 veces por semana, por vía i.m., s.c., i.d. o en caso necesario aplicar 1 ampolleta por vía i.v. En dosis única una vez por semana.	176H2000 SSA Fracción IV 13-Nov-2000
ECHICOMP®	**ECHINACEA COMPOSITUM S**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas de diverso origen.	La ampolleta contiene: Echinacea angustifolia D3, Aconitum napellus D3, Sanguinaria canadensis D4, Sulfur D8, Baptisia tinctoria D4, Lachesis mutus D10, Bryonia cretica D6, Eupatorium perfoliatum D6, Pulsatilla pratensis D8, Mercurius sublimatus corrosivus D8, Thuja occidentalis D8, Influenzinum D13, Phosphorus D8, Cortisonum aceticum D13, Streptococcinum D18, Staphylococcinum D18, Phytolacca americana D6, Pyrogenium D198, Zincum metallicum D10, Gelsemium sempervirens D6, Hepar sulfuris D10, Rhus toxicodendron D4, Arnica montana D4, Arsenicum album D8, Argentum nitricum D8, Euphorbium D6. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de las defensas propias del organismo en caso de fiebre e inflamaciones, encefalomielitis posvacunal, gripe amigdalitis, furúnculus, abscesos, flemones, toxicosis focal, gingivitis, estomatitis, sinusitis, gastroenteritis, enterocolitis, cistitis, pielitis, colpitis, leucorrea, anexitis, glomerulonefritis, fístulas supurativas, osteomielitis, otitis media, absceso cerebral crónico, meningitis, carbunco, ántrax, mononucleosis, enfermedades de la piel, mastitis.	1 ampolla 1 a 3 veces por semana vía i.m., s.c., i.d. o en caso necesario i.v. La inyección i.m. o i.v. y su correspondiente dosificación se deberán adaptar individualmente al caso patológico y a la reacción del paciente.	128H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
GLYHEEL®	**GLYOXAL COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades degenerativas, como algunos estados precancerosos.	La ampolleta contiene: Methylglyoxalum D10, Glyoxalum D10. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de los mecanismos de defensa antitóxicos en caso de bloqueos y disfunciones de los sistemas enzimáticos y de trastornos de las funciones glandulares. Enfermedades degenerativas (fases celulares)	En general, 1 ampolla 1 vez por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	170H2000 SSA Fracción IV 3-Nov-2000
KALHEEL®	**KALMIA COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades articulares y del tejido conectivo.	La ampolleta contiene: Kalmia latifolia D8, Mercurius praecipitatus ruber D10, Asa foetida D8. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Enfermedades articulares y del tejido conjuntivo, por ejemplo, artritis, artrosis y periartritis. Afecciones de los tendones y de los ligamentos, del periostio y del tejido conjuntivo de los vasos, afecciones cardiacas (posluéticas), dermatosis crónicas.	En general, 1 ampolla 1-3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v. En afecciones agudas 1 ampolla diaria.	157H2000 SSA Fracción IV 12-Sep-2000
LEPDRA®	**LEPTANDRA COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de alteraciones digestivas por trastornos hepáticos y pancreáticos.	La ampolleta contiene: Leptandra D2, Quassia amara D3, Podophyllum peltatum D3, Arsenicum album D4, Carbo vegetabilis D10, Niccolum metallicum D10, Phosphorus D6. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de los sistemas de defensa propios del organismo en caso de síndrome epigástrico, especialmente en afecciones crónicas del hígado y del páncreas o en afecciones agudas (por ejemplo, tras errores dietéticos). Meteorismo (gases). Congestión portal.	Adultos en afecciones agudas aplicar 1 ampolleta diaria, en dosis única por 5 días. En general aplicar 1 ampolleta 1 vez por semana por vía i.m. s.c. i.d. o i.v. en dosis única. No es de uso pediátrico.	149H2000 SSA Fracción IV 30-Ago-2000
MOMORHEEL®	**MOMORDICA COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de alteraciones digestivas por afecciones pancreáticas y epigástricas.	La ampolleta contiene: Momordica balsamina D6, Iodum D8, Podophyllum peltatum D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Ceanothus americanus D6, Carbo vegetabilis D10, Lycopodium clavatum D6, Lachesis mutus D10, Mandragora e radice siccato D8, Argentum nitricum D12, Veratrum album D4. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Afecciones pancreáticas y epigástricas. Efecto antihomotóxico regulador en pancreatitis y trastornos de la función pancreática.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., o i.v.	156H2000 SSA Fracción IV 12-Sep-2000
PODYLLUM®	**PODOPHYLLUM COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos hemorroidales.	La ampolleta contiene: Podophyllum peltatum D2, Podophyllum peltatum D10, Acidum hydrochloricum D4, Acidum hydrochloricum D10, Ignatia amara D3, Mercurius sublimatus corrosivus D8. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Trastornos hemorroidales, colitis catarral, por ejemplo, colitis mucosa y ulcerosa. Para tratamiento pre- y pos-quirúrgico en caso de neoplasias.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	190H2000 SSA Fracción IV 15-Nov-2000
PULCOM®	**PULSATILLA COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de afecciones crónicas de la piel.	La ampolleta contiene: Pulsatilla pratensis D6, Sulfur D8, Cortisonum aceticum D18. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Activación de las defensas mesenquimatosas, estimulación de los sistemas de defensa, especialmente de la función del tejido conjuntivo. Para aumentar el efecto de los preparados biológicos inyectables, así como para el tratamiento de las fases celulares. Reactivación de los sistemas de defensa alterados, incluso en el postoperatorio.	Inicialmente 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	120H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
STROPHEEL®	**STROPHANTUS COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos circulatorios coronarios.	La ampolleta contiene: Strophantus gratus D6, Arsenicum album D10, Aconitum napellus D6, Latrodectus mactans D10, Acidum sarcolacticum D4, Spigelia anthelmia D4, Cactus grandiflorus D3, Veratrum album D4, Aethusa cynapium D8, Tabacum D10, Glonoinum D4, Carbo vegetabilis D10, Tormentilla D6. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml..	Efecto antihomotóxico regulador en caso de trastornos circulatorios coronarios, para la profilaxis y tratamiento coadyuvante del infarto de miocardio.	De 1 ampolla diaria a 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	171H2000 SSA Fracción IV 03-Nov-2000
TRAMEEL S®	**TRAUMEEL® S**	Coadyuvante en el tratamiento de inflamaciones y dolores por traumatismos.	La ampolleta contiene: Arnica montana D2, Calendula officinalis D2, Chamomilla recutita D3, Symphytum officinale D6, Achillea Millefolium D3, Atropa belladonna D2, Aconitum napellus D2, Bellis perennis D2, Hypericum perforatum D2, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2, Hamamelis virginiana D1, Mercurius solubilis hahnemanni D6, Hepar sulfuris D6. Vehículo: c.b.p. 2,2, ml.	Traumatismos como esguinces y distorsiones, contusiones, hematomas y hemartros, fracturas edemas posquirúrgicos y postraumáticos y tumefacción edematosa de partes blandas. Procesos inflamatorios y degenerativos con inflamación asociada a diversos órganos y tejidos, especialmente en los del aparato locomotor y de los tejidos de sostén (tendosinovitis, estiloiditis, epicondilitis, bursitis, periartritis escapulohumeral, etc.); astrosis de cadera, rodilla y pequeñas articulaciones. Conmoción cerebral aguda.	En afecciones agudas, 1 ampolleta diaria, en general; 1-2 ampollas 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., i.v.	090H2000 SSA Fracción IV 15-Jun-2000
UBICHEEL®	**UBICHINON COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos enzimáticos y del metabolismo en enfermedades crónico-degenerativas.	La ampolleta contiene: Ubichinonum D10, Acidum ascorbicum D6, Thiaminum hydrochloricum D6, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Nicotinamidum D6, Vaccinium myrtillus D4, Colchicum autumnale D4, Podophyllum peltatum D4, Conium maculatum D4, Hydrastis canadensis D4, Galium aparine D6, Acidum sarcolacticum D6, Hydrochinonum D8, Acidum alpha-liponicum D8, Sulfur D8, Manganum phosphoricum D8, Natrium diethyloxalaceticum D8, Trichinoylum D10, Anthrachinonum D10, Naphthochinonum D10, Para benzochinonum D10, Adenosinum triphosphoricum D10, Coenzymum A D10, Acidum acetylosalicylicum D10, Histaminum D10, Nadidum D10, Magnesium gluconicum D10. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de los mecanismos defensivos antitóxicos, con el fin de reactivar los sistemas enzimáticos bloqueados en caso de disfunciones enzimáticas y de enfermedades degenerativas (fases celulares).	En general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c. o i.d.	116H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000
PROINUM®	**PROCAINUM COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de estados de debilidad y adelgazamiento en enfermedades crónico-degenerativas.	La ampolleta contiene: Viscum album D4, Ginseng D4, Artemisia abrotanum D4, China officinalis D6, Berberis vulgaris D6, Procainum hydrochloricum D2. Agua inyectable: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de los sistemas de defensa, especialmente del simpático y del sistema adenohipófisis corteza suprarrenal. Revitalización en todas las fases celulares, precancerosis.	En general; 1 ampolla 1 vez por semana, vía i.m., s.c. o i.d.	014H2001 SSA Fracción IV 30-Ago-2001

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
CERHEEL®	**CEREBRUM COMPOSITUM N**	Coadyuvante en el tratamiento de los trastornos por alteraciones en la circulación cerebral en el paciente.	La ampolleta contiene: Cerebrum Suis D8, Embryo suis D10, Hepar suis D10, Placenta suis D10, Kalium phosphoricum D6, Selenium D10, Thuja occidentalis D6, Ignatia amara D8, Bothrops lanceolatus D10, Acidum phosphoricum D10, China officinalis D4, Manganum phosphoricum D8, Magnesium phosphoricum D10, Semecarpus anacardium D6, Conium maculatum D4, Medorrhinum D13, Hyoscyamus niger D6, Aconitum napellus D6, Anamirta cocculus D4, Ambra grisea D10, Sulfur D10, Kalium bichromicum D8, Gelsemium sempervirens D4, Ruta graveolens D4, Arnica montana D28, Aesculus hippocastanum D4. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de los sistemas de defensa en trastornos del desarrollo de los niños, dislexia, distonía vegetativa, depresiones, arteriosclerosis, estados tras conmoción cerebral, estados postencefalíticos, neuralgias, estados de excitación, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, síndrome de Parkinson, disminución de la memoria, neurastenia y otras afecciones geriátricas.	En general; 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., i.v.	095H2000 SSA Fracción IV 23-Jun-2000
CORCOMPO®	**COR COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos de la circulación coronaria.	La ampolleta contiene: Cor suis D8, Hepar suis D8, Crataegus oxyacantha D6, Arnica montana D4, Ignatia amara D6, Arsenicum album D8, Strophanthinum D8, Naja tripudians D10, Ranunculus bulbosus D6, Cactus grandiflorus D3, Glonoinum D4, Kalium carbonicum D4, Kalmia latifolia D4, Spigelia anthelmia D10, Carbo vegetabilis D18, Natrium diethyloxalaceticum D8, Acidum alfa-ketoglutaricum D8, Acidum fumaricum D8, Acidum DL-malicum D8, Acidum L(+) lacticum D6. vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de los sistemas de defensa en trastornos de la circulación coronaria, tras infarto de miocardio, en debilidad miocárdica, insuficiencia cardiaca, endarteritis obliterante, hipertensión, complejo sintomático gastrocardiaco, tendencia al edema pulmonar, estados postembólicos, enfisema, arritmia cardiaca, angina de pecho, corazón del deportista.	En afecciones agudas, 1 ampolleta diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., en caso necesario i.v.	147H2000 SSA Fracción IV 25-Ago-2000
CUTICOM®	**CUTIS COMPOSITUM N**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades crónicas de la piel.	La ampolleta Contiene: Cutis suis D8, Hepar suis D10, Splen suis D10, Placenta suis D10, Glandula suprarenalis suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Thuja occidentalis D8, Galium aparine D6, Selenium D10, Thallium sulfuricum D13, Ignatia amara D6, Sulfur D10, Cortisonum aceticum D28, Urtica urens D4, Acidum phosphoricum D6, Calcium fluoratum D13, Mercurius solubilis hahnemanni D13, Aesculus hippocastanum D6, Ichthyolum D28, Sanguinarinum nitricum D6, Ledum palustre D4, Arctium lappa D6, Acidum formicicum D198, Pyrogenium D198, Acidum alpha-ketoglutaricum D10, Acidum fumaricum D10, Natrium diethyloxalaceticum D10. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de los sistemas de defensa en caso de dermatitis, dermatosis, alergia, esclerodermia, acné vulgar, lupus eritematoso, dermatomicosis, costra láctea, condilomas, ectima, impétigo contagioso, dermatitis atópica, microsporidiasis, micosis interdigital, úlcera de decúbito, contractura de Dupuytren, alopecia, nevos, edema de Quincke, elefantiasis.	En afecciones agudas, 1 ampolleta diaria, en general; 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., en caso necesario i.v.	123H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
DISHEEL®	**DISCUS COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de afecciones articulares.	La ampolleta contiene: Discus intervertebralis suis D8, Acidum ascorbicum D6, Thiaminum hydrochloricum D6, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Nicotinamidum D6, Funiculus umbilicalis suis D10, Cartilago suis D8, Medulla ossis suis D10, Embryo suis D10, Glandula suprarenalis suis D10, Pulsatilla pratensis D6, Mercurius praecipitatus ruber D10, Sulfur D28, Cimicifuga racemosa D4, Ledum palustre D4, Gnaphalium polycephalum D3, Citrullus colocynthis D4, Secale cornutum D6, Argentum metallicum D10, Zincum metallicum D10, Cuprum aceticum D6, Aesculus hippocastanum D6, Medorrhinum nosoda D18, Ranunculus bulbosus D4, Ammonium chloratum D8, China officinalis D4, Kalium carbonicum D6, Sepia officinalis D10, Acidum picrinicum D6, Berberis vulgaris D4, Acidum silicicum D6, Calcium phosphoricum D10, Acidum alpha-liponicum D8, Natrium diethyloxalaceticum D6, Nadidum D6, Coenzymum A D10. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de las reacciones de defensa propias del organismo y efecto sobre el terreno homotóxico en caso de: osteocondrosis, afecciones articulares (artritis crónicas y artrosis), especialmente en afecciones neurálgicas y reumáticas de la columna vertebral.	En general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., I.d., o en caso necesario aplicar una ampolleta en dosis única vía i.v. una vez por semana.	134H2000 SSA Fracción IV 22-Ago-2000
ECHIHEEL F®	**ECHINACEA COMPOSITUM FORTE S**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas de diverso origen.	La ampolleta contiene: Echinacea angustifolia D3, Aconitum napellus D5, Sanguinaria canadensis D6, Sulfur D10, Baptisia tinctoria D6, Lachesis mutus D12, Bryonia cretica D8, Eupatorium perfoliatum D8, Pulsatilla pratensis D10, Mercurius sublimatus corrosivus D8,Thuja occidentalis D10, Influezinum D15, Phosphorus D10, Cortisonum aceticum D15, Streptococcinum D20, Staphylococcinum D20, Phytolacca americana D8, Pyrogenium D200, Zincum metallicum D12, Gelsemium sempervirens D8, Hepar sulfuris D12, Rhus toxicodendron D6, Arnica montana D6, Arsenicum album D10, Argentum nitricum D10, Euphorbium D8. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de las defensas propias del organismo en caso de fiebre e inflamaciones, encefalomielitis posvacunal, gripe, amigdalitis, furúnculus, abscesos, flemones, toxicosis focal, gingivitis, estomatitis, sinusitis, gastroenteritis enterocolitis, cistitis, pielitis, colpitis, leucorrea, anexitis, glomerulonefritis, fístulas supurativas, osteomielitis, otitis media, absceso cerebral crónico, meningitis, carbunco, ántrax, mononucleosis, enfermedades de la piel, mastitis.	Inyectar de 1 a 3 veces por semana 1 ampolla por vía i.m., s.c., i.d., o en caso necesario i.v.; La inyección i.m. o i.v. Y su correspondiente dosificación se deberán adaptar individualmente al caso patológico y a la reacción del paciente.	085H2000 SSA Fracción IV 15-Jun-2000
EUPHOHEEL®	**EUPHORBIUM COMPOSITUM S**	Coadyuvante en el tratamiento de sinusitis crónica.	La ampolleta contiene: Euphorbium D4, Pulsatilla pratensis D2, Luffa operculata D6, Mercurius bijodatus D8, Mucosa nasalis suis D8, Hepar sulfuris D10, Argentum nitricum D10, Sinusitis nosode D13. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Sinusitis crónicas (senos paranasales, frontales, etmoidales y esfenoidales), catarro tubárico del oído, hidropesia del oído medio.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., en caso necesario i.v.	145H2000 SSA Fracción IV 25-Ago-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
HEPAHEEL®	**HEPAR COMPOSITUM N**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades hepato-biliares.	La ampolleta contiene: Hepar suis D8, Cyanocobalaminum D4, Duodenum suis D10, Thymus suis D10, Colon suis D10, Vesica fellea suis D10, Pancreas suis D10, China officinalis D4, Lycopodium clavatum D4, Chelidonium majus D4, Carduus marianus D3, Histaminum D10, Sulfur D13, Avena sativa D6, Fel tauri D8, Natrium diethyloxalaceticum D10, Acidum alpha ketoglutaricum D10, Acidum DL malicum D10, Acidum fumaricum D10, Acidum alpha liponicum D8, Acidum oroticum D6, Cholesterinum D10, Calcium carbonicum hahnemanni D28, Taraxacum officinale D4, Cynara scolymus D6, Veratrum album D4. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de la función detoxicante del hígado en afecciones hepatobiliares agudas y crónicas como, por ejemplo, colangitis y colecistitis; en trastornos funcionales del hígado de origen tóxico, como causa o consecuencia de otras afecciones. En hipercolesterolemia, lupus eritematoso, exantemas tóxicos, dermatosis, dermatitis y dermatitis atópica. Para estimular las funciones de los hepatocitos.	En general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., l.d., o i.v.	089H2000 SSA Fracción IV 15-Jun-2000
MUCS HEEL®	**MUCOSA COMPOSITUM**	Auxiliar en el tratamiento de afecciones de las mucosas digestivas, respiratorias y urinarias.	La ampolleta contiene: Mucosa nasalis suis D8, Mucosa oris suis D8, Mucosa pulmonis suis D8, Mucosa oculi suis D8, Mucosa vesicae felleae suis D8, Mucosa vesicae urinariae suis D8, Mucosa pylori suis D8, Mucosa duodeni suis D8, Mucosa oesophagi suis D8, Mucosa jejuni suis D8, Mucosa ilei suis D8, Mucosa coli suis D8, Mucosa recti suis D8, Mucosa ductus choledochi suis D8, Ventriculus suis D8, Pankreas suis D10, Argentum nitricum D6, Atropa belladonna D10, Oxalis acetosella D6, Semecarpus anacardium D6, Phosphorus D8, Lachesis mutus D10, Ipecacuanha D8, Nux vomica D13, Veratrum album D4, Pulsatilla pratensis D6, Kreosotum D10, Sulfur D8, Natrium diethyloxalaceticum D8, Bacterium coli D28, Marsdenia condurango D6, Kalium bichromicum D8, Hydrastis canadensis D4, Mandragora e radice siccato D10, Momordica balsamina D6, Ceanothus americanus D4. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de las defensas propias del organismo en caso de afecciones de las mucosas y catarros de origen y localización diversos, por ejemplo, del tracto digestivo con y sin úlcera, de las vías respiratorias altas y bajas, de las vías urinarias y de la conjuntiva ocular.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., o en caso necesario i.v.	114H2000 SSA Fracción IV 4-Ago-2000
OVARHEEL®	**OVARIUM COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos menstruales.	La ampolleta contiene: Ovarium suis D8, Placenta suis D10, Uterus suis D10, Salpinx suis D10, Hypophysis suis D13, Cypripedium calceolus var. pubescens D6, Lilium tigrinum D4, Pulsatilla pratensis D18, Aquilegia vulgaris D4, Sepia officinalis D10, Lachesis mutus D10, Apisinum D8, Kreosotum D8, Bovista D6, Ipecacuanha D6, Mercurius solubilis hahnemanni D10, Hydrastis canadensis D4, Acidum cis-aconiticum D10, Magnesium phosphoricum D10. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de las funciones glandulares, defensivas y del tejido conjuntivo en casos de dismenorrea, parametritis, endometritis, metritis, enuresis (en niñas), climaterio, hiperemesis, insuficiencia del lóbulo anterior de la hipófisis en el sexo femenino, craurosis vulvar, mastodinia, osteomalacia, menorragia y metrorragia, así como en las diferentes alteraciones del metabolismo y también en geriatría.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., o en caso necesario i.v.	091H2000 SSA Fracción IV 15-Jun-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
PLACOM®	**PLACENTA COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de los trastornos de la circulación periférica.	La ampolleta contiene: Placenta suis D6, Embryo suis D8, Vena suis D8, Arteria suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Hypophysis suis D10, Secale cornutum D4, Acidum sarcolacticum D4, Tabacum D10, Strophanthus gratus D6, Aesculus hippocastanum D4, Melilotus officinalis D6, Cuprum sulfuricum D6, Natrium pyruvicum D8, Barium carbonicum D13, Plumbum iodatum D18, Vipera berus D10, Solanum nigrum D6. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de las funciones metabólicas de la circulación periférica, así como de los órganos defensivos en arterioesclerosis, "pie de fumador", elefantiasis, diabetes mellitus, úlcera gangrenosa, úlcera de decúbito, dismenorrea, distonía vegetativa, eritema nudoso y multiforme, embolia, secuelas postencefalíticas y postapopléticas, endarteritis obliterante, frialdad crónica de los pies, endometritis, opacidad corneal, sordera del oído interno.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., i.v.	117H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000
RAUWHEEL®	**RAUWOLFIA COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión arterial esencial.	La ampolleta contiene: Rauwolfia serpentina D3, Aurum iodatum D10, Kalmia latifolia D4, Melilotus officinalis D8, Sulfur D10, Atropa belladonna D6, Arnica montana D4, Conium maculatum D3, Viscum album D3, Lycopodium clavatum D6, Cynara scolymus D8, Ren suis D10, Hepar suis D10. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Hipertensión esencial	En general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., o en caso necesario i.v.	155H2000 SSA Fracción IV 12-Sep-2000
SOLIHEEL®	**SOLIDAGO COMPOSITUM S**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades renales y de las vías urinarias de diverso origen.	La ampolleta contiene: Solidago virgaurea D3, Berberis vulgaris D4, Vesica urinaria suis D8, Pyelon suis D10, Ureter suis D10, Urethra suis D10, Terebinthina laricina D6, Mercurius sublimatus corrosivus D8, Arsenicum album D28, Cuprum sulfuricum D6, Bucco D8, Hepar sulfuris D10, Capsicum annuum D6, Orthosiphon aristatus D6, Equisetum hyemale D4, Pareira brava D6, Cantharis D6, Apisinum D8, Baptisia tinctoria D4, Natrium pyruvicum D10, Pyrogenium D198, Sarsaparilla D6, Bacterium coli D13, Coxsackie virus A9 D8, Argentum nitricum D6. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de los mecanismos de defensa propios del organismo en enfermedades agudas y crónicas del riñón y vías urinarias, como cistitis, cistopielitis, nefrolitiasis, hidronefrosis, enuresis nocturna, primer estadío del adenoma de próstata, estrechez uretral, incontinencia urinaria, nefrosis y nefrosclerosis e hipertensión; también en glomerulonefritis aguda y para estimular la excreción renal en otras disfunciones, como hiperhidrosis, aumento de la sudoración de los pies y eccemas.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 1 vez por semana, vía i.m., s.c., i.d., o en caso necesario i.v.	096H2000 SSA Fracción IV 4-Jul-2000
TESHEEL C®	**TESTIS COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de los trastornos ocasionados por disfunción hormonal en el hombre.	La ampolleta contiene: Testis suis D4, Embryo suis D8, Glandula suprarenalis suis D13, Kalium picrinicum D6, Ginseng D4, Damiana D8, Caladium seguinum D6, Cor suis D8, Cortisonum aceticum D13, Vitex agnus castus D6, Selenium D10, Strychninum phosphoricum D6, Cantharis D8, Curare D8, Conium maculatum D28, Lycopodium clavatum D28, Phosphorus D8, Diencephalon suis D10, Magnesium phosphoricum D10, Ferrum phosphoricum D10, Manganum phosphoricum D8, Zincum metallicum D10, Acidum ascorbicum D6. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de las funciones orgánicas en caso de distrofia adiposogenital (hombres), eyaculación precoz, impotencia viril, enuresis nocturna, distrofia muscular progresiva, estados de agotamiento, induración plástica del pene, osteomalacia (hombres), diabetes mellitus y diversos trastornos metabólicos, daños hepáticos. Favorece las vicariaciones regresivas.	En general, 1 ampolla 1 vez por semana, vía i.m., s.c., i.d., o en caso necesario i.v.	088H2000 SSA Fracción IV 15-Jun-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
THAL HEEL®	**THALAMUS COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de la distrofia muscular, dolor y tendencia a la parálisis de las extremidades.	La ampolleta contiene: Thalamus opticus suis D8, Corpus pineale suis D8, Glandula suprarenalis suis D10, Viscum album D10, Adenosinum 3-5 monohydrogenphosphoricum D6. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación de las funciones reguladoras centrales en enfermedades degenerativas y neoplasias.	En general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m.,s.c.,i.d., o en caso necesario i.v.	160H2000 SSA Fracción IV 27-Sep-2000
THYRHEEL®	**THYREOIDEA COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de los trastornos ocasionados por el hipotiroidismo, así como las fases neoplásicas de la tiroides.	La ampolleta contiene: Glandula thyreoidea suis D8, Thymus suis D10, Corpus pineale suis D8, Splen suis D10, Medulla ossis suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Hepar suis D10, Galium aparine D4, Sedum acre D6, Sempervivum tectorum D6, Conium maculatum D4, Spongia D8, Acidum sarcolacticum D3, Fucus vesiculosus D6, Calcium fluoratum D10, Colchicum autumnale D4, Viscum album D3, Cortisonum aceticum D28, Pulsatilla pratensis D8, Sulfur D10, Natrium diethyloxalaceticum D8, Acidum fumaricum D8, Acidum DL-malicum D8, Acidum Alpha-ketoglutaricum D8, Adenosinum triphosphoricum D8. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Disfunciones tiroideas. Estimulación de las funciones glandulares, así como de los sistemas de defensa y de las funciones del tejido conjuntivo, especialmente en precancerosis, carcinomas y sarcomas, hipernefroma, distrofia muscular progresiva, mixedema, induración plástica del pene, obesidad, asma bronquial, nevus, esclerodermia, elefantiasis, osteocondrosis, artrosis.	En general, 1 ampolla 1 vez por semana, vía i.m., s.c., i.d., o en caso necesaio i.v.	087H2000 SSA Fracción IV 15-Jun-2000
TONSI HEEL®	**TONSILLA COMPOSITUM N**	Coadyuvante en el tratamiento de la hipertrofia amigdalar, amigdalitis crónica y en caso de síntomas asociados a la fiebre reumática.	La ampolleta contiene: Tonsilla suis D28, Acidum ascorbicum D6, Glandula lymphatica suis D8, Medulla ossis suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Splen suis D10, Hypothalamus suis D10, Hepar suis D10, Embryo suis D13, Cortex glandulae suprarenalis suis D13, Pyrogenium D198, Cortisonum aceticum D13, Pulsatilla pratensis D6, Acidum sarcolacticum D6, Echinacea angustifolia D4, Calcium phosphoricum D10, Aesculus hippocastanum D6, Antimonium tartaricum D6, Solanum dulcamara D4, Levothyroxinum D13, Coccus cacti D6, Ferrum phosphoricum D10, Gentiana lutea D6, Geranium robertianum D6, Mercurius solubilis hahnemanni D13, Barium carbonicum D28, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Sulfur D8, Psorinum D28. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Estimulación del sistema linfático. Estimulación de las defensas propias del organismo en caso de diátesis exudativa, trastornos del desarrollo en niños linfáticos, distrofia adiposogenital, secuelas de encefalitis, eritema nudoso y multiforme, exantemas tóxicos, elefantiasis, empiemas, daños iatrogénicos como granulocitopenia y agranulocitosis; induración plástica del pene, esclerodermia, gota crónica y poliartritis crónica primaria, estadío inicial de fases de neoplasia.	En general, 1 ampolla 1 vez por semana, vía i.m., s.c., i.d., o en caso necesario i.v.	161H2000 SSA Fracción IV 27-Sep-2000
ZEEL T®	**ZEEL® T**	Coadyuvante en el tratamiento de artrosis (especialmente en gonartrosis, poliartrosis, espondilartrosis, periartritis escapulohumeral)	La ampolleta contiene: Cartilago suis D6, Funiculus umbilicalis suis D6, Embryo suis D6, Placenta suis D6, Solanum dulcamara D3, Symphytum officinale D6, Nadidum D8, Coenzymum A D8, Sanguinaria canadensis D4, Natrium diethyloxalaceticum D8, Acidum alpha-liponicum D8, Arnica montana D4, Sulfur D6, Rhus toxicodendron D2. Vehiculo: c.b.p. 2,2 ml.	Artrosis (especialmente en gonartrosis), poliartrosis, espondilartrosis, periartritis escapulohumeral.	En general 1 ampolla (o 2 ampollas en caso de articulaciones grandes) 2 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., i.v. Intraarticular, periarticular o en caso necesario paravertebral.	092H2000 SSA Fracción IV 15-Jun-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
ACOHEEL®	**ACONITUM HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de procesos gripales y catarrales.	La ampolleta contiene: Aconitum napellus D4, Aconitum napellus D10, Aconitum napellus D30, Aconitum napellus D200, Eucalyptus globulus D4, Eucalyptus globulus D10, Eucalyptus globulus D30, Ipecacuanha D4, Ipecacuanha D10, Ipecacuanha D30, Ipecacuanha D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Procesos gripales y catarrales (especialmente en los estadíos iniciales).	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., i.v.	180H2000 SSA Fracción IV 13-Nov-2000
ANACHEEL®	**ANACARDIUM HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de la gastritis.	La ampolleta contiene: Semecarpus anacardium D8, Semecarpus anacardium D10, Semecarpus anacardium D30, Semecarpus anacardium D200, Iodum D30, Iodum D200, Iodum D1000, Ipecacuanha D6, Ipecacuanha D10, Ipecacuanha D30, Ipecacuanha D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Síndrome duodenal, úlcera duodenal, síndrome del dumping (posgastrectomía), vómito (matutino).	En afecciones agudas,1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., o en caso necesario i.v.	184H2000 SSA Fracción IV 15-Nov-2000
APICCORD®	**APIS HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de edemas (facilita la eliminación del agua del organismo).	La ampolleta contiene: Apis mellifica D4, Apis mellifica D10, Apis mellifica D30, Apis mellifica D200, Apis mellifica D1000, Apisinum D8, Apisinum D30, Scilla maritima D4, Scilla maritima D10, Scilla maritima D30, Kalium stibyltartaricum D4, Kalium stibyltartaricum D10, Kalium stibyltartaricum D30, Kalium stibyltartaricum D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Edemas, eccema pustuloso y bulloso, irritabilidad cerebral.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria, en general; 1 ampolla una vez por semana, vía i.m., s.c., i.d., o i.v. No es de uso pediátrico.	142H2000 SSA Fracción IV 25-Ago-2000
BELACCORD®	**BELLADONNA HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de inflamaciones localizadas como: amigdalitis, furúnculus y ántrax.	La ampolleta contiene: Atropa belladonna D4, Atropa belladonna D10, Atropa belladonna D30, Atropa belladonna D200, Atropa belladonna D1000, Echinacea angustifolia D10, Echinacea angustifolia D30, Echinacea angustifolia D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Inflamaciones localizadas como por ejemplo, amigdalitis, furúnculus y ántrax.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria, en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., o i.v.	111H2000 SSA Fracción IV 3-Ago-2000
BERBACCORD®	**BERBERIS HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de los procesos inflamatorios e irritativos (con o sin secreciones) a nivel del tracto urogenital y de las vías biliares.	La ampolleta contiene: Berberis vulgaris D4, Berberis vulgaris D10, Berberis vulgaris D30, Berberis vulgaris D200, Citrullus colocynthis D4, Citrullus colocynthis D10, Citrullus colocynthis D30, Citrullus colocynthis D200, Veratrum album D5, Veratrum album D10, Veratrum album D30, Veratrum album D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Procesos inflamatorios e irritativos (con o sin concreciones) a nivel del tracto urogenital y de las vías biliares.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v. No es de uso pediátrico.	118H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000
CEANHEEL®	**CEANOTHUS HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento del síndrome epigástrico, pancreopatías.	La ampolleta contiene: Ceanothus americanus D10, Ceanothus americanus D30, Ceanothus americanus D200, Lachesis mutus D10, Lachesis mutus D30, Lachesis mutus D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Síndrome epigástrico, pancreatopatías.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	127H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
CHELCCORD®	**CHELIDONIUM HOMACCORD® N**	Coadyuvante en el tratamiento de los trastornos de la digestión por alteraciones de la secreción biliar.	La ampolleta contiene: Chelidonium majus D10, Chelidonium majus D30, Chelidonium majus D200, Atropa belladonna D10, Atropa belladonna D30, Atropa belladonna D200, Atropa belladonna D1000, Fel tauri D10, Fel tauri D30, Fel tauri D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Colangitis, colecistitis, cólicos biliares, hepatitis aguda y crónica, ictericia obstructiva, daños hepáticos (daños de parénquima). Como medicamento complementario en arritmia cardiaca.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	122H2000 SSA Fracción IV 9-Ago -2000
CHINCCORD®	**CHINA HOMACCORD® S**	Coadyuvante en el tratamiento de estados de agotamiento y debilidad en general.	La ampolleta contiene: China officinalis D4, China officinalis D10, China officinalis D30, China officinalis D200, Sepia officinalis D6, Sepia officinalis D30, Sepia officinalis D200, Sepia officinalis D1000. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Estados de agotamiento y de debilidad en general. Agente terapéutico básico en osteocondrosis.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	154H2000 SSA Fracción IV 12-Sep-2000
CIMIHEEL®	**CIMICIFUGA HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de la osteocondrosis, especialmente en la columna cervical, neuralgias de diverso origen vertebral.	La ampolleta contiene: Cimicifuga racemosa D4, Cimicifuga racemosa D10, Cimicifuga racemosa D30, Cimicifuga racemosa D200, Strontium carbonicum D8, Strontium carbonicum D30, Strontium carbonicum D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Osteocondrosis, especialmente de la columna cervical; neuralgias de origen vertebral, campos interferentes neurales.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	169H2000 SSA Fracción IV 3-Nov-2000
CINNAHEEL®	**CINNAMOMUM HOMACCORD® N**	Coadyuvante en el tratamiento de hemorragias capilares, tendencia a las hemorragias.	La ampolleta contiene: Cinnamomum zeylanicum D3, Cinnamomum zeylanicum D10, Cinnamomum zeylanicum D30, Cinnamomum zeylanicum D200, Hamamelis virginiana D3, Hamamelis virginiana D10, Hamamelis virginiana D30, Hamamelis virginiana D200, Achillea millefolium D4, Achillea millefolium D10, Achillea millefolium D30, Achillea millefolium D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Hemorragias capilares, tendencia a las hemorragias.	En caso de hemorragias, 1 ampolla 2 veces al día; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	182H2000 SSA Fracción IV 13-Nov-2000
COCCUHEEL®	**COCCULUS HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento del vértigo de diversa etiología.	La ampolleta contiene: Anamirta cocculus D6, Anamirta cocculus D10, Anamirta cocculus D30, Anamirta cocculus D200, Petroleum rectificatum D8, Petroleum rectificatum D10, Petroleum rectificatum D30, Petroleum rectificatum D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Cinetosis, estados de agotamiento por exceso de trabajo.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	181H2000 SSA Fracción IV 13-Nov-2000
COLT HOMACCORD®	**COLOCYNTHIS HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de neuralgias, especialmente en ciática, osteocondrosis de la columna lumbar.	La ampolleta contiene: Citrullus colocynthis D4, Citrullus colocynthis D10, Citrullus colocynthis D30, Citrullus colocynthis D200, Gnaphalium polycephalum D3, Gnaphalium polycephalum D10, Gnaphalium polycephalum D30, Gnaphalium polycephalum D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Neuralgias, especialmente en ciática; osteocondrosis de la columna lumbar en particular.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria, en general; 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	106H2000 SSA Fracción IV 3-Ago-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
DROS HOMACCORD®	**DROSERA HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento en caso de tosferina y bronquitis asmática.	La ampolleta contiene: Drosera D4, Drosera D10, Drosera D30, Drosera D200, Cuprum aceticum D6, Cuprum aceticum D10, Cuprum aceticum D30, Cuprum aceticum D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Tosferina, bronquiolitis, bronquitis asmática.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	141H2000 SSA Fracción IV 22-Ago-2000
DULCACCORD®	**DULCAMARA HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de las molestias del catarro común.	La ampolleta contiene: Solanum dulcamara D4, Solanum dulcamara D10, Solanum dulcamara D30, Solanum dulcamara D200, Araneus diadematus D8, Araneus diadematus D10, Araneus diadematus D30, Araneus diadematus D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Agravación en tiempo húmedo de todas las afecciones, hipertrofia amigdalar.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	187H2000 SSA Fracción IV 15-Nov-2000
FERRHEEL®	**FERRUM HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento del síndrome hombro-brazo, epicondilitis.	La ampolleta contiene: Ferrum metallicum D10, Ferrum metallicum D30, Ferrum metallicum D200, Ferrum phosphoricum D10, Ferrum phosphoricum D30, Ferrum phosphoricum D200, Ferrum sulfuricum D8, Ferrum sulfuricum D10, Ferrum sulfuricum D30, Ferrum sulfuricum D200, Ferrum sesquichlorum solutum D6, Ferrum sesquichlorum solutum D10, Ferrum sesquichlorum solutum D30, Ferrum sesquichlorum solutum D200, Spiraea ulmaria D4, Spiraea ulmaria D10, Spiraea ulmaria D30, Spiraea ulmaria D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Síndrome hombro-brazo, epicondilitis.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	183H2000 SSA Fracción IV 13-Nov-2000
GELS HOMACCORD®	**GELSEMIUM HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento del síndrome cervical, migraña cervical (osteocondrosis cervical) y neuralgias de diferente localización.	La ampolleta contiene: Gelsemium sempervirens D4, Gelsemium sempervirens D10, Gelsemium sempervirens D30, Gelsemium sempervirens D200, Rhus toxicodendron D5, Rhus toxicodendron D10, Rhus toxicodendron D30, Rhus toxicodendron D200, Cimicifuga racemosa D4, Cimicifuga racemosa D10, Cimicifuga racemosa D30, Cimicifuga racemosa D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Síndrome cervical, migraña cervical (osteocondrosis cervical), neuralgias de diversa localización.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	119H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000
GLONHEEL®	**GLONOIN HOMACCORD® N**	Coadyuvante en el tratamiento de la taquicardia, especialmente en casos de hipertiroidismo, trastornos anginosos.	La ampolleta contiene: Glonoinum D4, Glonoinum D10, Glonoinum D30, Lycopus virginicus D2, Lycopus virginicus D4, Lycopus virginicus D10, Lycopus virginicus D30, Crataegus oxyacantha D4. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Taquicardia, especialmente en caso de hipertiroidismo, trastornos anginosos.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	129H2000 SSA Fracción IV 16-Ago-2000
GRAF HOMACCORD®	**GRAPHITES HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de la obesidad exogenada y algunos casos de eccemas.	La ampolleta contiene: Graphites D10, Graphites D30, Graphites D200, Calcium carbonicum Hahnemanni D10, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium carbonicum Hahnemanni D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Eccemas, especialmente eccemas secos y crónicos. Como tratamiento a largo plazo en caso de cicatrices y queloides.	En general; 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	113H2000 SSA Fracción IV 4-Ago-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
HAMACCORD®	**HAMAMELIS HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de congestiones venosas, eccema varicoso, afecciones tromboflebíticas.	La ampolleta contiene: Hamamelis virginiana D4, Hamamelis virginiana D30, Hamamelis virginiana D200, Carduus marianus D6, Carduus marianus D30, Carduus marianus D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Congestiones venosas, eccema varicoso, afecciones tromboflebíticas.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	138H2000 SSA Fracción IV 22-Ago-2000
IGN HOMACCORD®	**IGNATIA HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos de origen nervioso.	La ampolleta contiene: Ignatia amara D6, Ignatia amara D10, Ignatia amara D30, Ignatia amara D200, Moschus moschiferus D8, Moschus moschiferus D30, Moschus moschiferus D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Estados depresivos, especialmente de origen exógeno; síntomas paradójicos, afonía histérica.	En caso de trastornos paroxísticos, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i..v.	143H2000 SSA Fracción IV 25-Ago-2000
MELICCORD®	**MELILOTUS HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión arterial.	La ampolleta contiene: Melilotus officinalis D2, Melilotus officinalis D4, Melilotus officinalis D10, Melilotus officinalis D30, Melilotus officinalis D200, Crataegus oxyacantha D2, Crataegus oxyacantha D10, Crataegus oxyacantha D30, Crataegus oxyacantha D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Plétora, estados preapopléticos, hipertensión.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria, en general; 1 ampolla 1 vez por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	168H2000 SSA Fracción IV 3-Nov-2000
MEZEHEEL®	**MEZEREUM HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de eccemas vesiculosus, herpes zoster.	La ampolleta contiene: Daphne mezereum D4, Daphne Mezereum D10, Daphne mezereum D15, Daphne mezereum D30, Daphne mezereum D200, Arsenicum album D6, Arsenicum album D10, Arsenicum album D15, Arsenicum album D30, Arsenicum album D200, Arsenicum album D1000. Vehículo: c.b.p: 1,1 ml.	Eccemas vesiculosus, herpes zoster, prurito.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria, en general; 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	185H2000 SSA Fracción IV 15-Nov-2000
NATHEEL®	**NATRIUM HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento del catarro crónico de las mucosas.	La ampolleta contiene: Natrium carbonicum D10, Natrium carbonicum D30, Natrium carbonicum D200, Natrium chloratum D10, Natrium chloratum D30, Natrium chloratum D200, Natrium chloratum D1000, Natrium nitricum D10, Natrium nitricum D15, Natrium nitricum D30. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Catarro crónico de las mucosas, escrofulismo.	Inicialmente, 1 ampolla diaria; posteriormente, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	179H2000 SSA Fracción IV 13-Nov-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
NUX HOMACCORD®	**NUX VOMICA HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos funcionales gastrointestinales y hepáticos, meteorismo, trastornos por abuso de la nicotina, alcohol y café.	La ampolleta contiene: Nux vomica D4, Nux vomica D10, Nux vomica D15, Nux vomica D30, Nux vomica D200, Nux vomica D1000, Bryonia cretica D4, Bryonia cretica D6, Bryonia cretica D10, Bryonia cretica D15, Bryonia cretica D30, Bryonia cretica D200, Bryonia cretica D1000, Lycopodium clavatum D5, Lycopodium clavatum D10, Lycopodium clavatum D30, Lycopodium clavatum D200, Lycopodium clavatum D1000, Citrullus colocynthis D5, Citrullus colocynthis D10, Citrullus colocynthis D30, Citrullus colocynthis D200. Vehículo c.b.p. 1,1 ml.	Trastornos funcionales gastrointestinales y hepáticos, meteorismo, trastornos por abuso de nicotina, alcohol y café.	En afecciones agudas, 1 ampolleta Diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	125H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000
PHOSPHACCORD®	**PHOSPHOR HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de laringitis y faringitis con ronquera.	La ampolleta contiene: Phosphorus D10, Phosphorus D30, Phosphorus D200, Argentum nitricum D10, Argentum nitricum D30, Argentum nitricum D200, Paris quadrifolia D6, Paris quadrifolia D10, Paris quadrifolia D30, Paris quadrifolia D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Ronquera, laringitis, faringitis. Hemorragias petequiales.	En afecciones agudas, 1 ampolleta Diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	133H2000 SSA Fracción IV 16-Ago-2000
PLANHEEL®	**PLANTAGO HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de enuresis nocturna y la incontinencia urinaria.	La ampolleta contiene: Plantago major D4, Plantago major D10, Plantago major D15, Plantago major D30, Plantago major D200, Atropa belladonna D5, Atropa belladonna D10, Atropa belladonna D15, Atropa belladonna D30, Atropa belladonna D200, Atropa belladonna D1000, Ignatia amara D6, Ignatia amara D10, Ignatia amara D30, Ignatia amara D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Enuresis nocturna, incontinencia urinaria, vejiga irritable.	En afecciones agudas, 1 ampolleta Diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	174H2000 SSA Fracción IV 9-Nov-2000
RANUHEEL®	**RANUNCULUS HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de neuralgias intercostales, dolores pleuríticos y herpes zoster.	La ampolleta contiene: Ranunculus bulbosus D4, Ranunculus bulbosus D10, Ranunculus bulbosus D15, Ranunculus bulbosus D30, Ranunculus bulbosus D200, Asclepias tuberosa D6, Asclepias tuberosa D10, Asclepias tuberosa D20, Asclepias tuberosa D30, Asclepias tuberosa D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Neuralgias intercostales, dolores pleuríticos, herpes zoster.	En afecciones agudas, 1 ampolleta Diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	137H2000 SSA Fracción IV 22-Ago-2000
SABHEEL®	**SABAL HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de las molestias causadas por la hipertrofia prostática benigna.	La ampolleta contiene: Sabal serrulatum D2, Sabal serrulatum D10, Sabal serrulatum D30, Hepar sulfuris D12, Hepar sulfuris D15, Hepar sulfuris D30, Hepar sulfuris D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Primer estadío del adenoma prostático (hipertrofia de próstata), vejiga irritable.	En afecciones agudas, 1 ampolleta Diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	177H2000 SSA Fracción IV 13-Nov-2000
SELACCORD®	**SELENIUM HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento del agotamiento físico y disminución de la memoria.	La ampolleta contiene: Selenium D10, Selenium D15, Selenium D30, Selenium D200, Kalium phosphoricum D6, Kalium phosphoricum D10, Kalium phosphoricum D30, Kalium phosphoricum D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Disminución del rendimiento, especialmente de tipo cerebral y de origen arterioesclerótico.	1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	153H2000 SSA Fracción IV 4-Sep-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
VERACCORD®	**VERATRUM HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de las molestias causadas por algunas alteraciones intestinales como diarrea y dolor abdominal.	La ampolleta contiene: Veratrum album D4, Veratrum album D10, Veratrum album D30, Veratrum album D200, Aloe D4, Aloe D10, Aloe D30, Tormentilla D2, Tormentilla D10, Tormentilla D30, Rheum D2, Rheum D10, Rheum D30. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Gastroenteritis. Estados de colapso.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	172H2000 SSA Fracción IV 3-Nov-2000

RUBIO PHARMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. AMPOLLETAS-ESPECIALIDADES

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
VISCHEEL MEDIUM®	**VISCUM COMPOSITUM MEDIUM**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades degenerativas, como algusos estados precancerosos.	La ampolleta contiene: Viscum album D1, Viscum album D10, Viscum album D28, Viscum album D198, Adenosinum 3-5 monohydrogenphosphoricum D8, Mercurius iodatus flavus D10. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Bioterapia en fases celulares y como tratamiento complementario pre-y pos-quirúrgico de neoplasias.	i.m., s.c., i.d., i.v. La dosis que el médico señale	163H2000 SSA Fracción IV 26-Sep-2000
VIHEEL F®	**VISCUM COMPOSITUM FORTE**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades degenerativas, como algusos estados precancerosos.	La ampolleta contiene: Viscum album DØ, Viscum album D10, Viscum album D28, Viscum album D198, Adenosinum 3-5 monohydrogenphosphoricum D8, Mercurius iodatus flavus D10. Vehículo: c.b.p. 2,2 ml.	Bioterapia en fases celulares y como tratamiento complementario pre-y pos-quirúrgico de neoplasias.	i.m., s.c., i.d. La dosis que el médico señale	162H2000 SSA Fracción IV 26-Sep-2000

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F.

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
ANGIO HEEL®	**ANGIO INJEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos circulatorios coronarios, afecciones anginosas.	La ampolleta contiene: Acidum formicicum D10, Acidum formicicum D30, Acidum formicicum D200, Asclepias tuberosa D10, Asclepias tuberosa D30, Asclepias tuberosa D200, Cactus grandiflorus D10, Cactus grandiflorus D30, Cactus grandiflorus D200, Castoreum D10, Castoreum D30, Castoreum D200, Crataegus oxyacantha D10, Crataegus oxyacantha D30, Crataegus oxyacantha D200, Plumbum iodatum D10, Plumbum iodatum D30, Plumbum iodatum D200, Glonoinum D10, Glonoinum D30, Glonoinum D200, Spigelia anthelmia D10, Spigelia anthelmia D30, Spigelia anthelmia D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Trastornos circulatorios coronarios, afecciones anginosas.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., o i.v.	139H2000 SSA Fracción IV 22-Ago-2000
CIRCULO HEEL®	**CIRCULO INJEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos circulatorios periféricos y acroparestesias.	La ampolleta contiene: Argentum metallicum D10, Argentum metallicum D30, Argentum metallicum D200, Arsenicum album D10, Arsenicum album D30, Arsenicum album D200, Barium iodatum D10, Barium iodatum D30, Barium iodatum D200, Calcium carbonicum Hahnemanni D10, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium carbonicum Hahnemanni D200, Curare D10, Curare D30, Curare D200, Solanum nigrum D10, Solanum nigrum D30, Solanum nigrum D200, Tabacum D10, Tabacum D30, Tabacum D200, Secale cornutum D6, Secale cornutum D10, Secale cornutum D30, Secale cornutum D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Trastornos circulatorios periféricos, acroparestesias.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	107H2000 SSA Fracción IV 3-Ago-2000
CRALONIN®	**CRALONIN®**	Coadyuvante en el tratamiento de la angina de pecho.	La ampolleta contiene: Crataegus oxyacantha D2, Spigelia anthelmia D1, Kalium carbonicum D2. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Trastornos de la circulación coronaria, angina de pecho, dolores cardiacos punzantes y de otro tipo, debilidad miocárdica infeccioso-tóxica, estado tras infarto de miocardio.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria y, en caso necesario también cada 6-8 horas; en general, 1 ampolla 1 vez por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	167H2000 SSA Fracción IV 3-Nov-2000
ERIGOTHEEL®	**ERIGOTHEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal.	La ampolleta contiene: Origanum vulgare D6, Origanum vulgare D10, Origanum vulgare D30, Erythraea centaurium D10, Erythraea centaurium D30. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Úlcera gástrica y duodenal.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	152H2000 SSA Fracción IV 4-Sep-2000
GALHEEL®	**GALIUM HEEL® N**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades medades infecciosas (drenador)	La ampolleta contiene: Galium aparine D3, Galium mollugo D3, Sedum acre D3, Sempervivum tectorum D4, Clematis recta D4, Thuja occidentalis D3, Caltha palustris D3, Ononis spinosa D4, Juniperus communis D4, Hedera helix D4, Betula alba D2, Saponaria officinalis D4, Echinacea angustifolia D5, Calcarea fluorica D8, Phosphorus D8, Aurum metallicum D10, Argentum metallicum D8, Apis mellifica D12, Acidum nitricum D6, Pyrogenium D6, Urtica urens D3. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Para estimular los mecanismos de defensa inespecíficos, especialmente en caso de enfermedades crónicas.	Inicialmente, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	136H2000 SSA Fracción IV 22-Ago-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
GRIHEEL®	**GRIPP-HEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento del resfriado común (gripe).	La ampolleta contiene: Aconitum napellus D3, Eupatorium perfoliatum D2, Phosphorus D4, Lachesis mutus D11, Bryonia cretica D3. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Gripe y resfriado común.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en genera, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	135H2000 SSA Fracción IV 22-Ago-2000
HEPEEL®	**HEPEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos hepáticos (hepatopatías).	La ampolleta contiene: Lycopodium clavatum D2, Chelidonium majus D3, China officinalis D2, Nux moschata D3, Carduus marianus D1, Phosphorus D5, Veratrum album D5, Citrullus colocynthis D5. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Trastornos hepáticos primarios y secundarios, hepatopatías.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en genera, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	108H2000 SSA Fracción IV 2-Ago-2000
HORMEEL S®	**HORMEEL® S**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos menstruales	La ampolleta contiene: Senecio fuchsii D3, Acidum nitricum D4, Erigeron canadensis D3, Moschus moschiferus D6, Viburnum opulus D3, Pulsatilla pratensis D4, Sepia officinalis D6, Cyclamen europaeum D4, Ignatia amara D6, Thlaspi bursi pastoris D3, Calcarea carbonica D8, Aquilegia vulgaris D4, Cypripedium pubescens D8, Origanum majorana D4, Nux moschata D6. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Trastornos funcionales del ciclo menstrual. Como tratamiento coadyuvante en caso de esterilidad. Para regular la función de las glándulas endocrinas.	Inicialmente, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	124H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000
CHOL INJ®	**INJEEL CHOL®**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos hepato-biliares.	La ampolleta contiene: Chelidonium majus D10, Chelidonium majus D30, Chelidonium majus D200, Atropa belladonna D10, Atropa belladonna D30, Atropa belladonna D200, Atropa belladonna D1000, Carduus marianus D10, Carduus marianus D30, Carduus marianus D200, China officinalis D10, China officinalis D30, China officinalis D200, Calcium carbonicum Hahnemanni D10, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Calcium carbonicum Hahnemanni D200, Lycopodium clavatum D10, Lycopodium clavatum D30, Lycopodium clavatum D200, Lycopodium clavatum D1000, Taraxacum officinale D10, Taraxacum officinale D30, Taraxacum officinale D200, Veratrum album D10, Veratrum album D30, Veratrum album D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Colangitis, colecistitis, colelitiasis, trastornos de la función hepática, hepatitis crónica.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	140H2000 SSA Fracción IV 22-Ago-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
LYMPHOMYOSOT®	**LYMPHOMYOSOT®**	Coadyuvante en el tratamiento de la bronquitis crónica.	La ampolleta contiene: Myosotis arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale D4, Sarsaparrilla D6, Scrophularia nodosa D3, Juglans regia D3, Calcium phosphoricum D12, Natrium sulfuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levothyroxinum D12, Aranea diadema D6, Geranium robertianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum iodatum D12. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos, tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer enfermedades infecciosas). Tumefacciones de los ganglios linfáticos. Hipertrofia amigdalar y amigdalitis crónica.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	093H2000 SSA Fracción IV 15-Jun-2000
METRO-ADNEX®	**METRO-ADNEX INJEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de los trastornos del aparato genital femenino.	La ampolleta contiene: Apis mellifica D10, Apis mellifica D30, Apis mellifica D200, Lachesis mutus D10, Lachesis mutus D30, Lachesis mutus D200, Lachesis mutus D1000, Lilium tigrinum D10, Lilium tigrinum D30, Lilium tigrinum D200, Lycopodium clavatum D10, Lycopodium clavatum D30, Lycopodium clavatum D200, Lycopodium clavatum D1000, Mercurius sublimatus corrosivus D10, Mercurius sublimatus corrosivus D30, Mercurius sublimatus corrosivus D200, Pulsatilla pratensis D10, Pulsatilla pratensis D30, Pulsatilla pratensis D200, Pulsatilla pratensis D1000, Crabro vespa D10, Crabro vespa D30, Crabro vespa D200, Cimicifuga racemosa D10, Cimicifuga racemosa D30, Cimicifuga racemosa D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Anexitis, parametritis, endometritis, vaginitis, dismenorrea, dolores intermenstruales, neurosis climatéricas.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	130H2000 SSA Fracción IV 16-Ago-2000
NERHEUM®	**NEURALGO RHEUM INJEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de neuralgias, reumatismo, afecciones artríticas y de los discos intervertebrales.	La ampolleta contiene: Causticum Hahnemanni D10, Causticum Hahnemanni D30, Causticum Hahnemanni D200, Colchicum autumnale D10, Colchicum autumnale D30, Colchicum autumnale D200, Citrullus colocynthis D10, Citrullus colocynthis D30, Ferrum metallicum D10, Ferrum metallicum D30, Lithium benzoicum D10, Lithium benzoicum D30, Rhus toxicodendron D10, Rhus toxicodendron D30, Spiraea ulmaria D10, Spiraea ulmaria D30, Gnaphalium polycephalum D6, Gnaphalium polycephalum D10, Gnaphalium polycephalum D30. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Neuralgias, reumatismo de partes blandas, afecciones artríticas y de los discos intervertebrales.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	112H2000 SSA Fracción IV 4-Ago-2000
NERINJEEL®	**NEURO INJEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos nerviosos.	La ampolleta contiene: Acidum phosphoricum D10, Acidum phosphoricum D30, Argentum nitricum D10, Argentum nitricum D30, Platinum metallicum D10, Platinum metallicum D30, Sepia officinalis D10, Sepia officinalis D30, Valeriana officinalis D10, Valeriana officinalis D30, Avena sativa D10, Avena sativa D30, Ignatia amara D10, Ignatia amara D30. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Estados patológicos psicosomáticos y con componente psicosomático superpuesto, incluyendo, entre otros, los estados anímicos depresivos.	En general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	126H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
PSORINOHEEL N®	**PSORINOHEEL® N**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades de la piel, daños hepáticos y en enfermedades crónicas.	La ampolleta contiene: Psorinum D10, Medorrhinum D12, Sulfur D6, Thuja occidentalis D6, Bufo bufo D10, Natrium chloratum D12, Vaccininum D8, Bismutum kalium iodatum D5, Nerium oleander D4, Cicuta virosa D5, Bacillinum D12. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel, daños hepáticos y, en general, en enfermedades crónicas.	En general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o en caso necesario aplicar una ampolleta en dosis única por vía i.v. una vez por semana.	121H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000
SPASCUPREEL®	**SPASCUPREEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de espasmos digestivos y genitourinarios.	La ampolleta contiene: Citrullus colocynthis D4, Ammonium bromatum D4, Atropinum sulfuricum D6, Veratrum album D6, Magnesium phosphoricum D6, Gelsemium sempervirens D6, Passiflora incarnata D2, Agaricus muscarius D4, Chamomilla recutita D3, Cuprum sulfuricum D6, Aconitum napellus D6. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Espasmos en órganos huecos de musculatura lisa (estómago, intestino, vesícula biliar, útero y vías urinarias). Espasmos en la musculatura estriada (miogelosis, endurecimiento muscular).	En afecciones agudas, 1 ampolla varias veces al día; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	115H2000 SSA Fracción IV 9-Ago-2000
SPIGELON®	**SPIGELON®**	Coadyuvante en el tratamiento de cefáleas (migraña).	La ampolleta contiene: Spigelia anthelmia D3, Atropa belladonna D3, Bryonia cretica D3, Gelsemium sempervirens D3, Melilotus officinalis D3, Natrium carbonicum D3, Acidum silicicum D12, Thuja occidentalis D12. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Cefáleas constitucionales.	En afecciones agudas, aplicar 1 ampolla al día; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	144H2000 SSA Fracción IV 25-Ago-2000
TONI INJ®	**TONICO INJEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de estados de agotamiento físico y mental.	La ampolleta contiene: Aurum metallicum D10, Aurum metallicum D30, Aurum metallicum D200, Chininum arsenicosum D10, Chininum arsenicosum D30, Helonias dioica D10, Helonias dioica D30, Hypericum perforatum D10, Hypericum perforatum D30, Selenium D10, Selenium D30, Kalium phosphoricum D10, Kalium phosphoricum D30, Nux-vomica D10, Nux-vomica, D30. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Estados de agotamiento físico, aunque también en los de naturaleza psíquica. Trastornos del desarrollo intelectual de los niños.	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o en caso necesario i.v.	109H2000 SSA Fracción IV 3-Ago-2000
ENGYSTOL®	**ENGYSTOL® N**	Coadyuvante en el tratamiento del resfriado común.	La ampolleta contiene: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30, sulfur D4, sulfur D10. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Para activar los sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en enfermedades virales).	En afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	094H2000 SSA Fracción IV 15-Jun-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
VERTHEEL®	**VERTIGOHEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento del vertigo de etiología diversa.	La ampolleta contiene: Anamirta cocculus D3, Conium maculatum D2, Ambra grisea D5, Petroleum rectificactum D7. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Vértigo de etiología diversa (especialmente los de origen arteriosclerótico.)	En caso de crisis de vértigo, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d. o i.v.	132H2000 SSA Fracción IV 16-Ago-2000

RUBIO PHARMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. AMPOLLETAS-ORGANOS PREPARADO SUIS

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
CARTHEEL®	**CARTILAGO SUIS®**	Coadyuvante en el tratamiento de condropatías, tendovaginitis, coxitis, periartritis escapulohumeral, artrosis deformante.	La ampolleta contiene: Cartilago suis D10, Cartilago suis D30, Cartilago suis D200. Vehículo: c.b.p. 1,1 ml.	Condropatías, Tendosinovitis, coxitis, Periartritis escapulohumeral. Artrosis deformante.	En general aplicar 1 ampolleta en dosis única 1 vez por semana, inicialmente aplicar 1 ampolleta 2 veces por semana por vía i.m.,s.c. En caso necesario aplicar 1 ampolleta en dosis única por vía i.v. 1 vez por semana.	086H2000 SSA Fracción IV 15-Jun-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
ABROPERNOL N®	**ABROPERNOL® N**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por los eczemas.	Cada tableta contiene: Artemisa abrotanum D4, Pulsatilla Pratensis D4, Calcarea fluorica D12, Petroleum rectificatum D6, Agaricus muscarius D5, Acidum nitricum D8, Hamamelis virginiana D4. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Sabañones, intertrigo, eccemas, eritema exudativo, multiforme y nudoso, hiperhidrosis, hiperqueratosis.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	082H99 SSA 12-Nov-1999
ALBUMOHEEL®	**ALBUMOHEEL S®**	Auxiliar en el tratamiento de albuminuria, incluyendo, glomerulonefritis aguda y crónica y procesos nefróticos.	Cada tableta contiene: Apis mellifica D4, Phosphorus D6, Ignatia amara D4, Veratrum album D4, Mercurius sublimatus corrosivus D8, Terebinthina laricina D8, Nux moschata D6. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Albuminuria, incluyendo, por ejemplo, glomerulonefritis aguda y crónica y procesos nefróticos.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	065H2000 SSA 27-Mar-2000
ALTRIHEEL®	**ALETRIS-HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de debilidad física y agotamiento.	Cada tableta contiene: Aletris farinosa D4, Kalium carbonicum D4, Cocculus anamirta D4, Helonias Dioica D4, Acidum picrinicum D6, Chininum Arsenicosum D6, Sepia officinalis D6, Natrium muriaticum D6. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Estados de debilidad y agotamiento.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	051H2000 SSA 8-Feb-2000
ANGEEL®	**ANGIN-HEEL® S**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la inflamación de las amígdalas.	Cada tableta contiene: Mercurius cyanatus D8, Phytolaca americana D4, Apis mellifica D4, Arnica montana D4, Hepar sulfuris D6, Solanum dulcamara D4, Atropa belladonna D4. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Amigdalitis, angina lacunar.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	063H98 SSA 10-Sep-1998
ARSURANEEL®	**ARSURANEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de los estados de desnutrición leve.	Cada tableta contiene: Arsenicum album D5, Acidum aceticum D4, Acidum phosphoricum D4, China officinalis D4, Strychninum nitricum D6, Secale cornutum D4, Condurango D4, Curare D12. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Discrasias, marasmo.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver bajo la lengua.	009H2000 SSA 2-Feb-2000
BARIJODEEL®	**BARIJODEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de la arterioesclerosis, especialmente esclerosis cerebral.	Cada tableta contiene: Barium carbonicum D12, Ignatia amara D6, Stramonium datura D4, Kalium phosphoricum D6, Arnica montana D4, Causticum hahnemanni D6, Anacardium semecarpus D6, Aconitum napellus D12, Calcium iodatum D4. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Arterioesclerosis, especialmente esclerosis cerebral; linfatismo.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	053H2000 SSA 8-Feb-2000
BRONHEEL®	**BRONCHALIS HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la bronquitis.	Cada tableta contiene: Atropa belladonna D4, Sticta pulmonaria D4, Antimonium tartaricum D4, Kreosotum D5, Ipecacuanha D4, Lobelia inflata D4, Hyoscyamus niger D4, Bryonia cretica D4. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Bronquitis, especialmente en catarro crónico del fumador.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	084H99 SSA 22-Oct-1999

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BRYACONEEL®	**BRYACONEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de dolores articulares y musculares.	Cada tableta contiene: Bryonia cretica D4, Aconitum napellus D4, Phosphorus D5. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Neuralgias, incluyendo las de origen reumático; procesos gripales.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	066H98 SSA 10-Sep-1998
CALCOHEEL®	**CALCOHEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la dentición.	Cada tableta contiene: Calcarea carbonica D8, Solanum dulcamara D6, Chamomilla recutita D4, Carbo vegetabilis D12. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Trastornos del metabolismo del calcio, por ejemplo, en diátesis exudativa escrofulismo y linfatismo.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	079H2000 SSA 31-Mar-2000
CARDIHEEL®	**CARDIACUM HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de trastornos causados por la angina de pecho.	Cada tableta contiene: Spigelia anthelmia D4, Gelsemium sempervirens D4, Glonoinum D5, Sulfur D12, Cactus grandiflorus D4, Kalium carbonicum D4, Castoreum sibiricum D6, Arnica montana D4, Ranunculus bulbosus D6. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Trastornos funcionales anginosos, incluyendo los de origen vertebral.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	072H2000 SSA 27-Mar-2000
CRUROHEEL®	**CRUROHEEL S®**	Auxiliar en el tratamiento de supuraciones fistulares, úlcera varicosa.	Cada tableta contiene: Mercurius praecipitatus ruber D8, Apis mellifica D4, Lycopodium clavatum D4, Acidum silicicum D6, Hamamelis virginiana D4, Carbo vegetabilis D8, Pulsatilla pratensis D6. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Supuraciones fistulares, úlcera crural (varicosa).	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas,1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	067H2000 SSA 27-Mar-2000
DROPERTEEL®	**DROPERTEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la bronquitis.	Cada tableta contiene: Drosera rotundifolia D4, Lachesis mutus D12, Carbo vegetabilis D12, Coccus cacti D4, Kalium Carbonicum D12. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Bronquitis de etiología diversa, especialmente como coadyuvante en bronquitis congestiva; tos ferina.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	098H99 SSA 22-Nov-1999
DUOHEEL®	**DUODENOHEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de acidez estomacal.	Cada tableta contiene: Anacardium semecarpus D4, Argentum nitricum D6, Ipecacuanha D4, Iodum metallicum D6, Lachesis mutus D12, Petroleum rectificatum D6, Robinia pseudoacacia D4. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Duodenitis, úlcera duodenal, hiperacidez.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	001H2000 SSA 1-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
GASTHEEL®	**GASTRICUMEEL®**	Auxiliar en algunos casos de gastritis.	Cada tableta contiene: Argentum nitricum 6D, Nux vomica 4D, Arsenicum album 6D, Carbo vegetabilis 6D, Pulsatilla pratensis 4D, Antimonium crudum 6D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Gastritis aguda y crónica, pirosis, meteorismo.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido de 10 a 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	008H95 SSA 6-Abr-1995
HEPEEL®	**HEPEEL®**	Auxiliar en trastornos hepáticos (hepatopatías).	Cada tableta contiene: Lycopodium clavatum 3D, Cardus marianus 2D, Chelidonium majus 4D, Phosphorus 6D, Nux moschata 4D, Veratrum album 6D, China 3D, Colocynthis 6D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Trastornos hepáticos primarios y secundarios, hepatopatías.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	007H95 SSA 6-Abr-1995
KLIMAKT-HEEL®	**KLIMAKT-HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de los trastornos de la menopausia.	Cada tableta contiene: Sanguinaria canadensis D3, Sepia officinalis D4, Sulfur D4, Ignatia amara D4, Simarouba cedron D4, Stannum metallicum D12, Lachesis mutus D12. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Trastornos del climaterio.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	088H98 SSA 29-Oct-1998
LITHIMEEL®	**LITHIUMEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por el reumatismo y la gota.	Cada tableta contiene: Lithium carbonicum D3, Colchicum autumnale D4, Ferrum phoshoricum D6, Natrium carbonicum D4, Nux vomica D6, Rhus toxicodendron D6. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Diátesis reumática y gotosa.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	070H2000 SSA 27-Mar-2000
MERCUREEL®	**MERCURIUS HEEL S®**	Auxiliar en el tratamiento de inflamación y dolor de la faringe y amígdalas.	Cada tableta contiene: Mercurius solubilis hahnemanni D10, Hepar sulfur D8, Lachesis mutus D12, Phytolaca americana D4, Ailanthus altissima D3, Echinacea angustifolia D3, Atropa belladonna D4. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Furúnculus, ántrax y otras supuraciones como, por ejemplo, en tejidos periamigdalares.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	086H98 SSA 29-Oct-1998
NER HEEL®	**NERVOHEEL®**	Auxiliar en algunos casos de trastornos nerviosos de la menopausia.	Cada tableta contiene: Acidum phosphoricum 4D, Ignatia 4D, Sepia 4D, Psorinum 12D, Kalium bromatum 4D, Zincum valerianicum 4D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Trastornos psicosomáticos, neurosis climatéricas.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	023H95 SSA 4-Jul-1995

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
VISEEL®	**OCULOHEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la conjuntivitis.	Cada tableta contiene: Apis mellifica D4, Natrium muriaticum D6, Rhus toxicodendron D12, Hepar sulfuris D12, Spigelia anthelmia D6, Delphinium staphisagria D4, Aethiops mineralis D8. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Conjuntivitis, blefaritis, dacriocistitis (especialmente formas crónicas).	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	081H98 SSA 15-Oct-1998
OSTEOHEEL S®	**OSTEOHEEL S®**	Auxiliar en el tratamiento de dolores óseos y el dolor por espolón calcáneo.	Cada tableta contiene: Hekla lava D6, Kalium iodatum D4, Asa foetida D4, Stillingia sylvatica D4, Araneus diadematus D6, Natrium sulfuricum D4, Mercurius praecipitatus ruber D9, Calcium phosphoricum D6. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Periostitis, exostosis (por ejemplo, espolón calcáneo). Acufenos (tinnitus aurium) como consecuencia de otosclerosis.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	096H99 SSA 22-Nov-1999
PEONEEL®	**PAEONIA-HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por las hemorroides.	Cada tableta contiene: Paeonia officinalis D3, Graphites D6, Nux vomica D4, Sulfur D4, Acidum nitricum D6, Hamamelis virginiana D3. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Eccemas y fisuras anales, hemorroides.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	064H98 SSA 10-Sep-1998
PECTHEEL®	**PECTUS-HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de la angina de pecho.	Cada tableta contiene: Natrium nitrosum D5, Spigelia anthelmia D4, Phosphorus D12, Aconitum napellus D8, Arnica montana D8, Argentum nitricum D10. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Afecciones anginosas.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	071H2000 SSA 27-Mar-2000
RENHEEL®	**RENEEL®**	Auxiliar en casos de cistitis y uretritis.	Cada tableta contiene: Berberis 2D, Acidum nitricum 4D, Cantharis 5D, Plumbum aceticum 6D, Pareira brava 3D, Sabal serrulatum 2D, Causticum 4D, Alumina 12D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Enfermedades inflamatorias del tracto urinario con o sin formación de cálculos (litiasis).	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	024H95 SSA 4-Jul-1995

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
RHEUTHEEL®	**RHEUMA-HEEL®**	Auxiliar en casos de reumatismo.	Cada tableta contiene: Rhus toxicodendron 6D, Bryonia 4D, Causticum Hahnemanni 4D, Arnica 4D, Ferrum phosphoricum 6D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Reumatismo de partes blandas, afecciones (peri-)artríticas.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	029H95 SSA 3-Oct-1995
SPASCUPREEL®	**SPASCUPREEL®**	Auxiliar en espasmos de vías digestivas y genitourinarias.	Cada tableta contiene: Colocynthis 4D, Passiflora incarnata 2D, Ammonium bromatum 4D, Agaricus 4D, Atropinum sulfuricum 6D, Chamomilla recutita 3D, Veratrum album 6D, Cuprum sulfuricum 6D, Magnesium phosphoricum 6D, Aconitum napellus 6D, Gelsemium sempervirens 6D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Espasmos en órganos huecos de musculatura lisa (estómago, intestino, vesícula biliar, útero y vías urinarias). Espasmos en la musculatura estriada (miogelosis, endurecimiento muscular).	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	006H95 SSA 4-Abr-1995
SPIGELON®	**SPIGELON®**	Auxiliar en el tratamiento de la migraña y otros dolores de cabeza.	Cada tableta contiene: Spigelia anthelmia 3D, Melilotus officinalis 3D, Atropa belladonna 3D, Natrium carbonicum 3D, Bryonia alba 3D, Silicea terra 12D, Gelsemium sempervirens 3D, Thuja occidentalis 12D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Cefaleas constitucionales.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	005H95 SSA 30-Mar-1995
STRUMMEL T®	**STRUMEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento del bocio juvenil.	Cada tableta contiene: Spongia tosta D3, Calcium iodatum D4, Fucus vesiculosus D4. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Bocio juvenil y como profilaxis de bocio.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	066H2000 SSA 27-Mar-2000
SULFEEL®	**SULFUR-HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de algunas afecciones leves de la piel con comezón y sequedad.	Cada tableta contiene: Sulfur D4, Daphne mezereum D4, Arsenicum album D6, Pix líquida D6, Caladium seguinum D4, Capsicum annum D4. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Dermatosis, eccema; prurito.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	062H98 SSA 10-Sep-1998
YPSILOHEEL®	**YPSILOHEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias ocasionadas por alteraciones en el tránsito digestivo como la hernia hiatal.	Cada tableta contiene: Asa foetida D4, Ignatia D4, Paris quadrifolia D4, Thuja occidentalis D6, Pulsatilla pratensis D4, Lachesis mutus D8, Moschus moschiferus D6, Glonoinum D6. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Distonía vegetativa, globo histérico.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	029H99 SSA 14-Sep-1999
GRIHEEL®	**GRIPP-HEEL®**	Auxiliar en las molestias del resfriado común (gripe).	Cada tableta contiene: Aconitum 4D, Bryonia 4D, Lachesis 12D, Eupatorium perfoliatum 3D, Phosphorus 5D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Gripe y resfriado común, así como para aumentar las defensas propias del organismo en caso de otras enfermedades infecciosas (catarros) febriles.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido de 3 a 5 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	032H95 SSA 16-Nov-1995

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
VERTHEEL®	**VERTIGOHEEL®**	Auxiliar en casos de mareos de diverso origen.	Cada tableta contiene: Cocculus 4D, Conium maculatum 3D, Ambra grisea 6D, Petroleum rectificatum 8D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Vértigo de etiología diversa (especialmente los de origen arterioesclerótico).	Oral (sublingual) En general, 3 comprimidos 3 veces al día. En caso de crisis de vértigo, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos.	028H95 SSA 4-Sep-1995
AREEL®	**DIARRHEEL S®**	Auxiliar en el tratamiento de diarreas de diverso origen.	Cada tableta contiene: Argentum nitricum D8, Arsenicum album D8, Colchicum autumnale D6, Citrullus colocynthis D6, Mercurius sublimatus corrosivus D8, Podophyllum peltatum D6, Veratrum album D4, Tormentilla D2. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Diarreas agudas y crónicas, gastroenteritis.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	085H98 SSA 15-Oct-1998
TRAMEEL S®	**TRAUMEEL S®**	Auxiliar en algunos casos de inflamaciones y dolores por contusiones y fracturas.	Cada tableta contiene: Arnica montana 2D, Chamomilla recutita 3D, Calendula officinalis 2D, Symphytum officinale 8D, Hamamelis virginiana 2D, Bellis perennis 2D, Achillea millefolium 3D, Echinacea angustifolia 2D, Atropa belladonna 4D, Echinacea purpurea 2D, Aconitum napellus 3D, Hypericum perforatum 2D, Mercurius solubilis 8D, Hepar sulfuris 8D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Traumatismos como esguinces y distorsiones, contusiones, hematomas y hemartros, fracturas, edemas posquirúrgicos y postraumáticos y tumefacción edematosa de partes blandas. Procesos inflamatorios y degenerativos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, especialmente en los del aparato locomotor y de los tejidos de sostén (tendosinovitis, estiloiditis, epicondilitis, bursitis, periartritis escapulohumeral, etc.) artrosis de cadera, rodilla y pequeñas articulaciones. Conmoción cerebral aguda.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 3 veces al día.	003H95 SSA 28-Mar-1995
LUAHEEL®	**LUFFA COMPOSITUM® HEEL**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias que acompañan a la rinitis.	Cada tableta contiene: Aralia racemosa D1, Arsenicum iodatum D8, Lobelia inflata D6, Luffa operculata D12. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Rinitis alérgica estacional (fiebre del heno).	Oral (sublingual) Adultos: en general, 1 comprimido 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	032H2000 SSA 8-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
ZEEL T®	**ZEEL T®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la artritis.	Cada tableta contiene: Cartílago suis D4, Funiculus umbilicalis suis D4, Embryo suis D4, Placenta suis D4, Rhus toxicodendron D2, Arnica montana D1, Solanum dulcamara D2, Symphytum D8, Sanguinaria canadensis D3, Sulfur D6, Nadidum D6, Coenzyma A D6, Acidum alpha-liponicum D6, Natrium oxalaceticum D6, Acidum silicicum D6. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Artrosis (especialmente en gonartrosis), poliartrosis, espondilartrosis, periartritis escapulohumeral.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido de 3 a 5 veces al día.	040H2000 SSA 8-Feb-2000
MOLYBDAN®	**MOLYBDAN COMPOSITUM®**	Coadyuvante para facilitar la función enzimática y la asimilación de algunos minerales en enfermedades crónicas, como algunos estados precancerosos.	Cada tableta contiene: Natrium molybdaenicum D3, Zincum gluconicum D3, Magnesium asparaginicum D3, Ferrum Fumaricum D4, Cobaltum gluconicum D4, Cerium oxalicum D4, Kalium asparaginicum D4, Manganum gluconicum D4, Cuprum sulfuricum D6, Niccolum aceticum D8, Rubidium chloratum D8, Sulfur D6, Phosphorus D6. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Regulación del equilibrio mineral.	Oral (sublingual) En general, inicialmente 1 comprimido diariamente. Posteriormente 1 comprimido cada 2 días.	076H2000 SSA 31-Mar-2000
ENGYSTOL®	**ENGYSTOL®**	Auxiliar en el tratamiento del resfriado común de repetición (catarro crónico).	Cada tableta contiene: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30, Sulfur D4, Sulfur D10. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Para activar los sistemas de defensa inespecíficos, especialmente en casos de gripe y de infecciones (catarros) febriles de origen poco claro (también en enfermedades virales).	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido de 1 a 3 veces al día.	024H99 SSA 20-Ago-1999
LYMPHOMYOSOT®	**LYMPHOMYOSOT®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por bronquitis crónica.	Cada tableta contiene: Myosotis arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale D4, Sarsaparrilla D6, Scrophularia nodosa D3, Juglans regia D3, Calcium phosphoricum D12, Natrium sulfuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levothyroxinum D12, Araneus diadematus D6, Geranium robertianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum iodatum D12. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos, tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer enfermedades infecciosas). Tumefacciones de los glanglios linfáticos. Hipertrofia amigdalar y amigdalitis crónica.	Oral (sublingual) En general, 3 comprimidos 3 veces al día.	004H2002 SSA

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
CIRHEEL®	**AESCULUS COMPOSITUM**	Coadyuvante en los trastornos de la circulación periférica.	Cada 100 ml. Contienen: Aesculus hippocastanum D1, Secale cornutum D3, Viscum album D2, Tabacum D10, Solanum nigrum D6, Arnica montana D3, Echinacea angustifolia D2, Baptisia tinctoria D4, Rhus toxicodendron D4, Cuprum metallicum D13, Ruta graveolens D4, Solanum dulcamara D4, Colchicum autumnale D4, Barium iodatum D6, Hamamelis virginiana D4, Apis mellifica D4, Acidum benzoicum D4, Eupatorium cannabinum D3, Arteria suis D10, Natrium pyruvicum D8. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Estimulación de los sistemas de defensa en trastornos de la circulación periférica, por ejemplo, pie de fumador, claudicación intermitente, endarteritis obliterante, arterioesclerosis; úlcera de decúbito, elefantiasis, hipercolesterolemia, dismenorrea, sordera del oído interno, trastornos circulatorios postembólicos; linfatismo, estados postapoplejía y postinfarto.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	074H2000 SSA 28-Mar-2000
AESHEEL®	**AESCULUS-HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de varices y hemorroides.	Cada 100 ml. Contienen: Aesculus hippocastanum D2. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Estasis venosa y sus secuelas, hemorroides.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día.	007H2000 SSA 2-Feb-2000
HEELARN®	**ARNICA-HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las inflamaciones agudas.	Cada 100 ml. Contienen: Arnica montana D3, Bryonia cretica D4, Acidum benzoicum e resina D3, Colchicum autumnale D4, Mercurialis perennis D3, Eupatorium cannabinum D4, Solanum lycopersicum D3, Echinacea angustifolia D3, Rhus toxicodendron D6, Eucalyptus globulus D4, Baptisia tinctoria D4, Solanum nigrum D4, Dulcamara solanum D4, Apis mellifica D4. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Inflamaciones (sub-) agudas y (sub-) crónicas, locales y generales.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día	027H2000 SSA 14-Feb-2000
ARTHEEL®	**ARTERIA-HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de los trastornos circulatorios periféricos, como edema, ardor y comezón.	Cada 100 ml. Contienen: Secale cornutum D4,Viscum album D4, Barium iodatum D6, Arnica montana D12, Solanum nigrum D4, Tabacum D8, Phosphorus D8. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Trastornos circulatorios periféricos.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día	083H99 SSA 22-Oct-1999
AUHEEL®	**AURUMHEEL® N**	Coadyuvante en el tratamiento de trastornos cardiocirculatorios, hipotensión arterial y trastornos del ritmo cardiaco.	Cada 100 ml. Contienen: Aurum muriaticum natronatum D6, Valeriana officinalis D1, Spartium scoparium D1, Convallaria majalis D2, Arnica montana D1, Crataegus Oxyacantha Ø. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Trastornos cardiocirculatorios vegetativos y funcionales, hipotensión, trastornos del ritmo cardiaco.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	049H2000 SSA 8-Feb-2000
CACTHEEL®	**CACTUS COMPOSITUM S**	Coadyuvante en el tratamiento de la angina de pecho.	Cada 100 ml. Contienen: Cactus grandiflorus D1, Spigelia anthelmia D3, Kalium carbonicum D3, Glonoinum D3, Crataegus Oxyacantha D1. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Trastornos de la circulación coronaria, afecciones anginosas, angina de pecho.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día.	030H2000 SSA 8-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
CAUSHEEL®	**CAUSTICUM COMPOSITUM**	Coadyuvante en las molestias causadas por las quemaduras leves.	Cada 100 ml. Contienen: Causticum hahnemanni D3, Natrium oxalaceticum D8, Acidum alpha ketoglutaricum D10, Acidum fumaricum D10, Arsenicum album D10, Sulfur D12, Arnica montana D4, Pulsatilla nigricans D6, Embryo suis D10, Histaminum D18. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Como coadyuvante en quemaduras de todo tipo, síndrome de irradiación, afecciones causadas por la exposición a radio, telecobalto e isótopos radiactivos. Estados de agotamiento.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	017H2000 SSA 2-Feb-2000
COLNADUL®	**COLNADUL®**	Auxiliar en el tratamiento del reumatismo.	Cada 100 ml. Contienen: Citrullus colocynthis D4, Solanum dulcamara D4, Natrium carbonicum D4. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Estados artríticos y reumatismo de partes blandas, especialmente si hay agravación en tiempo húmedo.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	050H2000 SSA 8-Feb-2000
CRALONIN®	**CRALONIN®**	Coadyuvante en el tratamiento de la angina de pecho.	Cada 100 ml. Contienen: Crataegus oxyacantha Ø, Spigelia anthelmia D2, Kalium Carbonicum D3. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Corazón senil, secuelas de lesiones miocárdicas, trastornos cardiacos de tipo nervioso (neurosis cardiaca), dolores cardiacos punzantes y de otro tipo (afecciones anginosas).	Oral (sublingual) En tratamientos a largo plazo, 10-20 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (esta dosificación no debe tomarse durante mucho tiempo sin el consejo médico).	003H2000 SSA 1-Feb-2000
EUPHOHEEL®	**EUPHORBIUM COMPOSITUM S**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias que acompañan a la rinitis.	Cada 100 ml. Contienen: Luffa operculata D6, Mercurius bijodatus D8, Hepar sulfur D10, Argentum nitricum D10, Sinusitis nosode D13, Euphorbium D3, Pulsatilla pratensis D2, Mucosa nasalis suis D8. Excipiente: c.b.p. 100 ml.	Sinusitis crónicas (senos paranasales, frontales, etmoidales y esfenoidales), catarro tubárico del oído, hidropesía del oído medio.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos; posteriormente, se ha de reducir la dosis a 10 gotas 6 veces al día.	068H98 SSA 10-Sep-1998
GALHEEL®	**GALIUM-HEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosas (drenador).	Cada 100 ml contienen: Galium aparine D3, Galium mollugo D3, Sedum acre D3, Sempervivum tectorum D4, Clematis recta D4, Thuja occidentalis D3, Caltha palustris D3, Ononis spinosa D4, Juniperus communis D4, Hedera helix D4, Betula alba D2, Echinacea angustifolia D5, Calcium fluoratum D8, Phosphorus D8, Aurum metallicum D10, Argentum metallicum D8, Apis mellifica D12, Acidum nitricum D6, Urtica urens D3. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Para estimular los mecanismos de defensa inespecíficos, especialmente en caso de enfermedades crónicas.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día.	052H2000 SSA 8-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
GYNAHEEL®	**GYNÄCOHEEL®**	Auxiliar en el tratamiento del síndrome premenstrual y en las molestias que acompañan a la menstruación.	Cada 100 ml. Contienen: Apis mellifica 4D, Helonias dioica 4D, Melilotus officinalis 3D, Ammonium bromatum 4D, Lilium tigrinum 4D, Aurum iodatum 12D, Palladium metallicum 12D, Naja tripudians 12D, Crabro vespa 4D, Viburnum opulus 2D, Platinum metallicum 12D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Procesos inflamatorios de los órganos genitales femeninos, por ejemplo: anexitis (ovaritis, salpingitis), parametritis, miometritis, endometritis, colpitis.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	008H97 SSA 20-Mar-1997
HORMEEL S®	**HORMEEL® S**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias que acompañan a la menstruación.	Cada 100 ml. Contienen: Senecio fuchsii 6D, Ignatia 6D, Acidum nitricum 4D, Thlaspi bursi pastoris 3D, Erigeron canadensis 3D, Calcium carbonicum 8D, Moschus 6D, Aquilea vulgaris 4D, Viburnum opulus 3D, Cypripedium 8D, Pulsatilla pratensis 4D, Origanum mejorana 4D, Sepia officinalis 6D, Nux moschata 6D, Cyclamen europaeum 4D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Trastornos funcionales del ciclo menstrual. Como tratamiento coadyuvante en caso de esterilidad. Para regular la función de las glándulas endocrinas.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día.	009H95 SSA 6-Abr-1995
HUSTEEL®	**HUSTEEL®**	Auxiliar en el tratamiento del alivio de la tos de diverso origen.	Cada 100 ml. Contienen: Arsenicum jodatum D6,Atropa belladonna D4, Scilla marítima D4, Cuprum aceticum D6, Causticum hahnemanni D6. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Tos, por ejemplo, en el curso de resfriados, bronquitis espasmódica y pleuritis.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de crisis de tos, varias veces 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	069H98 SSA 10-Sep-1998
KALHEEL®	**KALMIA COMPOSITUM**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la artritis.	Cada 100 ml. Contienen: Kalmia latifolia D8, Mercurius praecipitatus ruber D10, Asa foetida D8. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Enfermedades articulares y del tejido conjuntivo, por ejemplo, artritis, artrosis y periartritis. Afecciones de los tendones y de los ligamentos, del periostio y del tejido conjuntivo de los vasos, afecciones cardiacas (posluéticas), dermatosis crónicas.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	015H2000 SSA 2-Feb-2000
LAMIOFLUR®	**LAMIOFLUR®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por el flujo transvaginal.	Cada 100 ml. Contienen: Lamium album D4, Kreosotum D6, Geum urbanum D5, Alumina D12, Lapathum acutum D6, Platinum metallicum D12, Alchemilla vulgaris D3, Natrium carbonicum D6, Asterias rubens D6, Kalium sulphuratum D4, Acidum nitricum D6, Hydrastis canadensis D4, Daphne mezereum D4, Viola tricolor D4. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Enfermedades de piel y mucosas, por ejemplo, leucorrea; rinitis aguda y crónica; sinusitis.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	005H2000 SSA 1-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
LEPDRA®	**LEPTANDRA COMPOSITUM**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la dificultad para la digestión.	Cada 100 ml. Contienen: Leptandra D2, Quassia amara D3, Podophyllum peltatum D3, Arsenicum album D4, Carbo vegetabilis D10, Niccolum metallicum D10, Phosphorus D6. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Estimulación de los sistemas de defensa propios del organismo en caso de síndrome epigástrico, especialmente en afecciones crónicas del hígado y del páncreas o en afecciones agudas (por ejemplo, tras errores dietéticos). Meteorismo (gases). Congestión portal.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	014H2000 SSA 2-Feb-2000
LYMPHOMYOSOT®	**LYMPHOMYOSOT®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la bronquitis crónica.	Cada 100 ml. Contienen: Myosotis arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale D4, Sarsaparrilla D6, Scrophularia nodosa D3, Juglans regia D3, Calcium phosphoricum D12, Natrium sulphuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levothyroxinum D12, Araneus diadematus D6, Geranium robertianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum iodatum D12. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Linfatismo (tendencia a la hipertrofia de los órganos linfáticos, tendencia a la formación de edemas y predisposición a padecer enfermedades infecciosas). Tumefacciones de los ganglios linfáticos. Hipertrofia amigdalar y amigdalitis crónica.	Oral (sublingual) En general, 15-20 gotas 3 veces al día.	006H2000 SSA 1-Feb-2000
NASHEEL®	**NASO-HEEL® S**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la rinitis aguda.	Cada 100 ml. Contienen: Cistus canadensis D4, Arum maculatum D4, Melilotus officinalis D3, Vinca minor D3, Veronica officinalis D3, Mercurius bijodatus D8, Ammonium carbonicum D3, Lemna minor D3, Cinnabaris D8, Sticta pulmonaria D4, Phosphorus D6, Kalium bichromicum D5, Hydrastis canadensis D4, Aurum muriaticum D6. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Rinitis aguda y crónica, con o sin afectación de los senos paranasales.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	056H2000 SSA 8-Feb-2000
PODYLLUM®	**PODOPHYLLUM COMPOSITUM**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por las hemorroides.	Cada 100 ml. Contienen: Podophyllum peltatum D2, Podophyllum peltatum D10, Muriaticum acidum D4, Muriaticum acidum D10, Ignatia amara D3, Mercurius corrosivus D8. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Trastornos hemorroidales, colitis catarral, por ejemplo, colitis mucosa y ulcerosa. Para tratamiento pre- y pos-quirúrgico en caso de neoplasias.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	013H2000 SSA 2-Feb-2000
POPUCOMPOSITUM®	**POPULUS COMPOSITUM S**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la infección de las vías urinarias.	Cada 100 ml. Contienen: Populus tremuloides Ø, Sabal serrulatum Ø, Capsicum annuum D3, Bucco D3, Orthosiphon staminеus D3, Piper cubeba D3, Camphora D3, Apis mellifica D3, Solidago virgaurea D3, Scrophularia nodosa D3, Ononis spinosa D3, Petroselinum crispum D3, Cucurbita pepo D3, Baptisia tinctoria D3, Arctostaphylos uva ursi D3, Scilla marítima D3, Equisetum hyemale D3, Urtica urens D3, Kreosotum D5, Berberis vulgaris D5, Cantharis vesicatoria D5, Terebinthina laricina D6, Mercurius sublimatus corrosivus D8. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Estimulación de los sistemas de defensa en caso de trastornos de la función y excreción renal, albuminuria, procesos irritativos de las vías urinarias, cistopielitis, cistitis, hidronefrosis, nefrolitiasis (como medicamento complementario también en bacteriuria) y, especialmente, en trastornos de la micción (primer estadío del adenoma prostático).	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas, cada hora.	054H2000 SSA 8-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
PSORIHEEL®	**PSORINOHEEL® N**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades de la piel, daños hepáticos y en general, en enfermedades crónicas.	Cada 100 ml. Contienen: Psorinum D10, Medorrhinum D12, Sulfur D6, Thuja occidentalis D6, Bufo bufo D10, Natrium muriaticum D12, Vaccininum D8, Bismutum kalium iodidum D5, Nerium oleander D4, Cicuta virosa D5, Bacillinum D12. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Agente terapéutico de estimulación en enfermedades de la piel, daños hepáticos y, en general, en enfermedades crónicas.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día.	042H2000 SSA 8-Feb-2000
PROCTHEEL®	**PROCTHEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de estreñimiento y hemorroides.	Cada 100 ml. Contienen: Lycopodium clavatum D4, Sulfur D6, Phosphorus D6, Alumina D8. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Atonía rectal. Catarro de las mucosas.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día.	010H2000 SSA 2-Feb-2000
RHODONEEL®	**RHODODENDRONEEL® S**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de reumatismo y algunas neuralgias.	Cada 100 ml. Contienen: Rhododendron D3, Spiraea ulmaria D3, Asclepias tuberosa D6, Euphorbia cyparissias D3, Dulcamara solanum D4, Ledum palustre D4, Aconitum napellus D4, Stellaria media D2, Lithium benzoicum D3, Pulsatilla nigricans D3, Acidum benzoicum e resina D3. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Neuralgias, reumatismo de partes blandas y afecciones (peri-) artríticas, principalmente cuando se agravan en tiempo húmedo.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	041H2000 SSA 8-Feb-2000
SCHWEF-HEEL®	**SCHWEF-HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de afecciones leves de la piel con comezón y ardor.	Cada 100 ml. Contienen: Sulfur D4, Sulfur D6, Sulfur D12, Sulfur D30, Sulfur D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Dermatosis, especialmente eccemas pruriginosos, piodermitis. Para estimular los mecanismos de defensa.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	083H98 SSA 15-Oct-1998

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
SPIGELON®	**SPIGELON®**	Auxiliar en el tratamiento de dolores de cabeza.	Cada 100 ml. Contienen: Spigelia anthelmia D3, Atropa belladonna D3, Bryonia cretica D3, Gelsemium sempervirens D3, Melilotus officinalis D3, Natrium carbonicum D3, Acidum silicicum D12, Thuja occidentalis D12. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Cefaleas constitucionales.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de afecciones agudas, varias veces 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	061H98 SSA 10-Sep-1998
SYZYHEEL COMPOSITUM®	**SYZYGIUM COMPOSITUM**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la diabetes mellitus no insulinodependiente.	Cada 100 ml. Contienen: Secale cornutum D6, Syzygium jambolanum D8, Lycopodium clavatum D4, Natrium sulfuricum D10, Acidum Alpha ketoglutaricum D8, Natrium choleinicum D6, Phloridzinum D10, Plumbum metallicum D18, Arsenicum album D8, Ignatia amara D4, Acidum phosphoricum D4, Acidum sulfuricum D8, Acidum sarcolacticum D4, Kreosotum D6, Kalium picrinicum D4, Curare D8, Hepar suis D10, Pankreas suis D10. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Estimulación de los sistemas de defensa y de las funciones glandulares en caso de diabetes senil y trastornos asociados.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día.	004H2000 SSA 1-Feb-2000
TANAHEEL®	**TANACET-HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de nerviosismo con irritabilidad.	Cada 100 ml. Contienen: Tanacetum vulgare D1, Artemisia vulgaris D2, Absinthium D4, Thymus Serpyllum D3 Chenopodium anthelminticum D6. , Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Estados idiopáticos de irritabilidad nerviosa, especialmente en helmintiasis. Anorexia (alternando con bulimia).	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día.	008H2000 SSA 2-Feb-2000
TAREPHEDREEL®	**TARTEPHEDREEL®**	Auxiliar en el tratamiento de la inflamación y la eliminación de las secreciones originadas por infecciones de las vías respiratorias altas.	Cada 100 ml. Contienen: Tartarus stibiatus 4D, Hepatica triloba 3D, Belladonna atropa 4D, Natrium sulphuricum 4D, Arsenicum iodatum 6D, Quebracho 5D, Naphthalinum 6D, Betonica officinalis 2D, Anisum stellatum 3D, Lobelia inflata 4D, Ipecacuanha 4D, Blatta orientalis 6D, Medorrhinum 8D, Ephedra vulgaris 3D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Bronquitis, sobre todo la de naturaleza asmática; asma bronquial, tos con expectoración difícil. Tos persistente en niños escrofulósicos, catarro bronquial, catarro laríngeo de tipo diverso, ciertas formas de tos ferina. Este medicamento está indicado en todas las afecciones catarrales de las vías respiratorias.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).	018H97 SSA 22-Sep-1997
TRAMEEL S®	**TRAUMEEL® S**	Auxiliar en algunos casos de inflamaciones y dolores por contusiones y fracturas.	Cada 100 ml. Contienen: Arnica montana 2D, Chamomilla recutita 3D, Calendula officinalis 2D, Symphytum officinale 8D, Hamamelis virginiana 2D, Bellis perennis 2D, Achillea millefolium 3D, Echinacea angustifolia 2D, Atropa belladonna 4D, Echinacea purpurea 2D, Aconitum napellus 3D, Hypericum perforatum 2D, Mercurius solubilis 8D, Hepar sulfuris 8D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Traumatismos como esguinces y distorsiones, contusiones, hematomas y hemartros, fracturas, edemas posquirúrgicos y postraumáticos y tumefacción edematosa de partes blandas. Procesos inflamatorios y degenerativos con inflamación asociada en diversos órganos y tejidos, especialmente en los del aparato locomotor y de los tejidos de sostén (tendosinovitis, estiloiditis, epicondilitis, bursitis, periartritis escapulohumeral, etc.) artrosis de cadera, rodilla y pequeñas articulaciones. Conmoción cerebral aguda.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de edema de partes blandas, 30 gotas 3 veces al día.	010H95 SSA 6-Abr-1995

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
VALHEEL®	**VALERIANAHEEL®**	Auxiliar en algunos casos de estados de intranquilidad o neurastenia.	Cada 100 ml. Contienen: Valeriana Ø, Lupulus Ø, Crataegus Ø, Hypericum 1D, Melissa Ø, Chamomilla Ø, Avena sativa Ø, Acidum picrinicum 5D, Kalium bromatum 1D, Ammonium bromatum 1D, Natrium bromatum 1D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Sedante en estados de intranquilidad. Neurastenia.	Oral (sublingual) En general, 15 gotas 3 veces al día; por la noche 25 gotas. La dosis única (por toma) para lactantes y niños pequeños es de 3 gotas; para niños entre 2 y 6 años de edad, 5 gotas y, entre 6 y 12 años, 10 gotas.	018H95 SSA 4-Jul-1995
VERTHEEL®	**VERTIGOHEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de mareo asociado a la menopausia, estrés y al viajar.	Cada 100 ml. Contienen: Conium maculatum 3D, Ambra grisea 6D, Petroleum 8D, Cocculus 4D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Vértigo de etiología diversa (especialmente los de origen arterioesclerótico).	Oral (sublingual) En general, 15-20 gotas 3 veces al día; en caso de crisis de vértigo, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos.	019H95 SSA 4-Jul-1995
OMITTUSHEEL®	**VOMITUSHEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de vómitos y náuseas de diverso origen.	Cada 100 ml. Contienen: Ipecacuanha D4, Aethusa cynapium D4, Nux vomica D4, Apomorphinum hydrochloricum D6, Colchicum autmnale D6, Ignatia amara D6. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Vómitos y náuseas de etiología diversa.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente cada 15 minutos 10 gotas (durante 2 horas como máximo).	084H98 SSA 15-Oct-1998

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
ACOHEEL®	**ACONITUM HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por el resfriado común.	Cada 100 ml. Contienen: Aconitum napellus D2, Aconitum napellus D10, Aconitum napellus D30, Aconitum napellus D200, Eucalyptus D2, Eucalyptus D10, Eucalyptus D30, Ipecacuanha D2, Ipecacuanha D10, Ipecacuanha D30, Ipecacuanha D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Procesos gripales y catarrales (especialmente en los estadíos iniciales).	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	018H2000 SSA 2-Feb-2000
ANACHEEL®	**ANACARDIUM HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la gastritis como ardor y regurgitación.	Cada 100 ml. Contienen: Anacardium semecarpus D6, Anacardium semecarpus D10, Anacardium semecarpus D30, Anacardium semecarpus D200, Iodum metallicum D30, Iodum metallicum D200, Iodum metallicum D1000, Ipecacuanha D4, Ipecacuanha D10, Ipecacuanha D30, Ipecacuanha D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Síndrome duodenal, úlcera duodenal, síndrome del dumping (posgastrectomía), vómito (matutino).	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	037H2000 SSA 8-Feb-2000
APICCORD®	**APIS HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de edemas (facilita la eliminación del agua del organismo).	Cada 100 ml. Contienen: Apis mellifica D2, Apis mellifica D10, Apis mellifica D30, Apis mellifica D200, Apis mellifica D1000, Apisinum D6, Apisinum D30, Scilla maritima D2, Scilla maritima D10, Scilla maritima D30, Tartarus stibiatus D2, Tartarus stibiatus D10, Tartarus stibiatus D30, Tartarus stibiatus D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Edemas, eccema pustuloso y bulloso, irritabilidad cerebral.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	028H2000 SSA 8-Feb-2000
BELACCORD®	**BELLADONNA HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de la inflamación y el dolor de garganta.	Cada 100 ml. Contienen: Atropa belladonna D2, Atropa belladonna D10, Atropa belladonna D30, Atropa belladonna D200, Atropa belladonna D1000, Echinacea angustifolia D10, Echinacea angustifolia D30, Echinacea angustifolia D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Inflamaciones localizadas como, por ejemplo, amigdalitis, furúnculus y ántrax.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	082H98 SSA 15-Oct-1998
BERBACCORD®	**BERBERIS HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la infección de las vías urinarias y los cálculos renales.	Cada 100 ml. Contienen: Berberis vulgaris D2, Berberis vulgaris D10, Berberis vulgaris D30, Berberis vulgaris D200, Citrullus colocynthis D2, Citrullus colocynthis D10, Citrullus colocynthis D30, Citrullus colocynthis D200, Veratrum album D3, Veratrum album D10, Veratrum album D30, Veratrum album D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Procesos inflamatorios e irritativos (con o sin concreciones) a nivel del tracto urogenital y de las vías biliares.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	065H98 SSA 10-Sep-1998

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
CEANHEEL®	**CEANOTHUS HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por alteraciones pancreáticas.	Cada 100 ml. Contienen: Ceanothus americanus D10, Ceanothus americanus D30, Ceanothus americanus D200, Lachesis mutus D10, Lachesis mutus D30, Lachesis mutus D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Síndrome epigástrico, pancreatopatías.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	025H2000 SSA 2-Feb-2000
CHELCCORD®	**CHELIDONIUM HOMACCORD® N**	Auxiliar en el tratamiento de los trastornos de la digestión por alteraciones de la secreción biliar.	Cada 100 ml. Contienen: Chelidonium majus D10, Chelidonium majus D30, Chelidonium majus D200, Atropa belladonna D10, Atropa belladonna D30, Atropa belladonna D200, Atropa belladonna D1000, Fel tauri D10, Fel tauri D30, Fel tauri D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Colangitis, colecistitis, cólicos biliares, hepatitis aguda y crónica, ictericia obstructiva, daños hepáticos (daños del parénquima). Como medicamento complementario en arritmia cardiaca.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	071H99 SSA 22-Oct-1999
CHINCCORD®	**CHINA HOMACCORD® S**	Auxiliar en el tratamiento del agotamiento físico.	Cada 100 ml. Contienen: China officinalis D2, China officinalis D10, China officinalis D30, China officinalis D200, Sepia officinalis D6, Sepia officinalis D30, Sepia officinalis D200, Sepia officinalis D1000. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Estados de agotamiento y de debilidad en general. Agente terapéutico básico en osteocondrosis.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	029H2000 SSA 8-Feb-2000
CIMIHEEL®	**CIMICIFUGA HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de la osteocondrosis, especialmente en la columna cervical. Neuralgias de diverso origen vertebral.	Cada 100 ml. Contienen: Cimicifuga racemosa D2, Cimicifuga racemosa D10, Cimicifuga racemosa D30, Cimicifuga racemosa D200, Strontium carbonicum D8, Strontium carbonicum D30, Strontium carbonicum D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Osteocondrosis, especialmente de la columna cervical; neuralgias de origen vertebral, campos interferentes neurales.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	**021H2000 SSA 2-Feb-2000**

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F.

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
CINNAHEEL®	**CINNAMOMUM HOMACCORD® N**	Auxiliar en el tratamiento de las hemorragias.	Cada 100 ml. Contienen: Cinnamomum zeylanicum D1, Cinnamomum zeylanicum D10, Cinnamomum zeylanicum D30, Cinnamomum zeylanicum D200, Hamamelis virginiana D3, Hamamelis virginiana D10, Hamamelis virginiana D30, Hamamelis virginiana D200, Achillea millefolium D4, Achillea millefolium D10, Achillea millefolium D30, Achillea millefolium D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Hemorragias capilares, tendencia a las hemorragias.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de hemorragias, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	012H2000 SSA 2-Feb-2000
COCCUHEEL®	**COCCULUS HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento del mareo.	Cada 100 ml. Contienen: Cocculus indicus D4, Cocculus indicus D10, Cocculus indicus D30, Cocculus indicus D200, Petroleum rectificatum D6, Petroleum rectificatum D10, Petroleum rectificatum D30, Petroleum rectificatum D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Cinetosis, estados de agotamiento por exceso de trabajo.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	019H2000 SSA 2-Feb-2000
COLT HOMACCORD®	**COLOCYNTHIS HOMACCORD®**	Auxiliar en casos de lumbalgias y ciática.	Cada 100 ml. Contienen: Colocynthis 2D, Colocynthis 10D, Colocynthis 30D, Colocynthis 200D, Gnaphalium 1D, Gnaphalium 10D, Gnaphalium 30D, Gnaphalium 200D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Neuralgias, especialmente en ciática; osteocondrosis de la columna lumbar en particular.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	033H95 SSA 4-Sep-1995
DROS HOMACCORD®	**DROSERA HOMACCORD®**	Auxiliar en casos de bronquiolitis o bronquitis asmática.	Cada 100 ml. Contienen: Drosera 2D, Drosera 10D, Drosera 30D, Drosera 200D, Cuprum aceticum 4D, Cuprum aceticum 10D, Cuprum aceticum 30D, Cuprum aceticum 200D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Tos ferina, bronquiolitis, bronquitis asmática.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	021H95 SSA 4-Jul-1995
DULCACCORD®	**DULCAMARA HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por el resfriado común.	Cada 100 ml. Contienen: Solanum dulcamara D2, Solanum dulcamara D10, Solanum dulcamara D30, Solanum dulcamara D200, Araneus diadematus D6, Araneus diadematus D10, Araneus diadematus D30, Araneus diadematus D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Agravación en tiempo húmedo de todas las afecciones, hipertrofia amigdalar.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	087H98 SSA 29-Oct-1998

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
FERRHEEL®	**FERRUM HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento del hombro dolorido de predominio derecho.	Cada 100 ml. Contienen: Ferrum metallicum D8, Ferrum metallicum D30, Ferrum metallicum D200, Ferrum phosphoricum D8, Ferrum phosphoricum D30, Ferrum phosphoricum D200, Ferrum sulfuricum D6, Ferrum sulfuricum D10, Ferrum sulfuricum D30, Ferrum sulfuricum D200, Ferrum sesquichloratum D4, Ferrum sesquichloratum D10, Ferrum sesquichloratum D30, Ferrum sesquichloratum D200, Spiraea ulmaria D2, Spiraea ulmaria D10, Spiraea ulmaria D30, Spiraea ulmaria D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Síndrome hombro-brazo, epicondilitis.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	016H2000 SSA 2-Feb-2000
GELS HOMACCORD®	**GELSEMIUM HOMACCORD®**	Auxiliar en casos de síndrome cervical (osteoporosis cervical) y neuralgias de diversa localización.	Cada 100 ml. Contienen: Gelsemium 2D, Gelsemium 10D, Gelsemium 30D, Gelsemium 200D, Rhus toxicodendron 3D, Rhus toxicodendron 10D, Rhus toxicodendron 30D, Rhus toxicodendron 200D, Cimicifuga 2D, Cimicifuga 10D, Cimicifuga 30D, Cimicifuga 200D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Síndrome cervical, migraña cervical (osteocondrosis cervical), neuralgias de diversa localización.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	031H95 SSA 3-Oct-1995
GLONHEEL®	**GLONOIN HOMACCORD® N**	Coadyuvante en el tratamiento de la taquicardia, especialmente en caso de hipertiroidismo, trastornos anginosos.	Cada 100 ml. Contienen: Glonoinum D3, Glonoinum D10, Glonoinum D30, Lycopus virginicus D1, Lycopus virginicus D4, Lycopus virginicus D10, Lycopus virginicus D30, Crataegus oxyacantha Ø. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Taquicardia, especialmente en caso de hipertiroidismo; trastornos anginosos.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	022H2000 SSA 2-Feb-2000
GRAF HOMACCORD®	**GRAPHITES HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de obesidad exógena.	Cada 100 ml. Contienen: Graphites 10D, Graphites 30D, Graphites 200D, Calcium carbonicum Hahnemanni 10D, Calcium carbonicum Hahnemanni 30D, Calcium carbonicum Hahnemanni 200D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Eccemas, especialmente eccemas secos y crónicos. Como tratamiento a largo plazo en caso de cicatrices y queloides.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	020H95 SSA 4-Jul-1995
HAMACCORD®	**HAMAMELIS HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por las varices.	Cada 100 ml. Contienen: Hamamelis virginiana D2, Hamamelis virginiana D30, Hamamelis virginiana D200, Carduus marianus D6, Carduus marianus D30, Carduus marianus D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Congestiones venosas, eccema varicoso, afecciones tromboflebíticas.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	002H2000 SSA 1-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
IGN HOMACCORD®	**IGNATIA HOMACCORD®**	Auxiliar en trastornos de origen nervioso.	Cada 100 ml. Contienen: Ignatia 4D, Ignatia 10D, Ignatia 30D, Ignatia 200D, Moschus 6D, Moschus 30D, Moschus 200D. Vehículo: c.b.p.100 ml.	Estados depresivos, especialmente de origen exógeno; síntomas paradójicos, afonía histérica.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En caso de trastornos paroxísticos, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	034H95 SSA 4-Sep-1995
MEZEHEEL®	**MEZEREUM HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de eccemas vesiculosos, herpes zoster prurito.	Cada 100 ml. Contienen: Mezereum D2, Mezereum D10, Mezereum D15, Mezereum D30, Mezereum D200, Arsenicum album D4, Arsenicum album D10, Arsenicum album D15, Arsenicum album D30, Arsenicum album D200, Arsenicum album D1000. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Eccemas vesiculosos, herpes zoster, prurito.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	024H2000 SSA 2-Feb-2000
MELICCORD®	**MELILOTUS HOMACCORD® N**	Auxiliar en el tratamiento de la hipertensión arterial.	Cada 100 ml. Contienen: Melilotus officinalis D1, Melilotus officinalis D4, Melilotus officinalis D10, Melilotus officinalis D30, Melilotus officinalis D200, Crataegus oxyacantha Ø, Crataegus oxyacantha D10, Crataegus Oxyacantha D30, Crataegus oxyacantha D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Plétora, estados preapopléticos, hipertensión.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	039H2000 SSA 8-Feb-2000
NATHEEL®	**NATRIUM HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por el catarro crónico.	Cada 100 ml. Contienen: Natrium carbonicum D10, Natrium carbonicum D30, Natrium carbonicum D200, Natrium muriaticum D10, Natrium muriaticum D30, Natrium muriaticum D200, Natrium muriaticum D1000, Natrium nitricum D10, Natrium nitricum D15, Natrium nitricum D30. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Catarro crónico de las mucosas, escrofulismo.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	011H2000 SSA 2-Feb-2000
NUX HOMACCORD®	**NUX VOMICA HOMACCORD®**	Auxiliar en algunos trastornos de la enfermedad ácido péptica.	Cada 100 ml. Contienen: Nux vomica 2D, Nux vomica 10D, Nux vomica 15D, Nux vomica 30D, Nux vomica 200D, Nux vomica 1000D, Bryonia 2D, Bryonia 6D, Bryonia 10D, Bryonia 15D, Bryonia 30D, Bryonia 200D, Bryonia 1000D, Lycopodium 3D, Lycopodium 10D, Lycopodium 30D, Lycopodium 200D, Lycopodium 1000D, Colocynthis 3D, Colocynthis 10D, Colocynthis 30D, Colocynthis 200D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Trastornos funcionales gastrointestinales y hepáticos, meteorismo, trastornos por abuso de nicotina, alcohol y café.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	030H95 SSA 4-Sep-1995

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
PHOSPHACCORD®	**PHOSPHOR HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento del dolor y ardor de garganta con ronquera.	Cada 100 ml. Contienen: Phosphorus D10, Phosphorus D30, Phosphorus D200, Argentum nitricum D10, Argentum nitricum D30, Argentum nitricum D200, Paris quadrifolia D6, Paris quadrifolia D10, Paris quadrifolia D30, Paris quadrifolia D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Ronquera, laringitis, faringitis. Hemorragias petequiales.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	067H98 SSA 10-Sep-1998
PLANHEEL®	**PLANTAGO HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de incontinencia urinaria y enuresis nocturna.	Cada 100 ml. Contienen: Plantago major D2, Plantago major D10, Plantago major D15, Plantago major D30, Plantago major D200, Belladonna atropa D3, Belladonna atropa D10, Belladonna atropa D15, Belladonna atropa D30, Belladonna atropa D200, Belladonna atropa D1000, Ignatia amara D4, Ignatia amara D10, Ignatia amara D30, Ignatia amara D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Enuresis nocturna, incontinencia urinaria, vejiga irritable.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	026H2000 SSA 2-Feb-2000
RANUHEEL®	**RANUNCULUS HOMACCORD®**	Coadyuvante en el tratamiento de neuralgias intercostales, dolores pleuríticos y herpes zoster.	Cada 100 ml. Contienen: Ranunculus bulbosus D2, Ranunculus bulbosus D10, Ranunculus bulbosus D15, Ranunculus bulbosus D30, Ranunculus bulbosus D200, Asclepias tuberosa D4, Asclepias tuberosa D10, Asclepias tuberosa D20, Asclepias tuberosa D30, Asclepias tuberosa D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Neuralgias intercostales, dolores pleuríticos, herpes zoster.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	023H2000 SSA 2-Feb-2000
SABHEEL®	**SABAL HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la hipertrofia de la próstata benigna.	Cada 100 ml. Contienen: Sabal serrulatum Ø, Sabal serrulatum D10, Sabal serrulatum D30, Hepar sulfuris D10, Hepar sulfuris D15, Hepar sulfuris D30, Hepar sulfuris D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Primer estadío del adenoma prostático (hipertrofia de próstata), vejiga irritable.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	038H2000 SSA 8-Feb-2000
SELACCORD®	**SELENIUM HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de casos de agotamiento físico y disminución de memoria.	Cada 100 ml. Contienen: Selenium D10, Selenium D15, Selenium D30, Selenium D200, Kalium phosphoricum D2, Kalium phosphoricum D10, Kalium phosphoricum D30, Kalium phosphoricum D200. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Disminución del rendimiento, especialmente de tipo cerebral y de origen arterioesclerótico.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	095H99 SSA 25-Nov-1999

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
VERACCORD®	**VERATRUM HOMACCORD®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por algunas alteraciones intestinales como diarrea y dolor abdominal.	Cada 100 ml. Contienen: Veratrum album D2, Veratrum album D10, Veratrum album D30, Veratrum album D200, Aloe socotrinum D2, Aloe socotrinum D10, Aloe socotrinum D30, Tormentilla Ø, Tormentilla D10, Tormentilla D30, Rheum D1, Rheum D10, Rheum D30. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Gastroenteritis. Estados de colapso.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día. En afecciones agudas, inicialmente 10 gotas cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo). La administración de este medicamento durante largo tiempo (varios meses) sólo se debe realizar bajo control médico.	097H99 SSA 22-Nov-1999

RUBIO PHARMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. GOTAS - CATEGORIA ESPECIAL

GINCOMPOSITUM®	**GINSENG COMPOSITUM**	Coadyuvante en el tratamiento de agotamiento físico en enfermedades crónicas.	Cada 100 ml. Contienen: Ginseng Ø, Acidum sarcolacticum D2, Hydrastis canadensis D10, Conium maculatum D10, Psorinum D28, Colchicum Autumnale D10, Pulsatilla pratensis D10, Kreosotum D10, Viscum album D8, Sulfur D10, China officinalis D10, Galium aparine D8, Sempervivum tectorum D8, Coenzima A D10, Natrium oxalaceticum D8, Adenosinum triphosphoricum D10, Nadidum D10. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Mejoría de la constitución en caso de sobrecargas tóxicas del sistema defensivo, también en neoplasias.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3-6 veces al día.	031H2000 SSA 8-Feb-2000
STRUMEEL F®	**STRUMEEL® FORTE N**	Coadyuvante en el tratamiento del bocio juvenil.	Cada 100 ml. Contienen: Spongia tosta D2, Calcium iodatum D3, Acidum silicicum D8, Fucus vesiculosus D3. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Bocio parenquimatoso (difuso) y como profilaxis del bocio. Arterioesclerosis y otros estados en los que el yodo se hace necesario.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3 veces al día.	055H2000 SSA 8-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
TRAMEEL S®	**TRAUMEEL S®**	Auxiliar en algunos casos de inflamaciones y dolores por contusiones y fracturas.	Cada 100 g. Contienen: Arnica montana 3D 1.50 g., Chamomilla recutita Ø 0.15 g., Calendula officinalis Ø 0.45 g., Symphytum officinale 4D 0.10 g., Hamamelis virginiana Ø 0.45 g., Bellis perennis Ø 0.10 g., Achillea millefolium Ø 0.09 g., Echinacea angustifolia Ø 0.15 g., Atropa belladonna 1D 0.05 g., Echinacea purpurea Ø 0.15 g., Aconitum napellus 1D 0.05 g., Hypericum perforatum 6D 0.0 9 g., Mercurius solubilis 6D 0.04 g.,Hepar sulfuris 6D 0.025 g. Excipiente: c.b.p. 100 g.	Traumatismos de diverso tipo (deporte, accidentes) como esguinces, distorsiones, contusiones, hematomas y hemartros, fracturas, etc.. Procesos inflamatorios y procesos degenerativos con inflamación asociada en muy diversos órganos y tejidos (por ejemplo, parodontitis, gingivitis, parodontosis), incluyendo también los que afectan al aparato locomotor y a los tejidos de sostén (tendosinovitis, bursitis, codo del tenista), artrosis de cadera, rodilla y pequeñas articulaciones.	Cutánea 1-2 aplicaciones diarias, por la mañana y por tarde (o con mayor frecuencia si fuera necesario) sobre las zonas afectadas, efectuando un masaje suave. En caso necesario, puede cubrirse la zona con un vendaje.	004H95 SSA 28-Mar-1995
ZEEL T®	**ZEEL T®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la artritis.	Cada 100 g. Contienen: Cartílago suis D2, Funiculus umbilicalis suis D2, Embryo suis D2, Placenta suis D2, Rhus toxicodendron D2, Arnica montana D2, Solanum dulcamara D2, Symphytum D8, Sanguinaria canadensis D2, Sulfur D6, Nadidum D6, Coenzyma A D6, Acidum alpha-liponicum D6, Natrium oxalaceticum D6, Acidum silicicum D6. Vehículo: c.b.p. 100 g.	Artrosis (especialmente en gonartrosis), poliartrosis, espondilartrosis, periartritis escapulohumeral.	Cutánea En general 1-2 aplicaciones diarias, por la mañana y por la noche, sobre la zona afectada, utilizando una cantidad de pomada proporcional a dicha zona (por ejemplo, unos 4 o 5 cms. para la zona de la rodilla) y extendiéndola dando un masaje suave.	033H2000 SSA 8-Feb-2000
ARNIHEEL S®	**ARNICA SALBE HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de contusiones leves.	Cada 100 g. Contienen: Arnica montana Ø. Vehículos: c.b.p. 100 g.	Mialgias tras sobrecarga, enfermedades arteriales y venosas.	Cutánea En general 1-2 aplicaciones diarias sobre la zona afectada. Precaución: debe evitarse el contacto con los ojos, las mucosas y las heridas abiertas.	035H2000 SSA 8-Feb-2000
HMAHEEL®	**HAMAMELIS SALBE HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de varices.	Cada 100 g. Contienen: Hamamelis virginiana Ø. Vehículo: c.b.p. 100 g.	Varices, hemorragias cutáneas y de las mucosas.	Cutánea En general 1-2 aplicaciones al día sobre la zona afectada.	045H2000 SSA 8-Feb-2000
KAMILLEN®	**KAMILLEN SALBE HEEL S®**	Auxiliar en el tratamiento de heridas superficiales, quemaduras leves y algunos tipos de eccemas.	Cada 100 g. Contienen: Chamomilla recutita Ø. Vehículos: c.b.p. 100 g.	Piel áspera y sensible con tendencia a la inflamación. Heridas y quemaduras, incluyendo las quemaduras solares y aquellas debidas a radioterapia y radiaciones ultravioleta. Úlcera de decúbito, pezones agrietados (heridas), intertrigo. Para el cuidado de la piel de lactantes y niños.	Cutánea En general 1-2 aplicaciones al día sobre la zona afectada.	043H2000 SSA 8-Feb-2000
PAEOHEEL®	**PAEONIA SALBE HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de hemorroides externas.	Cada 100 g. Contienen: Paeonia officinalis Ø. Vehículos: c.b.p. 100 g.	Hemorroides (especialmente en las externas), afecciones anales.	Cutánea En general 1-2 aplicaciones al día sobre la zona afectada.	044H2000 SSA 8-Feb-2000
CALHEEL®	**CALENDULA SALBE HEEL S®**	Auxiliar en el tratamiento de heridas superficiales y quemaduras leves.	Cada 100 g. Contienen: Calendula officinalis Ø. Vehículos: c.b.p. 100 g.	Supuraciones cutáneas y heridas de cicatrización difícil. Heridas contusas y por desgarro y heridas de cicatrización defectuosa. Congelaciones y quemaduras cutáneas superficiales.	Cutánea En general 1-2 aplicaciones al día sobre la zona afectada.	034H2000 SSA 8-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
SPASCUPREEL S®	**SPASCUPREEL S®**	Auxiliar en el tratamiento del dolor tipo cólico en alteraciones digestivas o urinarias.	Cada supositorio contiene: Citrullus colocynthis D3, Ammonium bromatum D3, Atropinum sulfuricum D5, Veratrum album D5, Magnesium phosphoricum D6, Gelsemium sempervirens D5, Passiflora incarnata D1, Chamomilla recutita D2, Cuprum sulfuricum D5, Agarlcus muscarius D3, Aconitum napellus D5. Excipiente: c.b.p. 1 supositorio	Espasmos en órganos huecos de musculatura lisa (estómago, intestino, vesicula biliar, útero y vías urinarias). Espasmos en la musculatura estriada (miogelosis, endurecimiento muscular).	Rectal En general, 1 supositorio 2-3 veces al día. En afecciones agudas, varias veces 1 supositorio cada hora, hasta que aparezca la mejoría. En lactantes menores de 6 meses, la dosis es de ½ supositorio cada vez.	048H2000 SSA 8-Feb-2000
VIBURCOL®	**VIBURCOL®**	Auxiliar en el tratamiento de estados de inquietud con y sin fiebre en lactantes y niños.	Cada supositorio contiene: Chamomilla recutita D1, Atropa belladonna D2, Solanum dulcamara D4, Plantago major D3, Pulsatilla pratensis D2, Calcicum carbonicum hahnemanni D8. Excipiente: c.b.p. 1 supositorio.	Estados de inquietud, con y sin fiebre, en lactantes y niños. Tratamiento sintomático de infecciones (resfriados) banales.	Rectal En afecciones agudas, inicialmente 1 supositorio varias veces; tras la mejoría, 1 supositorio 3-2 veces al día. En lactantes (desde el primer día) hasta los 6 meses. 1 suposito 2 veces al día como máximo.	031H99 SSA 12-Nov-1999

RUBIO PHARMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. SPRAY NASAL - HEEL

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
EUPHOHEEL COMPOSITUM®	**EUPHORBIUM COMPOSITUM S®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias que acompaña a la rinitis.	Cada ml. Contiene: Euphorbium 4D-0.01 ml., Pulsatilla pratensis 2D -0.01 ml., Luffa operculata 2D -0.01 ml., Mercurius bijodatus 8D -0.01 ml., Mucosa nasal 8D -0.01 ml., Hepar sulphuris calcareum 10D -0.01 ml., Argentum nitricum 10D -0.01 ml., Sinusitis nosode 13D -0.01 ml. Vehículo: c.b.p. 1 ml.	Rinitis de diverso origen (viral, bacteriano alérgico), rinitis seca, rinitis hipertrófica y atrófica, como tratamiento coadyuvante en caso de ocena. Sinusitis crónica. Para mejorar la respiración nasal en caso de rinitis alérgica.	Nasal En general 1-2 nebulizaciones en cada orificio nasal de 3 a 5 veces al día; para niños menores de 6 años, 1 nebulización de 3 a 4 veces al día. El medicamento puede administrarse también en lactantes sin riesgo alguno.	047H96 SSA 5-Dic-1996
LUFFHEEL®	**LUFFA COMPOSITUM HEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias que acompañan a la rinitis.	Cada ml. Contiene: Luffa operculata D4, Luffa operculata D12, Luffa operculata D30, Thryallis glauca D4, Thryallis glauca D12, Thryallis glauca D30, Histaminum D12, Histaminum D30, Histaminum D200, Sulfur D12, Sulfur D30, Sulfur D200. Vehículo: c.b.p. 1 ml.	Rinitis alérgica estacional (fiebre del heno).	Nasal En general, la dosis recomendada es de 1 o 2 nebulizaciones, en cada fosa nasal, de 3 a 5 veces al día (una nebulización corresponde a 3.35 gotas o 0.1 ml.) En niños menores de 6 años, 1 nebulización de 3 a 4 veces al día.	020H2000 SSA 2-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
LIPOLISHEEL®	**LIPOLISHEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de la lipodistrofia.	La ampolleta contiene: Placenta totalis suis 6D, Vena suis 8D, Arteria suis 10D, Funiculus umbilicalis suis 10D, Secale cornutum 4D, Nicotiana tabacum 10D, Aesculus hippocastanum 4D, Barium carbonicum 13D, Vipera berus 10D, Juglans regia ssp. regia 4D, Fumaria officinalis 4D, Levothyroxinum 12D, Sepia officinalis 6D, Pulsatilla pratensis 4D. Agua inyectable c.b.p. 2,0 ml	Coadyuvante en el tratamiento de la lipodistrofia. Para cualquier tipo de lipodistrofia dura, media y blanda. En casos de lipodistrofia asociada a obesidad.	En general, aplicar 1 ampolleta 1 vez por semana, en dosis única por vía oral, i.m., s.c., i.d., i.v. por 10 semanas. Se sugiere su aplicación en forma de mesoterapia. No es de uso pediátrico.	001H2002 SSA
METABOHEEL®	**METABOHEEL®**	Coadyuvante en el tratamiento de la obesidad endógena y exógena.	La ampolleta contiene: Graphites 10D, Graphites 30D, Graphites 200D, Levothyroxinum 10D, Levothyroxinum 12D, Fucus vesiculosus 6D, Adenosinum triphosphoricum 8D, Adenosinum 3,5 monohydrogenphosphoricum 6D. Agua inyectable c.b.p. 2,0 ml	Coadyuvante en el tratamiento de la obesidad endógena y exógena. Alteraciones del metabolismo de los ácidos grasos. Predisposición a la obesidad.	En general, aplicar 1 ampolleta 1 vez por semana, en dosis única por vía oral, i.m., s.c., i.d., i.v. Por 10 Semanas. Se sugiere su aplicación en forma de mesoterapia. No es de uso pediátrico.	002H2002 SSA
MUSKHEEL®	**MUSKHEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por distrofias musculares.	La ampolleta contiene: Musculus suis 10D, Testis suis 10D, Embryo totalis suis 10D, Funiculus umbilicalis suis 10D, Glandula suprarenalis suis 10D, Cortisonum aceticum 10D, Strychninum phosphoricum 8D, Strychninum phosphoricum 8D, Manganum phosphoricum 8D, Acidum ascorbicum 6D, Thiaminum hydrochloricum 6D, Natrium riboflavinum phosphoricum 6D, Pyridoxinum hydrochloricum 6D, Nicotinamidum 6D, Acidum ci-saconiticum 8D, Acidum citricum 8D, Acidum fumaricum 8D, Acidum alpha ketoglutaricum 8D, Acidum DL malicum 8D, Acidum succinicum 8D, Barium oxalsuccinicum 10D, Natrium diethyloxalaceticum 8D, Natrium pyruvicum 8D, Cysteinum 6D, Adenosinum triphosphoricum 10D, Nadidum 10D, Coenzym A 8D, Acidum DL alpha liponicum 6D. Agua inyectable c.b.p. 2,0 ml.	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por distrofias musculares. Miotonia, insuficiencia muscular, atrofia muscular estados de agotamiento.	En general, aplicar 1 ampolleta 1 vez por semana, en dosis única por vía oral, i.m., s.c., i.d., I.v. Se sugiere su aplicación en forma de mesoterapia. No es de uso pediátrico.	003H2002 SSA

RUBIO PHARMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. COLIRIO HEEL

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
OCULOHEEL®	**OCULOHEEL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la irritación e inflamación de los ojos y los párpados.	El aplicador con 0.45 ml. contiene: Euphrasia officinalis D5, Cochlearia officinalis D5, Jaborandi D5, Echinacea angustifolia D5. Vehículo: c.b.p. 0,45 ml.	Irritación e inflamación de los ojos y párpados. Para aliviar la congestión ocular (picor, escozor, lagrimeo excesivo, enrogecimiento, sensibilidad a la luz) ocasionada por diversas causas (resfriados, alergenos, ambientes contaminados, humos o vapores irritantes, polvo, cloro de las piscinas, luz solar, reflejo de la nieve, lentillas, etc.) Fatiga o cansancio ocular por esfuerzos prolongados de fijación de la vista (trabajo con ordenadores, conducción de automóviles, etc).	En general, instilar 1 ó 2 gotas en el ojo afectado, 3-4 veces al día, o más veces en caso necesario. Una monodosis es suficiente para la aplicación en ambos ojos.	010H2001 SSA 3-Abr-2001

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
NUVOM®	**NUX VOMICA COSMOPLEX®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la gastritis (como ardor y regurgitación).	Cada tableta contiene: Nux vomica D3, Pulsatilla pratensis D3, Arsenicum album D6, Citrullus colocynthis D3, Argentum nitricum D4, Carbo vegetabilis D8, Veratrum album D3, Antimonium crudum D6. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Estómago irritable, gastritis con eructos ácidos, duodenitis, pirosis, sensación de pesadez y plenitud, falta de apetito. Gastroenteritis (catarro gastrointestinal agudo y crónico con fenómenos espasmódicos y diarreas).	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 1-3 veces al día.	047H2000 SSA 8-Feb-2000
SILCEA®	**SILICEA COSMOPLEX®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos casos de desnutrición leve.	Cada tableta contiene: Acidum silicicum D4. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Las indicaciones corresponden al cuadro medicamentoso homeopático, en el que se incluyen: inflamaciones crónicas, supuraciones y formación de fístulas en la piel, ganglios linfáticos, mucosas, huesos y articulaciones; debilidad de los ligamentos de huesos y articulaciones. Proliferaciones tisulares. Agotamiento mental.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 2-3 veces al día. En casos agudos, al principio 1 comprimido cada 15 minutos, durante 1-2 horas como máximo; dosificación que puede repetirse hasta 2 veces al día, dejando un descanso de 2 horas entre cada vez. Dosis individual en niños a partir de los 3 años: 1 comprimido hasta 3 veces al día como máximo.	046H2000 SSA 8-Feb-2000
VAL COMPOSITUM COSMOPLEX®	**VALERIANA COSMOPLEX®**	Auxiliar en casos de nerviosismo o insomnio.	Cada tableta contiene: Valeriana officinalis 2D, Humulus lupulus 2D, Coffea arábica 10D, Amonium bromatum 4D, Chamomilla recutita 3D, Crataegus 4D, Passiflora incarnata 1D, Avena sativa 1D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Trastornos del sueño y situaciones de inquietud nerviosa en adultos y niños en edad escolar.	Oral (sublingual) Dosis de adultos: En general, 1 comprimido 1-3 veces al día. En casos agudos, 1 comprimido cada 1/2 hora o 1 hora, hasta un máximo de 12 veces al día. Dosis en niños entre 6 y 12 años: como máximo 2/3 de la dosis de adultos.	002H95 SSA 24-Mar-1995
ECHICOMP®	**ECHINACEA COSMOPLEX®**	Auxiliar en el tratamiento de procesos inflamatorios leves de diverso tipo y localización (amigdalitis, rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis).	Cada tableta contiene: Echinacea angustifolia D2, Lachesis mutus D10, Hepar sulfuris D8, Phytolacca americana D4, Thuja occidentalis D4, Bryonia cretica D4, Chamomilla recutita D6, Rhus toxicodendron D4. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Para estimular los mecanismos de defensa propios del organismo en procesos inflamatorios de diverso tipo y localización, por ejemplo, en las regiones faríngea, laríngea y nasal (amigdalitis, rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis). En caso de traumatismos menores con tendencia a la inflamación. Furunculosis.	Oral (sublingual) En general, 1 comprimido 1-3 veces al día. En casos agudos, 1 comprimido cada ½ ó 1 hora, hasta un máximo de 12 veces al día.	036H2000 SSA 8-Feb-2000

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
CARR COSMOPLEX®	**CARDUUS COSMOPLEX®**	Auxiliar en el tratamiento de los trastornos de la digestión por alteraciones de la secreción biliar.	Cada 100 ml. Contienen: Chelidonium majus 2D, Lycopodium clavatum 6D, Carduus marianus 2D, Atropinum sulfuricum 4D, Calcium carbonicum hahnemanni 10D, Veratrum album 3D, Phosphorus 10D, Fel tauri 4D, Nux vomica 10D, Cynara scolymus 4D, Taraxacum officinale 2D, Mandrágora officinarum 4D, Chionanthus virginicus 4D, Hepar suis 8D, Momordica balsamina 4D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Para estimular las funciones hepáticas, afecciones inflamatorias y espasmódicas de los conductos biliares, trastornos digestivos de origen hepatobiliar y falta de apetito.	Oral (sublingual) Dosis de adultos: en general, 10 gotas 2-4 veces al día (antes de las comidas, con o sin agua). En afecciones agudas, durante 1 o 2 horas como máximo, 10 gotas cada 10-15 minutos; dosificación que puede repetirse hasta 2 veces al día, dejando un descanso de 3 horas entre cada vez.	009H97 SSA 25-Jul-1997
SKLEROSETROPFEN S®	**CONIUM COSMOPLEX®**	Auxiliar en el tratamiento de lesiones arterioescleróticas generales en diferentes vasos y los consiguientes síntomas por ejemplo: debilidad de memoria, estados de ansiedad.	Cada 100 ml. Contienen: Aesculus hippocastanum D2, Conium maculatum D2, Secale cornutum D4, Anacardium orientale D3, Thuja occidentalis D2, Barium iodatum D10, Arnica montana D3, Cholesterinum D10, Viscum album D2, Carbo vegetabilis D10, Cortisonum aceticum D10, Calcium carbonicum hahnemanni D10, Solanum nigrum D6, Tabacum D10, Natrium oxalaceticum D6, Arteria suis D10, Kalmia latifolia D2. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Lesiones arterioescleróticas generales en diferentes vasos y los consiguientes síntomas como, por ejemplo, debilidad de memoria (esclerosis cerebral), estados de ansiedad, insuficiente irrigación del corazón y de la pierna debido a la edad (claudicación intermitente).	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 2-4 veces al día (antes de las comidas, con o sin agua).	082H2000 SSA 25-Abr-2000
COSMOCHEMA ECHIN COSMOPLEX®	**ECHINACEA COSMOPLEX®**	Auxiliar en casos de amigdalitis, faringitis o laringitis crónicas.	Cada 100 ml. Contienen: Echinacea angustifolia Ø, Lachesis 10D, Thuja occidentalis 2D, Natrium carbonicum 4D, Plantago major 2D, Hepar sulphuris 10D, Belladonna atropa 6D, Phytolacca decandra 4D, Pyrogenium 200D, Acidum arsenicosum 6D, Argentum nitricum 6D, Bryonia alba 4D, Rhus toxicodendron 3D, Chamomilla matricaria 6D, Dulcamara solanum 6D, Pulsatilla nigricans 2D, Mercurius praecipitatus ruber 10D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Para estimular los mecanismos de defensa propios del organismo en procesos inflamatorios de diverso tipo y localización, por ejemplo, en las regiones faríngea, laríngea y nasal (amigdalitis, rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis). En caso de traumatismos menores con tendencia a la inflamación. Furunculosis.	Oral (sublingual) Dosis de adultos: en general, 10 gotas 2-4 veces al día (antes de las comidas, con o sin agua). En procesos agudos, durante 1-2 horas como máximo, 10 gotas cada 10-15 minutos; dosificación que puede repetirse hasta 2 veces al día, dejando un descanso de 3 horas entre cada vez. Dosis individual en lactantes y niños pequeños: 3 gotas; entre 2-6 años: como máximo, 4 veces al día 5 gotas disueltas en 1/4 de vaso de agua o infusión; a partir de los 6 años: dosis de adultos.	017H95 SSA 4-Jul-1995

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
ELSEM COSMOPLEX®	**GELSEMIUM COSMOPLEX® N**	Auxiliar en el tratamiento de los dolores de tipo reumático y neurálgico.	Cada 100 ml. Contienen: Gelsemium sempervirens D4, Simarouba cedron D6, Verbascum thapsiforme D3. Vehículo: c.b.p.100 ml.	Neuralgias de diverso tipo y localización en adultos y niños en edad escolar. Cefaleas.	Oral (sublingual) Dosis de adultos: en general, 10 gotas 1-3 veces al día. En casos agudos, 10 gotas cada 1/2 hora, hasta un máximo de 12 veces al día. Dosis individual en niños entre 6 y 12 años: como máximo 2/3 de la dosis de adultos. En caso de cefaleas que persistan durante varios días o neuralgias que se prolongan por espacio de más de 2 semanas o recurrentes, se recomienda consultar al médico.	030H99 SSA 20-Ago-1999
DEUM COSMOPLEX®	**LEDUM COSMOPLEX® N**	Auxiliar en el tratamiento de reumatismo.	Cada 100 ml. Contienen: Causticum hahnemanni D6, Rhododendron D2, Ferrum phosphoricum D6, Ledum palustre D2. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Enfermedades reumáticas, especialmente reumatismo muscular y de partes blandas, así como afecciones articulares.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 1-3 veces al día.	066H99 SSA 21-Sep-1999
LUPS COSMOPLEX®	**BERUHIGUNGS-TROPFEN COSMOPLEX®**	Auxiliar en trastornos de origen nervioso y algunos casos de insomnio.	Cada 100 ml. Contienen: Lupulus 1D, Chamomilla 1D, Passiflora incarnata 1D, Crataegus 1D, Avena sativa 1D, Ignatia 4D, Coffea 10D, Hypothalamus suis 10D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Auxiliar en trastornos de origen nervioso y algunos casos de insomnio.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 1-3 veces al día.	011H95 SSA 10-Abr-1995
COSMOCHEMA NUX COSMOPLEX®	**NUX VOMICA COSMOPLEX®**	Auxiliar en algunos casos de gastritis.	Cada 100 ml. Contienen: Pulsatilla 2D, Belladonna 6D, Acidum arsenicosum 6D, Nux vomica 3D, Colocynthis 3D, Antimonium crudum 10D, Argentum nitricum 4D, Carbo vegetabilis 10D, Anacardium 3D, Veratrum 3D, Ipecacuahna 3D, Bismutum subnitricum 10D, Kalium bichromicum 6D, Robinia pseudoacacia 2D, Oxalasis acetosella 2D, Ceanothus americanus 4D, Ventriculus suis 8D, Intestinum suis 8D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Estómago irritable, gastritis con eructos ácidos, duodenitis, pirosis, sensación de pesadez y plenitud, falta de apetito. Gastroenteritis (catarro gastrointestinal agudo y crónico con fenómenos espasmódicos y diarreas).	Oral (sublingual) Dosis en adultos: en general, 10 gotas 2-4 veces al día (antes de las comidas, con o sin agua) durante varias semanas. En casos agudos y situaciones de dolor, durante 1 o 2 horas como máximo, 10 gotas cada 10-15 minutos; dosificación que puede repetirse hasta 2 veces al día, dejando un descanso de 3 horas entre cada vez. Tras remitir la agudeza sintomática, el tratamiento deberá continuarse durante 3-4 días, a la dosis de 10 gotas 3 veces al día. Dosis individual en lactantes y niños pequeños: 3 gotas; entre 2-6 años: como máximo 5 gotas 4 veces al día, disueltas en 1/4 de vaso de agua o infusión; a partir de los 6 años: dosis de adultos.	026H95 SSA 4-Sep-1995

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BEB COSMOCHEMA COSMOPLEX®	**BERBERIS COSMOPLEX®**	Auxiliar en algunos casos de incontinencia urinaria y enuresis.	Cada 100 ml. Contienen: Berberis vulgaris 3D, Equisetum hiemale 3D, Solidago virgaurea 2D, Apocynum canabinum 2D, Juniperus communis 4D, Terebenthina 6D, Urtica urens 3D, Nux moschata 4D, Ignatia amara 4D, Cantharis vesicatoria 4D, Herniaria glabra 2D, Colocynthis 4D, Bucco 3D, Pareira brava 3D, Plumbum aceticum 10D, Sabal serrulatum 3D, Apisinum 10D, Scilla 2D, Populus tremuloides 2D, Capsicum 3D, Petroselinum 3D, Argentum nitricum 8D, Chimaphila umbellata 3D, Ren suis 10D, Vesica urinaria suis 10D, Hydrargyrum bichloratum 4D, kalium arsenicosum 4D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Trastornos de la micción de origen funcional y/o nervioso, goteo de orina o debilidad del músculo del esfínter de la vejiga incluso, por ejemplo, tras intervención quirúrgica de próstata y parto. Vejiga irritable. Enuresis nocturna.	Oral (sublingual) Dosis de adultos: en general, 10 gotas 2-4 veces al día (antes de las comidas, con o sin agua). Dosis individual en lactantes y niños pequeños: 3 gotas; entre 2-6 años (enuresis nocturna): como máximo 4 veces al día 5 gotas, disueltas en 1/4 de vaso de agua o infusión; a partir de los 6 años: dosis de adultos.	027H95 SSA 4-Sep-1995
COSMOCHEMA SOL COSMOPLEX®	**SOLIDAGO COSMOPLEX® ST**	Auxiliar en infecciones de vías urinarias o litiasis renal.	Cada 100 ml. Contienen: Solidago virgaurea Ø, Cubeba Ø, Bucco Ø, Orthosiphon stamineus Ø, Lycopodium clavatum 2D, Baptisia tinctoria 2D, Cantharis vesicatoria 4D, Sulphur 4D, Apisinum 5D, Kreosotum 3D, Ren suis 4D, Acidum silicicum 8D, Acidum arsenicosum 8D, Natrium chloratum 8D, Berberis vulgaris 2D, Petroselinum 2D, Echinacea angustifolia 1D, Zincum gluconicum 3D, Manganum gluconicum 4D, Scrophularia nodosa Ø, Urtica urens Ø,Ononis spinosa Ø, Populus tremuloides Ø, Plantago major 1D, Equisetum arvense Ø, Sabal serrulatum 1D, Cuprum sulphuricum 4D. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Afecciones espasmódicas de las vías urinarias, también en caso de afecciones inflamatorias y tras intervenciones quirúrgicas de cálculos; predisposición a la nefrolitiasis y para evitar la nueva formación de cálculos renales después de su extracción. Para estimular la función excretora del riñón y de la diuresis en la segunda mitad del embarazo. Como complemento del tratamiento específico de cistitis y pielitis.	Oral (sublingual) Dosis de adultos: en general, 10 gotas 2-4 veces al día (antes de las comidas, con o sin agua). En situaciones de dolor, durante 1 ó 2 horas como máximo, 10 gotas cada 10-15 minutos; dosificación que puede repetirse hasta 2 veces al día, dejando un descanso de 3 horas entre cada vez. Tras remitir la agudeza sintomática, el tratamiento deberá continuarse durante 3-4 días, a la dosis de 10 gotas 3 veces al día. Dosis individual en niños de 2-6 años: como máximo 4 veces al día 3-5 gotas, disueltas en 1/4 de vaso de agua o infusión a partir de los 6 años: dosis de adultos.	022H95 SSA 4-Jul-1995
BLUTGEFÄBTROPFEN S®	**AESCULUS COSMOPLEX®**	Auxiliar en el tratamiento de trastornos circulatorios venosos (varices, úlceras en las piernas, hemorroides).	Cada 100 ml. Contienen: Aesculus hippocastanum Ø, Melilotus officinalis D1, Secale cornutum D4, Sulfur D8, Nux vomica D4, Lycopodium clavatum D3, Bryonia cretica D3, Atropa belladonna D4, Hamamelis virginiana D2, Vipera berus D10, Graphites D10, Muriaticum acidum D4, Mercurius praecipitatus ruber D10, Calcarea fluorica D10, Acidum silicicum D8, Collinsonia canadensis D3, Paeonia officinalis D3, Natrium pyruvicum D6, Arteria suis D8, Vena suis D8. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Trastornos circulatorios periféricos arteriales y venosos, varices, úlceras en la pierna, hemorroides.	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 2-4 veces al día (antes de las comidas, con o sin agua). En afecciones agudas, durante 1 ó 2 horas como máximo, 10 gotas cada 15-30 minutos; dosificación que puede repetirse hasta 2 veces al día, dejando un descanso de 3 horas entre cada vez.	081H2000 SSA 25-Abr-2000
LYMPHTROPFEN S®	**SCROPHULARIA COSMOPLEX®**	Coadyuvante en el tratamiento de enfermedades crónicas de la piel, del tejido conectivo y de las mucosas (drenador).	Cada 100 ml. Contienen: Gentiana lútea D1, Melilotus officinalis D2, Apis mellifica D3, Geranium robertianum D2, Ononis spinosa D4, Thuja occidentalis D2, Teucrium scorodonia D2, Galium aparine D3, Caltha palustris D2, Clematis erecta D3, Sedum acre D3, Calcium fluoratum D10, Urtica urens D2, Scrophularia nodosa D2, Juglans regia D3, Natrium sulfuricum D4, Acidum silicicum D6, Aranea diadema D10, Psorinum D10, Veronica officinalis D4, Sulfur D8, Bufo rana D12, Funiculus umbilicalis suis D10, Glandula lymphatica suis D8. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Para estimular los mecanismos de defensa propios del organismo en caso de (tendencia a) estados irritativos del tejido linfático y de la piel (“niños linfáticos”, linfatismo, diátesis exudativa). Para estimular la circulación linfática (depuración del tejido conjuntivo y del mesénquima).	Oral (sublingual) En general, 10 gotas 3-4 veces al día (antes de las comidas, con o sin agua). En casos agudos, por ejemplo en caso de inflamaciones de los vasos y ganglios linfáticos, durante 1-2 horas como máximo, 10 gotas cada 10-15 minutos; dosificación que puede repetirse hasta 2 veces al día, dejando un descanso de 3 horas entre cada vez. Dosis individual en lactantes y niños pequeños: 3 gotas; entre 2-6 años: como máximo, 4 veces al día 5 gotas disueltas en ¼ de vaso de agua o influsión; a partir de los 6 años: dosis de adultos.	064H2000 SSA 31-Mar-2000

Nombre Nacional	Nombre Inglés	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina B.H.I e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BHI ALERTNESS®	**BHI ALERTNESS®**	Auxiliar en el tratamiento de la disminución de la capacidad para la atención.	Cada tableta contiene: Phosphoricum acidum 4X, anacardium orientale 6X, Arsenicum iodatum 6X, Kali phosphoricum 6X, Staphysagria 6X, Lycopodium clavatum 8X, Calcarea phosphorica 10X, Ignatia amara 10X, Silicea terra 10X, Selenium metallicum 12X, Nux vomica 30X, Phosphoricum acidum 10X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de síntomas psicológicos originados por estrés o enfermedad.	Oral (sublingual) Adultos, tomar 1 tableta cada 6 horas.	033H98 SSA 26-Ago-1998
ALLER BHI®	**BHI ALLERGY®**	Auxiliar en el tratamiento de los síntomas debidos a alergias leves.	Cada tableta contiene: Arnica montana 6D, Formicum acidum 8D, Ignatia amara 6D, Histaminum 8D, Lycopodium clavatum 6D, Ledum palustre 8D, Thuja occidentalis 6D, Antimonium crudum 10D, Lappa major 8D, Graphites 10D, Tellurium metallicum 10D, Histaminum 12D, Selenium metallicum 12D, Sulphur 12D, Histaminum 30D, Sulphuricum acidum 30D, Arsenicum album 8D, Pix liquida 10D, Histaminum 200D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para aliviar síntomas debidos a reacciones alérgicas.	Oral (sublingual) Adultos, tomar 1 tableta cada 6 horas. Niños mayores de 2 años: 1 tableta cada 12 horas. Casos agudos 1 tableta cada 15 minutos por máximo 1 hora, después, volver a la dosis normal.	049H96 SSA 13-Dic-1996
BHI ARTRHAN®	**BHI ARTHRITIS®**	Auxiliar en el tratamiento de afecciones artríticas y reumáticas.	Cada tableta contiene: Bryonia alba 4D, Colocynthis 5D, Bryonia alba 8D, Arnica montana 6D, Bryonia alba 12D, Colchicum autumnale 6D, Bryonia alba 30D, Dulcamara 6D, Rhus toxicodendron 4D, Ledum palustre 6D, Rhus toxicodendron 8D, Ranunculus bulbosus 6D, Rhus toxicodendron 12D, Berberis vulgaris 8D, Rhus toxicodendron 30D, Causticum Hahnemaniani 8D, Rhododendron 8D, Sulphur 10D, Lycopodium clavatum 10D, Ferrum phosphoricum 12D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para afecciones de tipo artrítico y reumático.	Oral (sublingual) 1 tableta cada 8 horas. Casos agudos 1 tableta cada 15 minutos por un máximo de 1 hora. Posteriormente continuar con la dosis indicada.	058H96 SSA 16-Dic-1996
BHI ASTH®	**B.H.I. ASTHMA®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la bronquitis asmática.	Cada tableta contiene: Arsenicum album 12X, Carbo vegetabilis 12X, Sulphur 12X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento del asma y de los síntomas asociados.	Oral (sublingual) Adultos, 1 tableta cada 6 horas. Niños mayores de 12 años tomar 1 tableta cada 8 horas.	022H98 SSA 20-Jul-1998
BHI BLADDER®	**BHI BLADDER EQUISETUM®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la infección de las vías urinarias.	Cada tableta contiene: Belladonna atropa 4X, Argentum nitricum 6X, Equisetum hyemale 6X, Sarsaparrilla 6X, Petroselinum sativum 8X, Apis mellifica 6X, Cantharis vesicatoria 6X, Pulsatilla nigricans 6X, Causticum 8X, Terebinthina 8X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para desórdenes urinarios relacionados con la vejiga.	Oral (sublingual) Adultos, 1 tableta cada 6 horas. Niños Mayores de 12 años 1 tableta cada 8 horas. Casos agudos: adultos, 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas; niños, 1 tableta cada 30 minutos por espacio de 2 horas. Posteriormente reanudar cada 8 horas.	039H98 SSA 2-Sep-1998

Nombre Nacional	Nombre Inglés	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina B.H.I e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BLED BHI®	**BHI BLEEDING®**	Auxiliar en el tratamiento de los casos de hemorragias nasales.	Cada tableta contiene: Thlaspi bursa pastoris 4X, Acidum aceticum 6X, Crocus sativus 6X, Ipecacuanha 6X, Arnica montana, radix 8X, Erigeron canadensis 8X, Hamamelis virginica 8X, Millefolium 8X, Bovista 12X, Phosphorus 12X, Crotalus horridus 15X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de los casos de hemorragia.	Oral (sublingual) Adultos, 1 tableta cada 8 horas, casos agudos: adultos, 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas. Niños mayores de 2 años tomar una tableta cada 8 horas, casos agudos consultar a su médico homeópata.	003H99 SSA 9-Abr-1999
BON BHI®	**BHI BONE®**	Auxiliar en el tratamiento de dolores de los huesos y algunos casos de reumatismo.	Cada tableta contiene: Asafoetida 6X, Aurum metallicum 12X, Mercurius praecipitatus ruber 12X, Aranea diadema 15X,Kalmia latifolia 8X, Hekla lava 12X, Natrum sulphuricum 12X, Lycopodium clavatum 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para los dolores en huesos y articulaciones.	Oral (sublingual) Adultos, tomar 1 tableta cada 6 horas.	013H99 SSA 23-Abr-1999
BHIBRON®	**BHI BRONCHITIS®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la bronquitis.	Cada tableta contiene: Lobelia inflata 4X, Hyoscyamus niger 5X, Sticta pulmonaria 5X, Antimonium tartaricum 5X, Belladonna atropa 6X, Bryonia alba 6X, Hepatica triloba 6X, Ipecacuanha cephaelis 6X, Kreosotum 6X, Pertussinum 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para el tratamiento de la bronquitis y de la tos bronquial.	Oral (sublingual) Adultos, 1 tableta cada 6 horas, en casos agudos 1 tableta cada 15 minutos por 2 horas, después volver a la dosis normal. Niños mayores de 2 años tomar una tableta cada 8 horas y en casos agudos 1 tableta cada 30 minutos, después volver a la dosis normal.	047H97 SSA 12-Ene-1998
BHI CALM®	**BHI CALMING®**	Auxiliar en el tratamiento del insomnio y nerviosismo.	Cada tableta contiene: Chamomilla matricaria 2D, Ignatia amara 8D, Humulus lupulus 2D, Coffea cruda 10D, Passiflora incarnata 2D, Moschus 10D, Valeriana officinalis 2D, Sulphur 12D, Veratrum album 4D, Nux vomica 30D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el insomnio y otro tipo de síntomas psicológicos.	Oral (sublingual) Tomar 1 tableta cada 6 horas. Casos agudos, consulte a su médico homeópata.	053H96 SSA 16-Dic-1996
BHI CIRCUL®	**BHI CIRCULATION STRAMONIUM RX®**	Coadyuvante en el tratamiento de los síntomas relacionados con la arterioesclerosis, así como la hipertensión arterial.	Cada tableta contiene: Kali phosphoricum 6X, Rauwolfia serpentina 6X, Arnica montana 8X, Plumbum metallicum 8X, Aurum iodatum 10X, Lycopodium clavatum 10X, Stramonium datura 10X, Baryta iodata 12X, Conium maculatum 12X, Sulphur 12X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de la arterioesclerosis.	Oral (sublingual) La que el médico homeópata señale.	034H98 SSA 26-Ago-1998

Nombre Nacional	Nombre Inglés	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina B.H.I e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BHICOLD®	**BHI COLD®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias que acompañan al resfriado común.	Cada tableta contiene: Pulsatilla nigricans 6X, Sulphur 8X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para el tratamiento de los síntomas del resfriado y de otras afecciones virales similares.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas. En casos agudos tomar 1 tableta cada 15 minutos por un espacio no mayor a 2 horas. Niños mayores de 2 años 1 tableta cada 12 horas, en casos agudos consulte a su médico homeópata.	034H96 SSA 7-Oct-1996
BHI CONSTIPATION®	**BHI CONSTIPATION®**	Auxiliar en el tratamiento del estreñimiento.	Cada tableta contiene: Dioscorea villosa 4X, Nux vomica 8X, Natrum muriaticum 200X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento del estreñimiento.	Oral (sublingual) 1 tableta cada 6 horas. Casos agudos cada 15 minutos por 1 horas luego cada 8 horas. Niños mayores de 2 años, 1 tableta cada 8 horas, casos agudos 1 tableta cada 30 minutos por 1 hora, luego cada 8 horas.	001H98 SSA 28-Ene-1998
COU BHI®	**BHI COUGH®**	Auxiliar en el tratamiento para la tos de diverso origen.	Cada tableta contiene: Ephedra vulgaris 4X, Illicium anisatum 4X, Ipecacuanha 4X, Stachys betonica 4X, Hepatica triloba 5X, Lobelia inflata 5X, Arsenicum iodatum 6X, Belladonna atropa 6X, Naphthalinum 6X, Natrum sulphuricum 6X, Quebracho 6X, Antimonium Tartaricum 6X, Blatta orientalis 8X, Bryonia alba 8X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para la tos de todo tipo.	Oral (sublingual) Adultos 1 tableta cada 8 horas. Casos agudos: Adultos 1 tableta cada 30 minutos por espacio de 2 horas después continuar con la dosis ya indicada. Niños de 2 a 6 años 1 tableta cada 8 horas, casos agudos consultar a su médico homeópata.	004H99 SSA 9-Abr-1999
BHI DIREA®	**BHI DIARRHEA®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la diarrea de diverso origen.	Cada tableta contiene: Aloe socotrina 4X, Tormentilla 4X, Veratrum album 5X, Arsenicum album 6X, Colocynthis 6X, Cuprum aceticum 6X, Mercurius corrosivus 6X, Podophyllum peltatum 6X, Ferrum phosphoricum 10X, Carbo vegetabilis 12X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el alivio de la diarrea.	Oral (sublingual) Adultos y mayores de 6 años 1 tableta cada 6 horas, en casos agudos disolver 1 tableta cada 15 minutos por espacio no mayor a 2 horas.	102H2000 SSA 27-Jul-2000
BHIEAR®	**BHI EAR/ CHAMOMILLA®**	Auxiliar en el tratamiento de dolores y las inflamaciones leves del oído.	Cada tableta contiene: Chamomilla matricaria 4X, Plantago major 4X, Pulsatilla nigricans 4X, Aconitum napellus 5X, Capsicum annuum 6X, Kali chloricum 6X, Ferrum phosphoricum 10X, Hepar sulphuris calacareum 10X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para los dolores de oído y las inflamaciones óticas.	Oral (sublingual) Adultos 1 tableta cada 8 horas, casos agudos 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas. Mayores de 2 años 1 tableta cada 8 horas, en casos agudos consultar a su médico homeópata.	002H99 SSA 8-Mar-1999
BHIECHINA PC®	**BHI ECHINACEA PC®**	Auxiliar en el tratamiento de inflamaciones leves y la fiebre.	Cada tableta contiene: Echinacea angustifolia 6D, Echinacea angustifolia 12D, Echinacea angustifolia 30D, Echinacea angustifolia 200D, Echinacea purpurea 6D, Echinacea purpurea 12D, Echinacea purpurea 30D, Echinacea purpurea 200D. Excipiente: c.b.p.1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de los síntomas inflamatorios y la fiebre.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas, niños mayores de 2 años, 1 tableta cada 12 horas.	055H96 SSA 4-Abr-1997

Nombre Nacional	Nombre Inglés	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina B.H.I e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BHI EXHAUSTION®	**BHI EXHAUSTION®**	Auxiliar en el tratamiento del agotamiento físico.	Cada tableta contiene: Cinchona officinalis 4X, Cocculus indicus 5X, Aletris farinosa 6X, Citricum acidum 6X, Kali phosphoricum 6X, Phosphorus 6X, Picricum acidum 6X, Muriaticum acidum 8X, Sepia officinalis 12X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para el tratamiento de la fatiga y el agotamiento.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 8 horas.	010H99 SSA 23-Abr-1999
BHIEY®	**BHI EYE®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la conjuntivitis.	Cada tableta contiene: Euphrasia officinalis 6X, Kalmia latifolia 8X, Rhus toxicodendron 8X, Staphysagria 8X, Aethiops mercurialis mineralis 10X, Apis mellifica 12X, Graphites 12X, Belladonna atropa 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para las inflamaciones de los ojos.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas, niños mayores de 2 años 1 tableta cada 8 horas. Casos agudos: adultos: 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas posteriormente cada 6 horas. Niños, 1 tableta cada 30 minutos por espacio de 2 horas. Posteriormente reanudar cada 8.	004H98 SSA 27-Ene-1998
BHI FEMM®	**BHI FEMININE®**	Auxiliar en el tratamiento de trastornos de la menopausia.	Cada tableta contiene: Pulsatilla nigricans 4D, Palladium metallicum 10D, Sanguinaria canadensis 4D, Sepia officinalis 10D, Lilium tigrinum 5D, Sulphur 10D, Apis mellifica 6D, Lachesis mutus 12D, Cocculus indicus 6D, Oophorinum 12D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para los desórdenes femeninos de base hormonal.	Oral (sublingual) Tomar una tableta cada 6 horas.	054H96 SSA 16-Dic-1996
BHI FLU PLUS®	**BHI FLU-PLUS®**	Auxiliar en el tratamiento de los síntomas de resfriado como dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, escalofrios, fiebre, náuseas, agotamiento y fatiga.	Cada tableta contiene: Aconitum napellus 4X, Bryonia alba 4X, Eupatorium perfoliatum 4X, Ipecacuanha 6X, Pulsatilla nigricans 6X, Mercurius corrosivus 8X, Phosphorus 8X, Sulphur 8X, Influenzinum 12X, Lachesis mutus 12X, Zincum gluconicum 3X, Zincum metallicum 3X, Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200CK. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de los síntomas del resfriado.	Oral (sublingual) Adultos y Mayores de 6 años 1 tableta cada 8 horas, casos agudos: adultos, 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas. Niños de 2 a 6 años 1 tableta cada 12 horas.	069H2000 SSA 27-Mar-2000
BHICELD®	**BHI GALL BLADDER CHELIDONIUM®**	Auxiliar en el tratamiento de afecciones de la vesícula biliar (cólicos y cálculos biliares).	Cada tableta contiene: Belladonna atropa 8X, Chelidonium majus 8X, Cinchona officinalis 8X, Veratrum album 8X, Calcarea carbonica 10X, Cholesterinum 10X, Lycopodium clavatum 10X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para todo tipo de afecciones de la vesícula biliar.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas. Casos agudos: Adultos 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas.	002H98 SSA 28-Ene-1998
INKO BHI®	**BHI GINKGO®**	Auxiliar en el tratamiento de la disminución de la memoria.	Cada tableta contiene: Ginkgo biloba 2X, Baryta carbonica 8X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para la irritabilidad nerviosa y el aturdimiento.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas, niños mayores de 12 años 1 tableta cada 8 horas.	007H99 SSA 23-Abr-1999
BHIHAIRSKIN®	**BHI HAIR AND SKIN®**	Auxiliar en el tratamiento de afecciones leves de la piel y de la caída del cabello.	Cada tableta contiene: Galium aparine 6X, Ignatia amara 6X, Lycopodium clavatum 6X, Thuja occidentalis 6X, Urtica urens 6X, Phosphoricum acidum 8X, Arsenicum album 10X, Natrum muriaticum 12X, Selenium 12X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento del cabello, la piel y las uñas.	Oral (sublingual) Adultos y mayores de 12 años 1 tableta cada 8 horas.	003H98 SSA 28-Ene-1998

Nombre Nacional	Nombre Inglés	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina B.H.I e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
CABDOL BHI®	**BHI HEADACHE®**	Auxiliar en el tratamiento de algunos dolores de cabeza.	Cada tableta contiene: Cimifuga racemosa 4X, Gelsemium sempervirens 4X, Rhus toxicodendron 4X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el alivio de varios tipos de dolores de cabeza.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas. Niños mayores de 12 años 1 tableta cada 8 horas.	011H99 SSA 23-Abr-1999
HERT BHI®	**BHI HEART RX CACTUS®**	Coadyuvante en el tratamiento de afecciones cardiacas (insuficiencia cardiaca y angina de pecho).	Cada tableta contiene: Cactus grandiflorus 4X, Kali carbonicum 6X, Gelsemium sempervirens 10X, Sulphur 12X, Glonoinum 6X, Spigelia anthelmia 8X, Ranunculus bulbosus 10X, Arnica montana 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para afecciones e insuficiencias cardíacas y como un tónico cardíaco general.	Oral (sublingual) Dosis que el médico homeópata señale.	012H99 SSA 23-Abr-1999
EMORD BHI®	**BHI HEMORRHOID®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por las hemorroides.	Cada tableta contiene: Aesculus hippocastanum 4X, Aloe socotrina 4X, Collinsonia canadensis 4X, Nux vomica 5X, Leptandra virginica 6X, Muriaticum acidum 6X, Paeonia officinalis 6X, Sulphur 10X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de hemorroides y de toda su sintomatología.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 8 horas, casos agudos: Adultos, 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas.	009H99 SSA 23-Abr-1999
BHIFECTION®	**BHI INFECTION®**	Auxiliar en el tratamiento de dolor y ardor de garganta.	Cada tableta contiene: Echinacea angustifolia 3X, Echinacea purpurea 3X, Mercurius solubilis H 8X, Hepar sulphuris calcareum 10X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de infecciones.	Oral (sublingual) 1 tableta cada 6 horas, en casos agudos 1 tableta cada 15 minutos las primeras 2 horas, después cada 6 horas. Niños mayores de 3 años 1 tableta cada 8 horas, casos agudos 1 tableta cada 30 minutos, después cada 8 horas.	050H97 SSA 27-Ene-98
BHI FLAMM®	**BHI INFLAMMATION®**	Auxiliar en el tratamiento de los síntomas que acompañan a las infecciones leves del tracto respiratorio alto.	Cada tableta contiene: Echinacea purpurea 2D, Dulcamara solanum 6D, Belladonna atropa 4D, Phytolacca decandra 6D, Bryonia alba 5D, Pulsatilla nigricans 6D, Arnica montana 6D, Rhus toxicodendron 6D, Thuja occidentalis 6D, Argentum nitricum 8D, Arsenicum album 10D, Hepar sulphuris calcareum 10D, Mercurius solubilis 10D, Lachesis mutus 12D, Pyrogenium 12D, Staphylococcinum 12D, Streptococcinum 12D, Influenzinum 15D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de inflamaciones y fiebre.	Oral (sublingual) Adultos tomar 1 tableta cada 6 horas, casos agudos 1 tableta cada 15 minutos por un máximo de 1 hora y reanudar a la dosis indicada. Niños mayores de 2 años 1 tableta cada 8 horas. Casos agudos 1 tableta cada 30 minutos por un máximo de 2 horas.	050H96 SSA 11-Feb-1997
BHIINJURY®	**BHI INJURY®**	Auxiliar en el alivio del dolor y la inflamación ocasionada por heridas, contusiones y fracturas.	Cada tableta contiene: Aconitum napellus 4X, Calendula officinalis 4X, Echinacea angustifolia 4X, Hamamelis virginiana 4X, Arnica montana, radix 4X, Chamomilla matricaria 4X, Echinacea purpurea 4X, Hypericum perforatum 4X, Aristolochia clematitis 6X, Symphytum officinale 5X, Belladonna atropa 6X, Bellis perennis 6X, Rhus toxicodendron 6X, Millefolium 6X, Veratrum album 10X, Hepar sulphuris calcareum 10X, Carbo vegetabilis 12X, Mercurius solubilis 12X, Arsenicum album 15X, Sulphur 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para el alivio del dolor y la inflamación ocasionadas por heridas o traumatismos.	Oral (sublingual) Adultos tomar 1 tableta cada 8 horas. Casos agudos: Adultos, 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas. Niños mayores de 2 años tomar 1 tableta cada 8 horas, casos agudos: consulte a su médico homeópata.	006H99 SSA 23-Abr-1999

Nombre Nacional	Nombre Inglés	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina B.H.I e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BHI INTE®	**BHI INTESTINE®**	Auxiliar en el tratamiento de inflamaciones y dolores abdominales leves.	Cada tableta contiene: Bryonia alba 5X, Colocynthis 5X, Lycopodium clavatum 5X, Nux vomica 5X, Mercurius corrosivus 6X, Sulphur 10X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para el tratamiento de inflamaciones intestinales y de síntomas acompañantes.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas, niños mayores de 6 años 1 tableta cada 8 horas, casos agudos: adultos 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas, niños 1 tableta cada 30 minutos por espacio de 2 horas, posteriormente reanudar cada ocho.	024H98 SSA 20-Jul-1998
BHI KIDNEY®	**BHI KIDNEY RX SOLIDAGO®**	Auxiliar en el tratamiento de trastornos urinarios y las molestias causadas por cálculos renales.	Cada tableta contiene: Solidago virgaurea 4X, Ammi visnaga 6X, Berberis vulgaris 6X, Citricum acidum 6X, Pareira brava 6X, Cantharis vesicatoria 8X, Hepar sulphuris calcareum 8X, Nitricum acidum 8X, Mercurius solubilis 10X, Arsenicum album 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de trastornos urinarios relacionados con los riñones.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas. Niños mayores de 12 años 1 tableta cada 8 horas. Casos agudos: adultos 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas, niños 1 tableta cada 30 minutos por espacio de 2 horas, posteriormente reanudar cada ocho.	000H98 SSA 20-Jul-1998
BHI LIGHTHEADED®	**BHI LIGHTHEADED DIZZINESS®**	Auxiliar en el tratamiento de mareos y nauseas.	Cada tableta contiene: Conium maculatum 5X, Cocculus indicus 6X, Phosphorus 6X, Petroleum 8X, Ambra grisea 12X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de mareos y vértigo.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas. Niños mayores de 12 años 1 tableta cada 8 horas.	032H98 SSA 26-Ago-1998
BHI LIVER®	**BHI GASTRO-CLEANSE (LIVER)®**	Auxiliar en el tratamiento de los trastornos de la digestión por alteraciones de la secreción biliar.	Cada tableta contiene: Cinchona officinalis 4X, Leptandra virginica 6X, Cynara scolymus 8X, Fel tauri 8X, Galium aparine 8X, Lycopodium clavatum 8X, Phosphorus 10X, Sulphur 10X, Niccolum Metallicum 12X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para toda la sintomatología relacionada con el hígado.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas, casos agudos: Adultos, 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas, posteriormente reanudar cada 8 horas.	026H98 SSA 20-Jul-1998
BHILYMP®	**BHI LYMPHATIC RX®**	Coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades infecciosas de las vías urinarias y del aparato respiratorio.	Cada tableta contiene: Equisetum hyemale 5X, Myosotis arvensis 5X, Scrophularia nodosa 5X, Teucrium scorodonia 5X, Veronica beccabunga 5X, Fumaria officinalis 6X, Gentiana lutea 6X, Geranium robertianum 6X, Nasturtium aquaticum 6X, Natrium sulphuricum 6X, Pinus sylvestris 6X, Juglans regia 8X, Sarsaparrilla 8X, Aranea diadema 10X, Calcarea phosphorica 12X, Ferrum iodatum 12X, Glandula thyroidea 12X, Tuberculinum 15X, Vaccininum 15X, Variolinum 15X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para mejorar la función linfática.	Oral (sublingual) Dosis: la que el homeópata médico señale.	011H98 SSA 11-Feb-1998
BHIMALE®	**BHI MALE RX MASCULINE®**	Auxiliar en el tratamiento de la debilidad sexual masculina y eyaculación precoz.	Cada tableta contiene: Agnus castus 4X, Picricum acidum 6X, Cinchona officinalis 4X, Orchitinum 8X, Lycopodium clavatum 4X, Sepia officinalis 10X, Petroselinum sativum 4X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para la regulación de trastornos masculinos.	Oral (sublingual) 1 tableta cada 6 horas.	048H97 SSA 12-Ene-1998

Nombre Nacional	Nombre Inglés	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina B.H.I e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BHI MENS®	**BHI MENSTRUAL®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias que acompañan a la menstruación.	Cada tableta contiene: Aceticum acidum 4D, Lilium tigrinum 6D, Pulsatilla nigricans 4D, Kreosotum 8D, Caulophyllum thalictroides 6D, Asterias rubens 10D, Hydrastis canadensis 6D, Mercurius iodatus flavus 10D, Thuja occidentalis 12D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para desórdenes femeninos de origen funcional.	Oral (sublingual) 1 tableta cada 6 horas, en casos agudos tomar 1 tableta cada 15 minutos por un máximo de 1 hora. Después reanudar con la dosis indicada.	056H96 SSA 16-Dic-1996
BHIMIGRAIN®	**BHI MIGRAINE RX HEADACHE II®**	Auxiliar en el tratamiento de la migraña y otros dolores de cabeza producidos por el estrés, insolación y esfuerzo mental.	Cada tableta contiene: Cinchona officinalis 4X, Condurango 4X, Pulsatilla nigricans 4X, Aceticum acidum 6X, Arsenicum album 6X, Asafoetida 6X, Lycopodium clavatum 6X, Natrum sulphuricum 6X, Phosphoricum acidum 6X, Secale cornutum 6X, Aranea diadema 8X, Kalmia latifolia 8X, Strychninum nitricum 8X, Calcarea phosphorica 10X, Carbo vegetabilis 10X, Curare 10X, Mercurius praecipitatus 10X, Silicea terra 10X, Uranium nitricum 12X, Bryonia alba 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para el alivio de migrañas.	Oral (sublingual) Adultos y mayores de 12 años 1 tableta cada 6 horas, en casos agudos tomar 1 tableta cada 15 minutos por 2 horas. Posteriormente regresar a la dosis habitual. Uso pediátrico: consulte a su médico homeópata.	005H98 SSA 28-Ene-1998
BHI MULIMEN®	**BHI PMS MULIMEN®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias premenstruales.	Cada tableta contiene: Agnus cactus 3D, Cimicifuga racemosa 4D, Hypericum perforatum 3D, Gelsemium sempervirens 4D, Urtica urens 3D, Kali carbonicum 4D, Ambra grisea 4D, Calcarea carbonica 8D, Sepia officinalis 8D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Para el alivio temporal de síntomas asociados con el síndrome premenstrual.	Oral (sublingual) 1 tableta cada 6 horas, casos agudos tomar 1 tableta cada 15 minutos por un máximo de 1 hora. Después reanudar con la dosis indicada.	052H96 SSA 16-Dic-1996
BHI NAU®	**BHI NAUSEA®**	Auxiliar en el tratamiento para el alivio de las nauseas.	Cada tableta contiene: Anacardium orientale 6X, Ipecacuanha 6X, Argentum nitricum 8X, Robinia Pseudocacia 10X, Carbo vegetabilis 12X, Iodum 2X, Sepia officinalis 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para el alivio de las náuseas.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas, niños mayores de 8 años 1 tableta cada 8 horas, casos agudos: adultos, 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas. Niños 1 tableta cada 30 minutos por espacio de 2 horas. Posteriormente reanudar cada ocho.	001H99 SSA 15-Feb-1999
BHI NERALGIA®	**BHI NEURALGIA®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias ocasionadas por la ciatica y algunos casos de neuralgias.	Cada tableta contiene: Spigelia anthelmia 8X, Gelsemium sempervirens 10X, Kali bichromicum 10X, Thuja occidentalis 10X, Silicea terra 12X, Stannum metallicum 12X, Theridion 12X, Belladonna atropa 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de varios tipos de neuralgia.	Oral (sublingual) Adultos: en general, 1 tableta cada 6 horas, en casos agudos 1 tableta cada 15 minutos por un espacio no mayor a 2 horas.	100H2000 SSA 27-Jul-2000

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

Nombre Nacional	Nombre Inglés	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina B.H.I e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BHIPANC®	**BHI PANCREAS®**	Auxiliar en el tratamiento de dispepsia flatulencia dolorosa, diarrea matutina o estreñimiento.	Cada tableta contiene: Leptandra virginica 6X, Momordica balsamina 6X, Ceanothus americanus 8X, Podophyllum peltatum 8X, Carbo vegetabilis 10X, Lycopodium clavatum 10X, Mercurius iodatus flavus 10X, Pancreatinum 10X, Lachesis mutus 12X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para los trastornos pancreáticos.	Oral (sublingual) Adultos en general, 1 tableta cada 6 horas.	068H2000 SSA 27-Mar-2000
BHI PERSPIRATION®	**BHI PERSPIRATION®**	Auxiliar en el tratamiento de regulación de la sudoración profusa del cuerpo.	Cada tableta contiene: Salvia officinalis 4X, Sambucus nigra 4X, Pilocarpus jaborandi 5X, Cedron 6X, Nitricum acidum 6X, Petroleum 6X, Sanguinaria canadensis 6X, Thuja occidentalis 6X, Salicylicum acidum 8X, Sulphuricum acidum 8X, Calcarea carbonica 10X, Sepia officinalis 10X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para regular la sudoración.	Oral (sublingual) Adultos y mayores de 12 años, 1 tableta cada 8 horas.	008H99 SSA 23-Abr-1999
BHIPROST®	**BHI PROSTATE/SAW PALMETO®**	Auxiliar en el tratamiento de trastornos urinarios en el hombre y prostatitis.	Cada tableta contiene: Petroselinum sativum 4X, Populus tremuloides 4X, Sabal serrulata 4X, Chimamphyla umbellata 5X, Kreosotum 6X, Succinicum acidum 8X, Hepar sulphuris calcareum 10X, Conium maculatum 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para el tratamiento de las alteraciones prostáticas y de los malestares urinarios relacionados.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas.	052H97 SSA 12-Ene-1998
BHIRECOV®	**BHI RECOVERY MELILOTUS®**	Auxiliar en el tratamiento de la disminución de la memoria en el paciente anciano.	Cada tableta contiene: Arnica montana 6X, Belladonna atropa 8X, Melilotus officinalis 8X, Gelsemium sempervirens 3X, Carbo vegetabilis 10X, Lachesis mutus 12X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado en desórdenes circulatorios cerebrales.	Oral (sublingual) Adultos: disolver lentamente en el boca 1 tableta cada 6 horas.	008H98 SSA 3-Feb-1998
BHI RENDIMAX®	**BHI RENDIMAX®**	Ayuda en los casos de dolor muscular o agotamiento físico debido al ejercicio.	Cada tableta contiene: Llex aquifolium 2X, Oleander 5X, Arnica montana radix 7X, Orchitinum 10X, Sarcolacticum acidum 11X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Ayuda natural en los casos de dolor muscular o agotamiento debido al ejercicio.	Oral (sublingual) La dosis normal es de hasta 5 tabletas antes, durante o después del ejercicio físico.	110H2000 SSA 3-Ago-2000
BHI RESTORATIVE®	**BHI RESTORATIVE®**	Auxiliar en el tratamiento de contracturas musculares y calambres.	Cada tableta contiene: Causticum 8X, Gelsemium sempervirens 8X, Plumbum metallicum 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para los casos de parálisis muscular.	Oral (sublingual) Adultos: en general 1 tableta cada 6 horas, en casos agudos 1 tableta cada 15 minutos por un espacio no mayor a 2 horas.	103H2000 SSA 27-Jul-2000
BHISCIAT®	**BHI SCIATIC RX BACK®**	Auxiliar en el tratamiento de ciática, lumbalgia y dolores artríticos y reumáticos.	Cada tableta contiene: Colocynthis citrullus 5X, Gnaphallium polycephalum 5X, Ammonium muriaticum 6X, Gelsemium sempervirens 6X, Rhus toxicodendron 8X, Arsenicum album 10X, Chamomilla recutita 10X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para el tratamiento de la ciática y de dolores en la parte inferior de la espalda.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas, en casos agudos 1 tableta cada 15 minutos por 2 horas. Después reanudar a la dosis habitual.	046H97 SSA 8-Dic-1997

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

Nombre Nacional	Nombre Inglés	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina B.H.I e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BHI SIN®	**BHI SINUS®**	Auxiliar en el tratamiento de los síntomas de la sinusitis y del resfriado común.	Cada tableta contiene: Pulsatilla nigricans 4X, Thuja occidentalis 6X, Euphorbium officinarum 6X, Kali iodatum 8X, Hydrastis canadensis 6X, Phosphorus 8X, Kali bichromicum 6X, Mercurius sulphuratus ruber 10X, Influenzinum 10X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para los síntomas de la sinusitis, resfriados, influenza y alergias.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas, Niños mayores de 2 años 1 tableta cada 12 horas, casos agudos: Adultos, tomar 1 tableta cada 15 minutos por un espacio no mayor a 1 hora.	048H96 SSA 13-Dic-1996
BHISKIN®	**BHI SKIN®**	Auxiliar en el tratamiento de afecciones de la piel y acné.	Cada tableta contiene: Berberis vulgaris 6X, Rhus toxicodendron 8X, Arsenicum album 10X, Graphites 10X, Hydrofluoricum acidum 10X, Kreosotum 10X, Petroleum 10X, Sepia officinalis 10X, Lycopodium clavatum 12X, Sulphur 12X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado en eczemas e irritaciones cutáneas.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas. Niños mayores de 3 años 1 tableta cada 8 horas.	051H97 SSA 12-Ene-1998
BHI SPASM PAIN®	**BHI SPASM PAIN®**	Auxiliar en el tratamiento de los dolores tipo cólico en la menstruación e inflamación del colon.	Cada tableta contiene: Aconitum napellus 4X, Bryonia alba 4X, Colocynthis 4X, Atropinum sulphuricum 6X, Cuprum sulphuricum 6X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta	Recomendado para el alivio del dolor y de espasmos de músculos y órganos.	Oral (sublingual) Adultos en general 1 tableta cada 6 horas, en casos agudos 1 tableta cada 15 minutos por un espacio no mayor a 2 horas.	101H2000 SSA 27-Jul-2000
BHI STOM®	**BHI STOMACH®**	Auxiliar en el tratamiento de la dificultad para la digestión y la acidez.	Cada tableta contiene: Nux vomica 4X, Pulsatilla nigricans 4X, Argentum nitricum 6X, Arsenicum album 6X, Natrum phosphoricum 6X, Antimonium crudum 10X, Carbo vegetabilis 10X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el alivio de molestias estomacales.	Oral (sublingual) Adultos: 1 tableta cada 6 horas, casos agudos: Adultos, 1 tableta cada 15 minutos por espacio de 2 horas.	023H98 SSA 20-Jul-1998
BHITROAT®	**BHI THROAT®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por la laringitis (como tos y ronquera).	Cada tableta contiene: Arum triphyllum 4X, Hyosciamus niger 6X, Paris quadrifolia 5X, Arnica montana 8X, Argentum nitricum 6X, Verbascum Thapsus 8X, Causticum 6X, Carbo vegetabilis 10X, Phosphorus 10X, Calcarea carbonica 30X. Excipiente; c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de dolores de garganta y de la laringitis.	Oral (sublingual) 1 tableta cada 6 horas, en casos agudos 1 tableta cada 15 minutos por 2 horas y luego cada 6 horas. Niños mayores de 2 años 1 tableta cada 8 horas, casos agudos 1 tableta cada media hora por 2 horas, luego cada 8 horas.	049H97 SSA 12-Ene-1998
BHI VARIOSE®	**BHI VARICOSE®**	Auxiliar en el tratamiento de las varices.	Cada tableta contiene: Hamamelis virginiana 4D, Picricum acidum 6D, Pulsatilla nigricans 4D, Secale cornotum 6D, Aesculus hippocastanum 6D, Carbo vegetabilis 10D, Carduus marianus 6D, Mercurius praecipitatus ruber 10D, Lycopodium clavatum 6D, Apis mellifica 12D. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para el tratamiento de las venas várices y de la éstasis (congestiones) venosas.	Oral (sublingual) 1 tableta cada 6 horas.	057H96 SSA 16-Dic-1996

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

Nombre Nacional	Nombre Inglés	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina B.H.I e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BHI BODY PURE®	**BHI BODY PURE®**	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por los efectos de la contaminación ambiental.	Cada tableta contiene: A-Lypoicum acidum 3X, A-Lypoicum acidum 6X, A-Lypoicum acidum 8X, Ricinus communis 3X, Viola tricolor 4X, Caffeinum 6X, Rhamnus prusiana 6X, Cholesterinum 10X, Petroleum 12X, X-Ray 12X, Avena sativa 3X, Solidago vigaurea 4X, Berberis vulgaris 6X, Juglans regia 6X, Urtica urens 6X, Influenzinum 12X, Tabacum 12X, Nux vomica 30x. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por los efectos de la contaminación ambiental.	Oral (sublingual) La dosis que el médico homeópata señale.	077H2000 SSA 31-Mar-2000
BHI ENZY®	**ENZYME®**	Auxiliar en el tratamiento de los estados de debilidad o fatiga, posteriores al ejercicio excesivo.	Cada tableta contiene: Nicotinamidum 4X, Thiaminum hydrochloricum 4X, Riboflavinum 4X, Pyridoxinum hydrochloricum 4X, Cyanocobalaminum 6X, Acidum ascorbicum 4X, Cysteinum 6X, Magnesia phosphorica 6X, Natrum oxalacetium 6X, Lipoicum acidum 8X, Cerium oxalicum 8X, Cis-aconitate 8X, Citricum acidum 8X, Coenzyme A 8X, Fumaricum acidum 8X, ketoglutaricum 8x, Malonicum acidum 8X, Natrum pyruvicum 8X, Succinicum acidum 8X, Baryta oxalsuccinicum10X, Pulsatilla pratensis 8X, Adenosin triphosphoricum 10X, Manganum gluconicum 10X, Nadidum 10X, Hepar sulphuris calcareum 10X, Sulphur 30X. Excipiente: c.b.p. 1 tableta.	Recomendado para una mejor utilización de la energía: para todo el período de recuperación después de una enfermedad o accidente, para todas aquellas situaciones en las cuales la fatiga es un factor importante, para los casos en que hay una desactivación enzimática, para el uso diario como preservador de la salud, para casos de alimentación incorrecta, estrés, ejercicio inadecuado.	Oral (sublingual) La dosis que el médico homeópata señale.	013H2001 SSA 5-Jul-2001

RUBIO PHARMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. GOTA B.H.I.

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
BHI SLEEP®	**NUEVO**	Auxiliar en el tratamiento del insomnio.	Cada 100 ml. Contiene: Chamomilla 2X, Passiflora incarnata 2X, Coffea cruda 10X, Humulus Lupulus 2X, Valeriana officinalis 2X, Nux vomica 30X. Vehículos: c.b.p. 100 ml.	Auxiliar en el tratamiento del insomnio.	Oral (sublingual) Adultos en general tomar 15 gotas en un poco de agua cada 12 horas. Niños de 2 a 6 años dar 5 gotas en un poco de agua cada 12 horas.	073H2000 SSA 28-Mar-2000

MATRIZ: BLVD. GARCIA MORALES KM. 6.5 COL. EL LLANO, C.P. 83210, TEL/FAX: (662) 260-01-70, Y 260-66-28 TEL. (662) 260-32-32 FAX DIRECTO: (662) 218-48-40 EMAIL: RUBIOPH@RTN.USON.MX Y RPHARMA@RTN.USON.MX HERMOSILLO, SONORA.
SUCURSAL: MANUEL LÓPEZ COTILLA No. 1106 ENTRE PILARES Y MATÍAS ROMERO COL. DEL VALLE C.P. 03100 DELEG. BENITO JUÁREZ TEL. (55) 5575-19-02 FAX: (55) 5575-55-08 EMAIL: RUBIOPHARMA@COMPUSERVE.COM.MX-MÉXICO, D.F

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
HOMEOTOX®	**HOMEOTOX®**	Para alivio de la tos seca e irritativa.	Cada 100 ml contiene: Drosera 1DH, Sticta pulmonaria 4DH, Echinacea angustifolia 1DH, Thymus vulgaris 1DH, Bryonia 6DH, Cuprum aceticum 8DH, Althaea officinalis 1 DH, Plantago major 1DH, Cetraria islandica 4DH, Tartarus stibiatus 8DH, Coccus cacti 6DH. Vehículo: c.b.p. 100 ml.	Para alivio de la tos seca e irritativa.	Oral Adultos: tomar 2 cucharadas de 5 ml. cada 6 horas. Niños mayores de 2 años: dar a tomar 1 cucharada de 5 ml. cada 8 horas.	006H2002 SSA

RUBIO PHARMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. GLOBULOS PHINTER-HEEL

Nombre Nacional	Nombre Alemán	Indicaciones	Fórmula	Indicaciones según Terapia de Rutina e I.P.P.R.	Vías de Administración y Dosis	Registro SSA y Fecha de expedición
INVERGRIPHI 200®	**INVERGRIPHI®**	Auxiliar en el tratamiento de los síntomas asociados a los estados gripales y resfriados.	Cada tubo contiene: Aconitum napellus 5CH, Atropa belladonna 5CH, Echinacea angustifolia 3CH, Vincetoxicum officinale 5CH, Anas barbariae 200k, Influenzinum 9CH, Cuprum 3CH. Excipiente: c.b.p. 1g	Auxiliar en el tratamiento de los síntomas asociados a los estados gripales y resfriados.	Oral La dosis que el médico señale.	005H2002 SSA

Rubio Pharma
y Asociados
S.A. de C.V.

ANEXOS
Y
NOVEDADES

Medicamentos alopáticos homeopatizados

Acetylsalicylsäure-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Daños retóxicos durante o después de tratamiento con salicilatos de poliartritis reumática aguda y crónica o de artritis reumatoidea. Daños retóxicos durante o después de abuso de salicilatos como analgésicos para cefaleas. Hemorragias gastrointestinales causadas por salicilatos, así como gastritis con y sin ulceraciones. Glomerulonefritis aguda y crónica, nefrosis. Miocardosis, *vitium cordis* (defecto del corazón), especialmente cuando está asociado a un ataque de reumatismo (anterior) del que el paciente puede haberse restablecido. Daños del tejido conjuntivo en general. Trastornos del sueño (lesiones mesencefálicas). Alergias (urticaria) y crisis asmáticas después de tratamiento con ácido acetilsalicílico.

Acidum acetylosalicylicum-Injeel
Véase Acetylsalicylsäure-Injeel

Chloroquin-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
La cloroquina, un derivado de la aminoquinolina, se administra con mucha frecuencia para el tratamiento del reumatismo articular crónico y de la espondilartritis reumática, así como en artrosis con inflamación. También en lupus eritematoso crónico, rosácea, liquen rojo plano y con fines preventivos.
Según recomendación de la OMS, para la prevención de la malaria no deberán administrarse más de 100 g de base cloroquínica que, si se compara con el tratamiento a largo plazo del reúma, a razón de 1 comprimido de 250 mg al día, corresponde a un periodo de aproximadamente 2 años.
Indicaciones: Daños terapéuticos de la administración de dosis elevadas o prolongadas de cloroquina como, por ejemplo, trastornos gastrointestinales, vértigo, cefaleas, escotoma,opacidad corneal, trastornos de la acomodación. También en neuropatías y reacciones cutáneas en forma de fotosensibilización.

Gamma-Globulin-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
La gammaglobulina en el transportador de la función de los anticuerpos. La utilización en la práctica de la gammaglobulina consiste en el control preventivo y terapéutico (inmunización pasiva) de enfermedades infecciosas, incluidas también las enfermedades víricas, cuyos agentes etiológicos todavía no han podido ser aislados de forma regular como, por ejemplo, herpes zoster, varicela, sarampión, paperas, mononucleosis infecciosa, poliomielitis o hepatitis. La administración de pequeñas dosis de gammaglobulinas consigue aminorar la sintomatología con inmunidad a largo plazo, lo cual es muy deseable desde el punto de vista biológico.

Penicillin-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Los puntos de ataque de la penicilina pueden verse en Erythromycin-Injeel.
Todas las penicilinas y sus derivados provocan con relativa frecuencia una “alergia a la penicilina”, debiendo tener mucho cuidado con una posible alergia cruzada a las cefalosporinas. Hay que pensar también en la posibilidad de aparición de lupus eritematoso causado por la penicilina.
En relación con la “alergia a la penicilina”, debido a la presencia de anticuerpos de penicilina en sangre humana, son de interés las informaciones siguientes:
La reacción alérgica puede manifestarse en forma de afecciones cutáneas, eccemas urticantes, etc. No obstante, también se observa rigidez, fiebre, asma y otros trastornos, parte de ellos graves. Muchos autores advierten insistentemente de los peligros de un uso demasiado liberal de la penicilina, particularmente en forma de pomadas, comprimidos de administración oral, colirios, polvos y comprimidos vaginales, etc., pues ello puede conducir a un aumento de la población sensibilizada a la penicilina. La utilización a largo plazo de antibióticos puede dañar tan seriamente la flora bacteriana, que ciertos hongos (como, por ejemplo, Candida albicans) pueden proliferar sin restricción alguna.

Streptomycin-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
La estreptomicina pertenece al grupo de los antibióticos aminoglucósidos. Las indicaciones incluyen, aparte de las infecciones por bacterias gramnegativas y cocos, sobre todo las producidas por bacilos tuberculosos.
Como contraindicaciones de todos los antibióticos aminoglucósidos se citan los trastornos cardiacos y de la excreción renal de carácter grave. Como efectos secundarios de este grupo de antibióticos se mencionan los siguientes: lesiones renales, bloqueos neuromusculares, parestesias y dolores musculares.
Aparte de las propiedades nefrotóxicas de la estreptomicina,

se conocen también reacciones alérgicas en forma de eccemas urticantes y dermatitis exfoliativa generalizada. También se puede considerar como reacción alérgica la aparición de lesiones hepáticas y granulocitopenia después de la administración de estreptomicina. La estreptomicina es sobre todo un neurotóxico con especial afinidad por el VIII par craneal. Por tanto, tiene una afinidad especial por la función vestibular (síntomas de vértigo, trastornos del equilibrio y de la marcha), mientras que la dihidroestreptomicina tiene una especial afinidad por la función coclear (trastornos auditivos que pueden llegar a disacusia y sordera). Las lesiones cocleares, al contrario que las vestibulares, son prácticamente siempre irreversibles.
Indicaciones: Los cuadros clínicos anteriormente mencionados, sobre todo síntomas de vértigo, trastornos del equilibrio y de la marcha, pero también trastornos auditivos como acufenos, disacusia y sordera, pues, la estreptomicina, y no solo la dihidroestreptomicina también puede provocar trastornos acústicos y cocleares.

Sulfonamid-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Las sulfonamidas pueden describirse como tóxicos enzimáticos que inhiben competitivamente los mecanismos enzimáticos en los que actúa el ácido paraminobenzoico como coenzima (como, por ejemplo, el factor H de crecimiento de la avena en Streptobact. plant.). Por tanto, las propiedades bacteriostáticas de las sulfonamidas se deben a su acción como tóxico enzimático, lo cual puede dar origen a un gran número de efectos secundarios como, por ejemplo, trastornos gastrointestinales, colestasis, leucotrombocitopenia e incluso agranulocitosis. Por otro lado, la fiebre por sulfonamidas puede ser de origen alérgico, pero también puede ser la expresión de daños tóxicos graves, como una hepatitis o una anemia hemolítica. Las contraindicaciones para la administración de las sulfonamidas son las últimas semanas del embarazo, el periodo de la lactancia y las primeras semanas de vida del lactante, pues existe el riesgo de formación de sulfohemoglobina o metahemoglobina, ya que fisiológicamente, la metahemoglobina reductosa todavía no funciona totalmente en los lactantes. En la formación de la metahemoglobina participa de forma decisiva un producto metabólico tóxico formado en los microsomas hepáticos, el p-hidroilaminobenceno sulfonamida. Además, puede producir una alergia marcada a las sufonamidas en forma de fiebre, aunque también trastornos renales y hepáticos y reacciones alérgicas cutáneas. El eritema exudativo multiforme (incluso si se ha padecido anteriormente) representa una contraindicación del tratamiento con sulfonamidas.
Indicaciones: Los cuadros clínicos anteriormente mencionados, especialmente cuando estos se deben al tratamiento con sulfonamidas, que pueden haber sido administradas mucho tiempo antes.

Tetracyclin-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Todas las tetraciclinas tienen estructuras basadas en un esqueleto de naftaceno (clortetraciclina, oxitetraciclina, 6-dimetilclortetraciclina, alfa-6-desoxi-5-hidroxitetraciclina o doxiciclina).

Catalizadores intermediarios

Acidum cis-aconiticum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Tendencia a resfriarse con facilidad, sensibilidad al viento y los cambios de temperatura, junto con neuralgias y odontalgias, eccemas pruriginosos en el cuero cabelludo. Crisis súbitas de asma, estenocardia (asociada a taquicardia). Dolores óseos nocturnos, incluso al nivel vertebral, enfermedad de Scheuermann. Afecciones de aparición repentina, sobre todo por la noche y que mejoran por el calor seco. Frecuentes cambios de ánimo, irritabilidad e irascibilidad.

Acidum L(+)-asparagicum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
El ácido aspártico es un factor activo intermediario de enzimas y sistemas redox.
Indicaciones: Fase de impregnación de cualquier tipo como, por ejemplo, asma, angina de pecho, prurito, dermatitis, pero también en psoriasis, estados precancerosos, fases de neoplasia (sobre todo en su comienzo) y, en general, para mejorar la respiración celular.

Acidum citricum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Dificultades respiratorias que empeoran con el calor, necesidad constante de aire fresco. Envejecimiento prematuro, arterioesclerosis, principalmente esclerosis cerebral. En la regulación del metabolismo del calcio, produce desmineralización a través de la paratormona y la calcitonina; por ello, se indica este remedio cuando existen alteraciones en el metabolismo del calcio (tipología linfática con déficit de calcio). Intolerancia al azúcar y al alcohol; los niños rechazan las frutas y las verduras. Suele tratarse de pacientes con un buen estado de humor (agradables) que proyectan grandes planes pero carecen de motivación.

Acidum fumaricum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Acidum fumaricum-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Pacientes pálidos, enfisematosos con respiración corta y cianosis facial, cabellos grasientos y sudación profusa. Con respecto al sistema nervioso, sintomatología similar a la de carbonato potásico (Kalium carbonicum). Catarros con secreciones fluidas y excoriantes, tumefacción palpebral, fiebre del heno. Cuando exista hipertensión, adminístrense Acidum fumaricum-Injeel forte junto con Acidum DL-malicum-Injeel. Trastornos enzimáticos de los órganos digestivos . Procesos inflamatorios de los órganos genitales (ooforitis, parametritis con sensación de prolapso); trastornos menopáusicos (bochornos de calor, crisis sudorales).

Acidum alpha-ketoglutaricum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Afecta a los tejidos muscular y conjuntivo; es típico el agotamiento (cansancio) acompañado de dolores (como en Arnica). La constitución característica es delgada, musculosa y atlética. Dolores y lesiones musculares y ligamentarias (también reumatismo de partes blandas, tendovaginitis). Sensación de debilidad durante la gripe. Necesidad de mantener las ventanas abiertas (necesidad de aire fresco). El estado general empeora cuando permanece largo tiempo sentado y conduciendo.

Acidum L(+)-lacticum-Injeel forte D 4, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Indicaciones: Alteraciones de la respiración celular, así como coadyuvante en diabetes mellitus. También en estados de precancerosis y fases de neoplasia.

Acidum DL-malicum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Es el principal remedio usado para facilitar la destoxicación y el aporte de oxígeno a los tejidos glandulares y músculos. Indicado en afecciones reumáticas. Enfermedades miocárdicas de origen tóxico y degenerativo, insuficiencia cardíaca, debilidad postinfecciosa del miocardio, corazón de atleta. Entre los síntomas típicos se incluyen manos y pies fríos con coloración azulada. Hipersensibilidad a los cambios del tiempo.
Bronquitis crónica y sinusitis con sequedad de mucosas desde la infancia. Seborrea intensa, eccema seco y escamoso, psoriasis con prurito intenso. Eccema del conducto auditivo.
Acidum DL-malicum-Injeel siempre debe administrarse junto con Acidum fumaricum-Injeel.

Acidum succinicum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Intimamente relacionado con el sistema hematopoyético: anemia, leucemia, cefalea anémica, trastornos poshemorrágicos, estados de agotamiento. Estómago nervioso irritado. Infecciones recidivantes de la pelvis renal y del tracto urinario eferente. Pacientes inhibidos, debilitados, cansados y con memoria po-

bre.

ACTH-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Daños terapéuticos durante o después de la administración de glucocorticoides a largo plazo. También experimentalmente en disfunciones del lóbulo anterior de la hipófisis y de la corteza de las glándulas suprarrenales.

Adrenalin-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Adrenalin-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Aunque la adrenalina o epinefrina está contenida en muchos medicamentos alopáticos, Adrenalin-Injeel y forte se incluye en este grupo de medicamentos. Se citan algunos efectos secundarios conocidos de la epinefrina o adrenalina: palpitaciones, afecciones anginosas, trastornos del ritmo ventricular e hiperglucemia.

cAMP D 8, D 12 y D 30 Injeel
Para la reactivación estimuladora en caso de bloqueos enzimáticos (enzimas de la membrana celular como la adenilatociclasa), en fases celulares, iatrogenia medicamentosa, experimentalmente en viriasis y tratamiento coadyuvante del cáncer.

Anthrachinon-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Según W. F. Koch, la antraquinona reactiva las enzimas de la respiración celular que están bloqueadas,“ quemando” las toxinas acumuladas (aminas, etc.).
Indicaciones: Todas las fases celulares (fases de impregnación, de degeneración y de desdiferenciación).

ATP (Adenosina trifosfato)-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Puesto que el ATP es un eslabón intermediario muy importante en el balance energético: daños en los sistemas consumidores de energía (ciclo del ácido cítrico), especialmente en caso de iatrogenia.

Baryum oxalsuccinicum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Particularmente relacionado con todas las glándulas; de forma especial con el timo, la epífisis y la hipófisis. Por tanto, tiene una actividad sobre el control central de la actividad hormonal. Está indicado sobre todo en la pubertad y en la menopausia. Catarros crónicos y asma con disnea intensa. Todas las enfermedades del oído en niños. Disminución del olfato. Congestión sanguínea en la cabeza. Afecciones tras apoplejía. Trastornos de la visión, miopía en niños, estrabismo. Parálisis de la musculatura ocular tras enfermedades infecciosas.
Procesos inflamatorios de los párpados. Trastornos circulatorios de las extremidades.

Caesium-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Factor de oligoelemento.

Cerium oxalicum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
El oxalato de cerio estimula la utilización de oxígeno como catalizador de transferencia de oxígeno para mejorar la respiración interna, lo mismo que las sales de cerio.
Indicaciones: Todos los estados y cuadros clínicos basados en una deficiente utilización de oxígeno o causados por ella. Desde el punto de vista homeopático, hay que indicar que también se utiliza Cerium oxalicum-Injeel en la hiperemesis gravídica y otros vómitos de tipo reflejo (náuseas, vómito cerebral, dispepsia nerviosa, gastroenteritis más o menos crónica) y tos refleja.

Chinhydron-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
La quinhidrona, un compuesto quinónico, puede tener un efecto catalítico en la cadena respiratoria, es decir, actuar como catalizador intermediario.
Indicaciones: Todas las fases celulares, incluidas las fases de neoplasia y las enfermedades víricas. Observación especial sobre la dosificación: se han de administrar sólo dosis aisladas, vía s.c. y esperar 1 mes a que se produzca su efecto.

Cortison-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Deberá prestarse especial atención al efecto inverso de los glucocorticoides.
Indicaciones: Consecuencias del abuso de cortisona y otros daños terapéuticos. Lesiones en la corteza de las glándulas suprarrenales, de la hipófisis (caquexia de Simmond o síndrome de Simmond-Sheehan), distrofia adiposogenital, debilidad del tejido conjuntivo como, por ejemplo, osteoporosis, osteomalacia, osteocondrosis, debilidad de los ligamentos con torceduras de las articulaciones, atrofia de Sudeck y otras enfermedades que se manifiestan en el tejido conjuntivo.

Cystein-Injeel D 12, D 30,D 200 ana partes.
Trastornos retóxicos y otros daños terapéuticos de cualquier tipo y localización. Para intercalar en todas las fases celulares, - especialmente en lesiones hepáticas de diferente tipo, asma - bronquial, leucemia, estados precancerosos y fases de neoplasia.

Ferrum fumaricum-Injeel D 10 D 30, D 200 ana partes.

Ferrum fumaricum-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.

El ácido fumárico es un ácido del ciclo del ácido crítico, donde se subraya su unión al hierro y las relaciones de este preparado con la respiración celular.

Indicaciones: Puede probarse su administración en fases de degeneración o en caso de alteraciones en la utilización de oxígeno (bloqueo del ciclo del ácido cítrico), por ejemplo en psoriasis, anemia pernicosa, etc.

Guanidin-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Daños graves en los sistemas intracelulares. Puede probarse su administración, por ejemplo, en mutaciones, tetania, trastornos de la función paratiroidea y del metabolismo del calcio, como osteomalacia, osteoporosis y raquitismo.

Como medicamento alopático homeopatizado, puede probarse su administración también en caso de daños durante y después de la administración por vía oral de agentes antidiabéticos activos.

Histamin-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Histamin-Injeel forte D 6, D 12, D 30, D 200 ana partes.

La histamina es una amina biógena perteneciente al grupo de las hormonas hísticas. Bajo este nombre se incluyen una serie de sustancias activas que no se producen en determinados órganos, sino en muchos tejidos.

Indicaciones: Todos los cuadros clínicos síntomas, afecciones, etc., en los que un efecto excesivo de la histamina puede ser responsable de enfermedades alérgicas como asma bronquial, rinitis vasomotora y enfermedades alérgicas de la piel. También gastritis y duodenitis con o sin úlcera, espasmos gastrointestinales, aumento de la secreción de las glándulas salivales y lagrimales, así como de las glándulas bronquiales y determinadas formas de cefalea. Como la histamina también está contenida en muchas bebidas alcohólicas, Histamin-Injeel también está indicado experimentalmente para muchos trastornos debidos al alcohol. Dado que la histamina se libera en grandes cantidades en caso de quemaduras, contusiones, fracturas o destrucciones tisulares, Histamin-Injeel y forte también están indicados en estos casos.

Hydrochinon-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Fisiológicamente, la hidroquinona se forma en el curso de la -- fosforilación oxidativa, donde es reconvertida rápidamente en quinona por el citocromo B.

Indicaciones: Trastornos en la utilización de oxígeno como, por ejemplo, en fases de impregnación como el asma bronquial y dermatosis, así como en estados precancerosos.

Insulin-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Insulin-Injeel forte S D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.

Se puede administrar a título de prueba, tomando como base el efecto homeopático inverso, en hiperinsulinismo (por insulinoma o funcional) con estados hipoglucémicos y en daños durante y después de la administración de insulina como, por ejemplo, lipodistrofia insulínica. Insulin-Injeel y forte no están indicadas como sustitutos de la insulina en diabetes mellitus.

Magnesium-Manganum-phoshoricum-Injeel

Magnesium phosphoricum D 12, D 30, D 200, Manganum phosphoricum D 12, D 30, D 200 ana partes.

Las principales indicaciones son: acción catalítica de los oligoelementos, especialmente como apoyo al ciclo de Krebs.

Methylenblau-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

El azul de metileno no posee ninguna estructura de quinona. -- Sin embargo, es un importante aceptor de hidrógeno en los procesos bioquímicos redox. La deshidrogenación del ácido succínico por la succinato deshidrogenasa, enzima de amplia distribución, y la posterior formación de ácido fumárico, también puede llevarse a cabo (en ausencia de oxígeno) a través del azul de metileno.

Indicaciones: Como coadyuvante de la respiración en numerosas fases celulares, incluyendo las fases de neoplasia.

Myrtillus-Injeel forte D 4, D 10, D 30, D 200 ana partes.

Las antocianinas del arándano contienen quinonas (hidroquinona).

Indicaciones: En general, en fases celulares (enfermedades víricas, fases de neoplasia). Debido a su dilución D 4 (en la forma Injeel forte) o D 10 (en la forma Injeel) y superiores, Myrtillus-Injeel y forte no están indicados para el tratamiento de las enfermedades catarrales como estomatitis, faringitis, laringitis enteritis o cistitis. En estos casos, se recomienda la fitoterapia

con Myrtillus, en la que la acción del jugo exprimido de las bayas frescas o de las hojas secas, es de gran importancia farmacológica dado su contenido en ácido tánico.

Naphtochinon-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

La naftoquinona, como derivado quinónico, tiene funciones de grupo carbonilo, lo que posibilita, según W. F. Koch, la combustión de los grupos amino tóxicos de los compuestos azometínicos.

Indicaciones: Todas las fases celulares, especialmente las fases de neoplasia y las enfermedades víricas, aunque también infecciones tóxicas (fases de reacción).

Natrium oxalaceticum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Síntoma principal: tendencia a los catarros. Sensibilidad al viento y a la humedad. Hipersensibilidad a proteínas y grasas (no a los azúcares). Vértigo resistente al tratamiento. Afecciones pre- y post-apopléticas. Hipertensión arterial. Gastritis aguda y crónica. Procesos inflamatorios del parénquima y pelvis renal. Sudación profusa diurna y nocturna que mancha de un color amarillento la ropa interior. Sudor con olor amoniacal. Orina con olor a espárragos.

Natrium pyruvicum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Sintomatología similar a la de Sulfur. Indicado en fases celulares como asma, eccema pruriginoso, psoriasis, reumatismo y gota, organoneurosis. Psicosis, precancerosis.

Migrañas matinales que duran hasta la tarde, con náuseas y ansiedad. Trastornos circulatorios en diabéticos.

Para-Benzochinon-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

La para-benzoquinona tiene en muchos casos un amplio efecto regenerador sobre la respiración celular (ciclo del ácido cítrico), debido a sus radicales libres, así como en caso de lesiones por mutación.

Indicaciones: Todas las fases celulares, incluyendo, por ejemplo, leucemia, asma bronquial, enfermedades orgánicas de los nervios, hepatitis, etc., así como estados precancerosos y fases de neoplasia.

Scatol-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

El escatol (3-metilindol) se forma en el intestino durante la degradación de las proteínas a partir del aminoácido triptófano.

Serotonin-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Las funciones de la serotonina son: estimulación de la musculatura lisa de los vasos, bronquios, intestino y útero. En cada caso, de acuerdo con el estado inicial, acción de disminución o aumento de la tensión arterial (RR) (regla de Wilder de los valores iniciales).

Con respecto a lo anterior, la acción de la serotonina sobre la circulación coronaria es de naturaleza muy compleja, pues los efectos directos y reflejos hacen muy dificultoso el análisis de su acción. El nivel de serotonina en sangre está muy aumentado en los pacientes cancerosos. Siempre puede detectarse en la orina un incremento en la eliminación de ácido 5-hidroxiindolacético (producto de degradación de la serotonina). Aparte de rubor (coloración rojo cianótica de la piel y del cuello), también son frecuentes los siguientes síntomas: diarrea, ocasionalmente cuando alterna al principio con estreñimiento espasmódico atónico. Crisis de bulimia con hipoglucemia espontánea. Dermatitis alérgica polimorfa. Cianosis, taquicardia, taquipnea con tendencia a las crisis asmáticas, pero también a las crisis de migraña (cefalea por serotonina o histamina en forma de síndrome de Bing-Horton. Además, la serotonina también puede provocar una fibrosis endocárdica con la subsiguiente insuficiencia coronaria debido a una insuficiencia tricuspídea y estenosis pulmonar (alteraciones concretamente en el lado derecho del corazón). La serotonina y sustancias similares a la misma pueden provocar estados psicóticos. Por otro lado, las investigaciones con la dietilamida del ácido lisérgico (LSD), un antagonista de la serotonina, han demostrado que el efecto psicodisléptico del LSD es atribuible a un bloqueo de los neurorreceptores de la serotonina, que sigue a la aparición de ataques esquizofrénicos (intoxicación por LSD).

Indicaciones: Se puede administrar, a título de prueba, en síntomas y cuadros clínicos como los anteriormente mencionados, en los que pueden jugar un papel importante los trastornos del metabolismo de la serotonina. También, por ejemplo, en cefaleas y sintomatología de un síndrome carcinoide. Afecciones -- cutáneas alérgicas y tóxicas como, por ejemplo, después del contacto con pulpos, salamandras, calamares, moluscos (del género Murex) u ortigas.

Trichinoyl-Injeel D 12,D 30, D 200 ana partes.
El inositol (hexahidroxiciclohexano) es muy apropiado para la regeneración de enzimas respiratorias bloqueadas.
Indicaciones: Todas las fases celulares, incluyendo las enfermedades víricas y las fases de neoplasia.

Ubichinon-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
En este caso, ubiquinona se introduce como sistema redox en la cadena respiratoria, en la que tiene una acción coenzimática, por lo que también se conoce como coenzima Q. El isopreno, desde el punto de vista de la nomenclatura, puede definirse también como un radical prenilo.
La ubiquinona posee un intenso efecto regenerativo sobre las enzimas respiratorias bloqueadas.

Vitamin B_{12}-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Las cobalaminas tienen una estructura de anillo similar a las porfirinas, con un átomo central de cobalto trivalente, unido a una base hexosa en forma de nucleótido. La vitamina B_{12} es un factor esencial para el crecimiento normal en una amplia variedad de especies animales, para una hematopoyesis normal (síntesis de ácido nucléico) y para la maduración de las células epiteliales, especialmente del tracto gastrointestinal. Diferentes observaciones indican que la vitamina B_{12} participa en la transferencia de grupos metilo lábiles para la formación de -metionina y, de esta forma, está asociada con el metabolismo del ácido fólico. La reabsorción de la vitamina B_{12} en ciertas partes del tracto gastrointestinal ya está limitada en personas sanas y depende de la concentración del “factor intrínseco”. Una porción de la vitamina B_{12} es reabsorbida en su forma libre, aunque la mayor parte sólo se reabsorbe tras su unión al “factor intrínseco”, una mucoproteína hidrosoluble que se une a la cobalamina en proporciones estequiométricas. En el hígado, la vitamina B_{12}, igual que la vitamina B_6 favorece el metabolismo proteico en el retículo endoplasmático.

Vitamin C-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Vitamin C-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Vitamin C-Injeel actúa como cofactor enzimático en el metabolismo.

Presentación especial:

Complejo de catalizadores del ciclo de Krebs:
Cajas de 10 ampollas de 1,1 ml (1 ampolla de cada uno de los catalizadores siguientes: Magnesium-Manganum-phosphori--cum-Injeel, Natrium pyruvicum-Injeel, Natrium oxalaceticum-Injeel, Acidum citricum-Injeel, Acidum-cis-aconiticum-Injeel, Barium oxalsuccinicum-Injeel, Acidum alpha-ketoglutaricum-Injeel, Acidum succinicum-Injeel, Acidum fumaricum-Injeel y Acidum DL-malicum-Injeel).

Nosodes

Adenoma mammae-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Pequeños nódulos en las mamas, más o menos dolorosos, esféricos, benignos, generalmente múltiples y difusos, en forma de gránulos en la glándula mamaria, con típica agravación premenstrual. Véase también Mastopathia cystica-Nosode-Injeel.

Adenoma prostatae-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Adenoma prostatae-Injeel y forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Prostatitis, adenoma de próstata. Disuria, estranguria. Junto con otros medicamentos antihomotóxicos, también en carcinoma prostático.

Adeps Suillus Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Adeps Suillus Injeel Forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Afecciones que se presentan tras el consumo de grasa de origen animal (especialmente manteca de cerdo). Hipercolesterolemia. Efecto de depuración del tejido conjuntivo. Obesidad. Acné vulgar. Seborrea. Eccemas agudos y crónicos. Cólicos biliares. Blefaritis. Orzuelo. Calacio.
Afecciones debidas a homotoxinas liberadas por pérdida de peso como, por ejemplo, en caso de adelgazamiento muy rápido, ayunos terapéuticos y tratamientos de deshidratación, debido a la deposición masiva de tejido adiposo (fase de deposición) en el torrente linfático y sanguíneo (toxinas de degradación intermediarias).

Anthracinum-Injeel D 20, D30, D 200 ana partes.
Ulceración de la piel con sensación de ardor intenso e insoportable. Vesículas de color azul violáceo a negruzcas con fluido purulento, maloliente e irritante. Tendencia a flemones gangrenosos, sepsis, tumefacción de ganglios linfáticos, parotiditis séptica, especialmente en el lado derecho. Gastroenteritis, diarreas malolientes. Panadizos, furúnculos, ántrax, erisipela, acné vulgar. Actúa eficazmente en asociación con Pyrogenium-Injeel.

Appendicitis-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Tumefacción crónica de ganglios linfáticos. Apendicitis y estados de irritación. Puede probarse en estreñimiento crónico.

Ascariden-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Helmintiasis y síntomas acompañantes (anorexia que alterna con un anormal aumento del apetito o bulimia, eosinofilia, leucocitos eosinófilos en el esputo, cristales de Charcot-Leyden como en el asma bronquial), causada por Ascaris lumbricoides. Efectos tóxicos originados por los productos metabólicos de los vermes, con trastornos gastrointestinales y síntomas nerviosos.

Asthma-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Asthma-Nosode-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Asma bronquial, enfisema, bronquitis crónica, congestión pulmonar, silicosis y cianosis.
En la práctica, se han comprobado buenos resultados en tos ferina, incontinencia urinaria, estreñimiento espasmódico, eccema crónico y estados de ansiedad de cualquier tipo. Agorafobia (también en niños).
Para estimular la destoxicación de la histamina en otras fases de impregnación.
En el asma, se puede inyectar en forma de pápulas a lo largo de la columna vertebral con los medicamentos adicionales adecuados (Toni Inj®, Spascupreel®, Dros homaccord®, Berbaccord®, Acidum DL-malicum-Injeel, Acidum succinicum-Injeel, Natrium pyruvicum-Injeel, Mucs heel®, Cymeheel®, Ubicheel®, Hepaheel®, etc.).

Bacillinum-Injeel D 20, D 30, D 200 ana partes.
Tendencia a los resfriados. Bronquitis crónica, asma bronquial, bronquiectasias.
Eccemas, impétigo, pitiriasis versicolor. Escrofulosis. Furunculosis nasal, rinitis atrófica. Temblor, especialmente en las manos. Cefaleas intensas (sensación de tener la cabeza aprisionada por una pinza). Agravación tras esfuerzo mental, mejoría cuando se está en reposo completo.
Trastornos psicosomáticos: estados de ansiedad y miedo (especialmente en niños).

Bacterium coli-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Cansancio, agotamiento físico y mental. Empleo de palabras equivocadas. Pérdida de la memoria sobre acontecimientos recientes. Temor e indecisión, comúnmente asociados a meteorismo. Sensación de escalofríos después de comer. Lengua saburral blanco amarillenta con una estría roja en el centro. También en disuria y orina turbia de mal olor. Agravación de las afecciones con el frío húmedo. Julian destaca sus buenos resultados en el tratamiento de la salpingitis (también como medicamento a intercalar en anexitis crónica), cistitis, cálculos renales, colan-

gitis y psicosis depresivas.
Este medicamento está indicado especialmente tras tratamientos con antibióticos, de los que se conocen más o menos los daños fisiológicos que provocan en la flora de coliformes del intestino, y en otros daños causados por antibióticos.

Bacterium lactis aerogenes-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Alteraciones de la flora intestinal por antibióticos. Como medicamento coadyuvante en avitaminosis y pancreatitis. Trastornos nutricionales en lactantes. Ulcera duodenal, aclorhidria, diabetes mellitus y linfatismo.
Este medicamento es especialmente eficaz en pacientes delgados del tipo K según Curry.

Bacterium proteus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Gastroenteritis, sobre todo en diarreas de los lactantes. Peritonitis, cistopielitis. Sepsis (puerperal). Otitis. Procesos pulmonares gangrenosos. Osteomielitis.
Alteraciones de la flora intestinal por antibióticos o quimioterápicos. Debilidad general de los mecanismos de defensa.
Puede probarse en casos de irritabilidad nerviosa (graves ataques de ira, lanzamiento de objetos, niños irascibles que patalean). Trastornos circulatorios periféricos como, por ejemplo, claudicación intermitente. Ulcera gástrica y duodenal. Hematemesis. Edemas angioneuróticos, trastornos del carácter en niños. Vértigo. Herpes (Julian).

Bacterium pyocyaneus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Síntomas o secuelas (tardías) de las siguientes enfermedades: inflamaciones de las vías biliares y urinarias, otitis media, gangrena cutánea (ectima gangrenoso), sepsis puerperal.
Hiperhidrosis, fases de impregnación tras represión retóxica de la secreción sudoral. Afecciones tras abuso de purgantes. Amigdalitis.

Brucella abortus Bang-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Brucella abortus Bang-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
En medicina humana es el agente causante de la fiebre ondulante bovina, con síntomas catarrales, gastroenteritis, mialgias y artritis. Aborto habitual, dismenorrea, psicosis asociada al embarazo. Cualquier tipo de afecciones que se presentan después de vacunaciones.

Calculi bili-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Calculi bili-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Colelitiasis, colecistitis, colangitis, especialmente eficaz en asociación con Calculi renales-Injeel, Bacterium coli-Injeel y Vesica fellea suis-Injeel, así como con Chol-Inj®, Chelccord®, Hepeel®, Hepaheel®, Mucs heel®, Momorheel® y Lepdra®.

Calculi renales-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Nefrolitiasis, cistopielitis, pielonefritis, trastornos prostáticos. Es especialmente eficaz en asociación con Berbaccord®, Calculi bili-Injeel, Ureter suis-Injeel, así como con Renheel®, Popucompositum®, Mucs heel®, Soliheel®.

Carcinoma bronchium-Injeel D10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante o complementario del carcinoma bronquial (sobre todo en el postoperatorio). Bronquitis crónica y catarro del fumador (a este respecto, no hay que olvidar el carcinoma bronquial).

Carcinoma coli-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante o complementario del carcinoma de colon (sobre todo en el postoperatorio como, por ejemplo, en el caso de ano artificial). Sigmoiditis, colitis mucosa y ulcerosa.

Carcinoma hepatis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Carcinoma hepatis-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante o complementario de tumores hepáticos primarios, así como en caso de metástasis hepáticas.

Carcinoma hepatis metastatis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante o complementario de metástasis hepáticas que no permiten una intervención quirúrgica. También en lesiones hepáticas y estados precancerosos del hígado, así como, en inyecciones intercaladas, en fases de impregnación y de degeneración de diferente tipo, aunque también en casos incipientes de carcinoma con tendencia a la extensión de las metástasis.

Carcinoma laryngis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Carcinoma laryngis-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante o complementario del carcinoma de laringe (sobre todo en el postoperatorio, así como des -

pués de radioterapia). Ronquera prolongada sin hallazgos or - gánicos. Laringitis de oradores y cantantes.

Carcinoma mammae-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante o complementario del carcinoma de mama (sobre todo en el postoperatorio, así como después de radioterapia).
Mastopatía fibroquística crónica, mastitis quística, quistes mamarios, fibromatosis difusa, etc.

Carcinoma uteri-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante o complementario del carcinoma de útero (sobre todo en el postoperatorio, así como después de radioterapia).
Aunque los miomas uterinos sólo raramente degeneran a fases de neoplasia, este nosode está también indicado para los miomas uterinos.

Cerumen-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Seborrea, acné vulgar, otitis externa, eccema del conducto auditivo. Medicamento alternativo de efectos similares al azufre en caso de falta de reacción. Especialmente eficaz en asociación con Adeps Suillus-Injeel.

Cholesterinum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Hepatopatías con hepatomegalia. Como tratamiento preventivo de la nueva formación de cálculos biliares. Experimentalmente, en caso de hipercolesterolemia y plétora, sobre todo en caso de plétora abdominal.

Cirrhosis hepatis-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Cirrhosis hepatis-Nosode-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Graves disfunciones hepáticas, especialmente (tendencia a la) cirrosis hepática con los síntomas correspondientes como fatiga, náuseas, intolerancia a las grasas, flatulencia, meteorismo, ascitis, varices esofágicas, hemorroides.

Comedones-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Seborrea con hiperqueratosis de los folículos pilosos y aumento de la secreción sebácea. Acné vulgar y conglobata.

Coxsackie-Virus A_9-Injeel D 15, D 30, D 200 ana partes.

Coxsackie-Virus B_4-Injeel D 15, D 30, D 200 ana partes.
Los tipos clasificados inmunológicamente como A_9 y B_4 son responsables de una serie de enfermedades víricas. El aspecto esencial a considerar es que los virus Coxsackie pueden aparecer tanto como precursores o como sustitutos de los virus de la gripe y de la poliomielitis. En infecciones poco claras y resistentes al tratamiento, siempre habrá que tener en cuenta la posible participación de los virus Coxsackie.
Coxsackie-Virus A_9-Injeel ha resultado especialmente eficaz en el tratamiento de afecciones gastrointestinales como gastritis, duodenitis y, especialmente, en colitis mucosa y ulcerosa (la inyección local en el punto 20 del meridiano del intestino grueso, que se sitúa en el pliegue nasolabial produce unos óptimos resultados). Colon irritable. Infecciones intestinales crónicas y recidivantes. También en afecciones de las vías urinarias como, cistopielitis, uretritis, vejiga irritable, prostatitis, epididimitis, sinusitis, conjuntivitis, laringitis, síndrome seno pulmonar y asma bronquial.
Coxsackie-Virus B_4-Injeel está indicado especialmente en secuelas de afecciones “centrales” como, por ejemplo, en estados tras meningitis o meningismo, tras encefalitis y los síntomas psíquicos correspondientes, incluyendo depresión, trastornos del sueño, cefaleas, etc.

Crinis humanus-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Crinis humanus-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Alopecia, encanecimiento prematuro del cabello (se recomienda en combinación con Onyx suis-Injeel).

Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Inflamaciones crónicas recidivantes y secuelas en las vías urinarias, incluso en el parénquima renal.

Diphtherinum-Injeel D 18, D 30, D 200 ana partes.
Secuelas de la difteria, sobre las de tipo cardiaco, como secuelas de endocarditis y miocarditis. Debilidad del miocardio, dolores cardiacos punzantes. Taquicardia, incluso si alterna con bradicardia, extrasístoles, arritmia, hipotensión. Lesiones neurológicas como paresias, especialmente en el paladar blando y músculos faríngeos, pero también en nervios periféricos con disminución o ausencia de reflejos, trastornos sensoriales y parestesias. Anginas crónicas recidivantes (en asociación con Baryum carbonicum-Injeel y Splen suis-Injeel 1 vez a la semana, así como Barijodeel®, Dulcaccord® y Psorinoheel® por vía oral). Halitosis, tumefacción edematosa de las mucosas, incluida, por

ejemplo, la bronquitis crónica senil y la blefaritis crónica.
Enfermedades que cursan con secreción de un exudado seroso, como pleuritis, nefritis crónica y nefritis escarlatínica con edemas, poliartritis aguda y crónica con tumefacción articular.
Diphtherinum-Injeel regula también el equilibrio de la cortisona y las funciones de la corteza de las glándulas suprarrenales, pero también la médula cuando se produce una hipersecreción de adrenalina como resultado de excitación, exceso de trabajo, estrés, etc.
Disminución del rendimiento, incluso en jóvenes. Secuelas de vacunación contra la difteria.

Diverticulose-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Síntomas debidos a divertículos en el tracto digestivo o en la vesícula, como, por ejemplo, dificultades en la deglución (disfagia), regurgitación (reflujo hacia la cavidad bucal del contenido gástrico), movimientos irregulares del intestino (alternancia entre estreñimiento y diarrea), dolores cólicos y también síntomas peritoníticos.
Síntomas debidos a divertículos en la vejiga, como estranguria, crisis bacterianas sin etiología clara, incluso con fiebre y tem - blores.

Duodenitis-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Ulcera duodenal y duodenitis crónica con aumento anormal del apetito y sensación de hambre dolorosa. Como medicamento a intercalar en pancreatitis.

Dupuytren-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Endurecimiento y contractura de la aponeurosis palmar con formación de cordones duros y nódulos. Dosificación: infiltración local de 1 ampolla 1 vez por semana en la zona de los tendo - nes de los flexores de los dedos endurecidos y contraídos. Adicionalmente, tratamiento a largo plazo con Graf homaccord® (8-10 gotas, 2 veces al día), en alternancia con Heelarn® (también 8-10 gotas, 2 veces al día).
Debido a la relación genética causal y convencional, también puede probarse su administración en esclerosis de los cuerpos cavernosos del pene (enfermedad de Peyronie).

Dystrophia musculorum progressiva-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades degenerativas crónicas de la musculatura estriada, independientemente del tipo (atrofia, pseudoatrofia: aumento patológico de los tejidos conjuntivo y adiposo con alteraciones musculares fisiológicas y anatómicas) y de su localización.

Echinococcinum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Secuelas tardías, ocasionalmente con síntomas más o menos tóxicos, tras teniasis o después de una intervención quirúrgica para eliminar un quiste.

Febris wolhynica-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Se utiliza conforme a la similitud etiológica anamnéstica (tras la recuperación de una “fiebre de las trincheras”) o conforme a la similitud sintomática como, por ejemplo, sensación de debilidad, cefaleas, tibialgias (en este caso, también Kalmia-Injeel S, Kalheel®), dolores en las extremidades. También, especialmente, en dolores musculares, de los tejidos blandos y de los huesos (periostio), de origen poco claro y, sobre todo, nocturnos; incluso en dolores en los ligamentos, tendones y puntos de inserción de los músculos.

Fibroma pendulum-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Fibroma pendulum-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
En o después de extirpación quirúrgica de un fibroma péndulo.
En general, para la depuración del tejido conjuntivo.

Fluor albus-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Leucorrea (sobre todo por disfunción). Como tratamiento complementario en leucorrea por Trichomonas y Candida, así como en procesos inflamatorios de los órganos reproductores femeninos, como colpitis, cervicitis o endometritis.

Gastritis-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Catarros crónicos o crónicamente recidivantes de la mucosa gástrica, especialmente gastritis subácida o anácida, con y sin erosiones o ulceraciones (gastritis erosiva o úlcera gástrica). Estados precancerosos gástricos.

Glioma-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
(Estado tras) afecciones en la zona de la neuroglia cerebral y medular como, por ejemplo, glioblastoma, glioblastosis o gliomatosis, gliosis, gliofibroma o gliofibromatosis. También en fibroneurinomas, neurofibromas y neurofibromatosis generalizada.

Granuloma dentis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante en enfermedades focales y toxicosis focales, tras la eliminación de los focos; incluso para la

búsqueda del foco. Enfermedades de origen focal o con antecedentes de tipo focal como, por ejemplo, cuadros clínicos de diversas formas de reumatismo, neuralgia crónica y neuritis. Cefalea, endocarditis, miocarditis o pericarditis, con y sin alteración del ritmo cardiaco. Defectos de las válvulas cardiacas, síntomas de insuficiencia cardiaca. Párulis y periodontopatías.

Grippe-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Grippe-Nosode-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.

Es uno de los nosodes de utilización más generalizada, sobre todo para el tratamiento de cualquier tipo de secuela de la gripe como, por ejemplo, polisinusitis crónica, afecciones asmáticas, ronquera persistente, afecciones reumáticas con dolores más o menos agudos (gripe reumática). Agotamiento y cansancio. Afecciones cardiacas, trastornos circulatorios y sensación de debilidad en las extremidades, incluso asociada a dolores musculares; cefaleas, temblores y sudación nocturna persistente.

Tendencia general a la corpulencia y adiposis, incluso en niños, debido a una hipofunción de la glándula tiroidea (hipotiroidismo). Tendencia a los resfriados crónicos y recidivantes. Como profilaxis, a modo de inmunización activa.

Hepatitis-Nosode-Injeel D 20, D 30, D 200 ana partes.

Hepatitis-Nosode-Injeel forte D 15, D 20, D 30, D 200 ana partes.

Hepatitis recidivante y hepatitis crónica persistente de cualquier tipo y causa, así como hepatitis durante el curso de enfermedades causadas por microorganismos hasta ahora desconocidos como, por ejemplo, enfermedad de Boeck, linfogranulomatosis (enfermedad de Hodgkin) y leucemia mieloide. En general, en trastornos hepáticos funcionales con desviaciones patológicas más o menos intensas de las pruebas hepáticas.

Herpes simplex-Nosode-Injeel D 12, D 30, D200 ana partes.

Infecciones herpéticas crónicas recidivantes de cualquier etiología y localización. Enfermedades herpéticas de la piel, tipos de herpes y enfermedades infecciosas causadas por medicamentos que, ocasionalmente, pueden cursar con un herpes labial.

Herpes zoster-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Cuando el herpes zoster es reciente, resulta más eficaz administrar la forma Injeel. También en neuralgias posherpéticas, normalmente muy resistentes al tratamiento, así como otras enfermedades similares al herpes.

Klebsiella pneumoniae-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Como terapia coadyuvante en o después de neumonía de Friedländer. Silicosis, neumoconiosis, bronquiectasias, asma bronquial, así como coadyuvante en gripe aguda, pleuritis y neumonía (especialmente en pacientes con adiposis). Daños terapéuticos tras la utilización de antibióticos.

Leptospirose-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Conforme a la similitud etiológica anamnéstica, cuando en el historial clínico aparece una enfermedad causada por leptospiras. Por consiguiente, siempre se indagará en la anamnesis sobre posibles leptospirosis.

La leptospirosis pertenece a un grupo de enfermedades infecciosas que pueden ser transmitidas por los animales al hombre (zoonosis).

Luesinum-Injeel D 15, D 30, D 200, D 1000 ana partes.

Luesinum-Injeel forte D 10, D 15, D 30, D 200, D 1000 ana partes.

Según Julian, es un medicamento de acción rápida que muestra excelentes resultados sobre todo en niños (retrasos escolares con carácter difícil). Los niños no son capaces de calcular o recordar números. Amnesia, inquietud, miedo y depresión. Estranguria no controlable, lavado de manos compulsivo. Dolores lancinantes con agravación nocturna y dolores que van de una sien a la otra. Dolores en la nuca. Conjuntivitis crónica. Dolores oculares e insomnio desde medianoche hasta las 6 de la madrugada. Ptosis con aspecto somnoliento. Paresia y neuralgia faciales. Otorrea con supuración, sordera progresiva. Rinitis atrófica. Ulceración de las cuerdas vocales. Afonía en vísperas de la menstruación. Asma crónico en tiempo húmedo y cálido.

Dolores cardiacos lancinantes. Sensación como si fluyera un líquido hirviendo por las arterias (Julian).

Sialorrea. Gastritis ácida. Sensación dolorosa en el esófago. Flatulencia. Fisuras anales. Hemorroides sangrantes. Incontinencia urinaria. Impotencia viril. Leucorrea, dismenorrea, prurito vulvar. Osteopatías diversas como, por ejemplo, caries vertebral y de otros huesos, quistes óseos, ostealgias, periostealgias, osteocondrosis, enfermedad de Scheuermann. Alopecia. Liquen rojo plano. Manchas cobrizas en la piel, vitíligo, onicorrexis (fisuras longitudinales).

Lyssinum-Injeel D 15, D 30, D 200 ana partes.
Agravación de todas las afecciones al ver u oír correr el agua, con la luz brillante (por ejemplo, conduciendo un automóvil con el sol de frente); al inclinarse (Julian), en particular al ver unas escaleras. Además, agravación por emociones o excitación.
También se produce una agravación de todas las afecciones por el mínimo contacto y por las corrientes de aire.
Sensación de ahogo en la garganta (anginas, al beber). Espasmos faríngeos, disfagia, sobre todo con la ingesta de líquidos.
Cefaleas, tos seca, enuresis nocturna, estados epileptiformes, parálisis agitante (enfermedad de Parkinson), espasmos en el embarazo, lumbalgias, afecciones coxíticas seniles, inquietud, hablar precipitado, hiperexcitación sexual. De acción eficaz en combinación con Hypophysis suis-Injeel.

Malaria-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento posterior de la malaria o de sus secuelas, especialmente en caso de curación incompleta con curso crónico.
Anemia, caquexia, hepatomegalia y esplenomegalia. Estados de agotamiento, cansancio y debilidad, falta de apetito (anorexia).

Mastoiditis-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Otitis media crónica (supuración del oído), tendencia a las inflamaciones recidivantes del oído medio, sordera del oído medio, lesiones retóxicas en el aparato auditivo.
Estados crónicos de fiebre de cualquier tipo. Neuralgia crónica (en neuralgias del trigémino, junto con Granuloma dentis-Injeel o con Psorinoheel®, Gels homaccord®, Spigelon®).
Puede probarse su administración en osteomielitis crónica, osteoporosis y atrofia de Sudeck, así como en los focos de infección.

Mastopathia cystica-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Mastopathia cystica-Nosode-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Nódulos benignos en las glándulas mamarias, especialmente de tipo quístico. Mastodinia. En hombres, macromastia o ginecomastia puberal.

Medorrhinum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Apresuramiento, desasosiego e inquietud. Nerviosismo excesivo y agotamiento. Sensibilidad a las corrientes de aire. Pesimismo, depresión mental, obstinación y otras alteraciones del carácter. Tendencia a las adicciones. Cefalea frontal con sensación de constricción. Insomnio a medianoche. Enuresis nocturna.
Gran pérdida de memoria (de los acontecimientos recientes). El paciente pierde el hilo mientras habla.
Rinitis y sinusitis con congestión nasal y anosmia. Tos seca y dolorosa, que empeora por la noche. Laringospasmos y asma, con mejoría a la orilla del mar. Deseo de estimulantes y dulces, así como de helados, cerveza y sal. Dolores gástricos con espasmos.
Estreñimiento con heces duras. Cólico renal, cistitis y uretritis. Leucorrea, prurito genital. Los senos de las mujeres están helados y con aspecto marmóreo, sensibles al contacto.
Afecciones reumáticas (monoartritis), gonartritis, coxartritis. Deformaciones de las articulaciones de dedos y manos. Sensación de calor ardiente y dolores en manos y plantas de los pies. Sensibilidad en los talones. Dolores neurálgicos de presentación y desaparición súbitas.
Piel húmeda, grasienta y brillante. Sudor corporal de mal olor. Verrugas pedunculadas. Condilomas acuminados y planos. Eccema crónico y dermititis. Estados hidrogenoides y sicóticos. Daños por vacunación. Eccemas en las nalgas en niños. Asma nocturna en niños. Cólera infantil, prolapso anal en niños, clorosis (anemia), delgadez, trastornos del desarrollo en niños.
Agravación por la mañana y durante el día, desde el amanecer hasta el anochecer.

Meningeoma-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados subsiguientes a la extirpación quirúrgica de un meningioma. Como medicamento sintomático en compresión de la médula espinal, trastornos del equilibrio, vértigo, hemicránea. Trastornos olfatorios, papilitis, exoftalmía y otros síntomas de compresión cerebral. Meningismo y reacciones meníngeas.

Morbillinum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento posterior tras padecer sarampión con secuelas como, por ejemplo, trastornos circulatorios, estados de reactividad general hiperérgica o anérgica con aumento de la predisposición a otras enfermedades. Exantemas morbiliformes. Síntomas catarrales como rinitis, faringitis, bronquitis, conjuntivitis con fotofobia y tumefacción facial. Laringitis y otros síntomas catarrales de origen vírico.

MS-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
(Nosode de esclerosis múltiple)
Cuadros clínicos de esclerosis múltiple y similares como, por ejemplo, encefalomielitis, mielitis para- o post-infecciosa en el curso de enfermedades infecciosas como sarampión, rubéola, neumonía, fiebre tifoidea, malaria, etc. Nistagmo, lenguaje escandido, temblor, neuritis retrobulbar (visión sombría, disminución de la visión), ataxia cerebelosa, parálisis espástica con reflejos deficientes de la pared abdominal. Trastornos sensoriales como parestesias, sensación de entumecimiento y tensión. Trastornos del equilibrio, vértigo, trastornos gastrointestinales. Estados de euforia, risas sin motivo, depresiones, trastornos intelectuales hasta llegar a demencia.

Mumps-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
(Nosode de parotiditis -vacuna-.)
Parotiditis epidémica (paperas), orquitis parotidítica. Pancreatopatías, pancreatitis. Miocarditis, síntomas reumáticos y polineuríticos y siempre que estos cuadros hayan aparecido en el curso de un caso reciente de parotiditis o conforme a la similitud sintomática.

Myoma uteri-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Mioma uterino, útero miomatoso. Menorragias, metrorragias. Frigidez. Esterilidad en mujeres jóvenes.

Nagelmykose-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades de los anejos cutáneos y de la piel. Micosis ungueal y dermatomicosis. Alopecia.
Enfermedades originadas por daños retóxicos tras el tratamiento externo o interno de micosis como, por ejemplo, en neuralgias crónicas. En estos casos, la anamnesis es un factor decisivo.

Nageltrichophytie-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Las mismas indicaciones que Nalgelmykose-Nosode-Injeel.

Neurofibroma-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tumores blandos y benignos del tejido conjuntivo, sobre todo en la región de los nervios periféricos, también en los pulmones, mediastino, región de la médula espinal y huesos, con los correspondientes síntomas, como signos de irritación sensorial, parestesias y dolores.
Véase también Fibroma pendulum-Injeel y Glioma-Injeel.

Osteomyelitis-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Como tratamiento coadyuvante en supuraciones crónicas en la región de la médula espinal, con y sin fístulas óseas, independientemente de la localización, origen o agente patógeno. Después de todo tipo de fracturas, enfermedades crónicas de los huesos como, por ejemplo, osteomalacia, raquitismo, atrofia de Sudeck. Otitis media crónica (en este caso, junto con Otitis media-Nosode-Injeel y, en caso necesario, Mastoiditis-Nosode-Injeel).

Osteomyelosklerose-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Cuadros clínicos osteoscleróticos-anémicos en forma de mielosclerosis, osteosclerosis, osteomielosclerosis, osteomielofibrosis y osteomielorreticulosis. Aumento de la osteomielosclerosis debida a una deficiente elasticidad. Artralgias. Anemia aplásica (osteopetrosis, osteosclerosis) con esplenomegalia y hepatomegalia. En todas las osteomielosclerosis o mielosclerosis por infecciones y factores tóxicos (acción del benceno, plomo, fósforo, flúor, estroncio y de los colorantes de anilina).

Otitis media-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Otitis media-Nosode-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Otitis media crónica y crónica recidivante. Oídos con supuración crónica, colesteatomas. Otitis externa. Sinusitis. Catarro tubárico del oído. Cistitis crónica o tendencia a la misma, pues el oído y la vejiga presentan ciertas correlaciones. Como medicamento a alternar en osteomielitis y procesos inflamatorios y supuraciones de cualquier tipo de localización.

Ovarialcyste-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Afecciones quísticas de cualquier tipo y localización. Especialmente, de forma experimental, en quistes ováricos, sobre todo tras intervenciones quirúrgicas de quistes y a fin de evitar recidivas. Desórdenes durante la menarquia, climaterio precoz, migrañas ginecológicas como, por ejemplo, antes o durante la menstruación.

Oxyuren-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Helmintiasis causadas por oxiuros, con sus síntomas correspondientes, como prurito anal molesto, eccema anal, tenesmo, proctitis, ocasionalmente enuresis, vulvitis. Trastornos nerviosos subsiguientes.

Ozaena-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Rinitis crónica que cursa con o sin sinusitis, especialmente rinitis atrófica con formación de costras y descomposición bacteriana de las mismas. Rinitis atrófica con fetidez nasal.

Parodontose-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Como coadyuvante en todas las periodontopatías. Encías sangrantes, atrofia gingival. Focos de infección que proceden de periodontopatías.

Periproktitischer Abszess-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Inflamación crónica recidivante (periproctitis o paraproctitis) con o sin formación de abscesos (absceso periproctítico) del tejido conjuntivo celular perirrectal, especialmente tras intervención quirúrgica de apertura para evitar recidivas.

Pertussis-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Tos ferina (junto con Dros homaccord®, Spascupreel®, Droperteel®). Otros tipos de tos como, por ejemplo, tos por enfisema pulmonar y asma bronquial con ataques de tos, especialmente con mucosidad viscosa y pegajosa, ocasionalmente asociada a vómitos y laringospasmos, así como en bronquiectasias. Según Julian, también en enfermedades neurológicas (en niños) con espasmos, así como tetania, estados epileptiformes, encefalopatía con deficiencia mental más o menos seria y, especialmente, cuando en el historial médico del paciente figura haber padecido la tos ferina.

Poliomyelitis-Nosode-Injeel D 20, D 30, D 200, D 400 ana partes.
Paresias de cualquier tipo, especialmente atónicas. Fiebre con dolores de las extremidades y cefaleas. Puede probarse su administración también en atrofia muscular espinal, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, parálisis atróficas, trastornos atróficos y vasomotores. Inestabilidad articular y otros trastornos esqueléticos y articulares.

Polyarthritis-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Polyarthritis-Nosode-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Inflamación reumática de las articulaciones, tanto de tipo exudativo como fibroso (retracción de la cápsula). Poliartrosis de las articulaciones de los dedos y de la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar con características artríticas. Sensación de rigidez articular por las mañanas.

Polypus laryngis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Pólipos laríngeos. Laringitis aguda y crónica. Ronquera aguda y crónica (incluso en la de oradores y cantantes). Otros pólipos en las mucosas como, por ejemplo, pólipos nasales, rectales y vesicales (en caso necesario, en asociación o alternancia con los nosodes correspondientes).

Polypus nasalis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Pólipos nasales y de las mucosas de los senos paranasales. Linfatismo, vegetaciones adenoides, hipertrofia amigdalar (en particular de la amígdala faríngea). Una hipertrofia amigdalar crónica (especialmente de la amígdala faríngea), que obstaculice seriamente la respiración nasal (boca abierta), puede conducir en la infancia a trastornos del desarrollo mental.

Polypus recti-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Pólipos en la región rectal (se excluirá absolutamente el carcinoma rectal).

Psoriasis-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Medicamento para intercalar en las más variadas enfermedades cutáneas de tipo inflamatorio crónico y degenerativo como, por ejemplo, psoriasis, eccema crónico (y agudo), dermatomicosis, dermatitis atópica, esclerodermia, lupus eritematoso, cuadros clínicos similares a la psoriasis, como parapsoriasis lichenoide y pitiriasis rubra pilaris.
Psoriasis-Nosode debería administrarse también en cualquier otro tipo de enfermedades, cuando se haya encontrado en la historia clínica un tratamiento retóxico de la psoriasis o de otras enfermedades cutáneas.

Psorinum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Según Julian, la posición de Psorinum está entre Sulfur y Thuja, y le complementa Tuberculinum. En su sintomatología, muestra gran similitud con Sulfur-Injeel S (aspecto sucio y repugnante con mal olor). Contrariamente a los pacientes Sulfur, los pacientes Psorinum presentan una marcada sensibilidad al frío y al ambiente glacial, mientras que el calor agrava el estado (como, por ejemplo, la irritación).

Pyodermie-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades cutáneas subagudas y crónicas, eccema húme-

do, furúnculos, furunculosis, ántrax (especialmente cuando hay marcada tendencia a las recidivas). Enfermedades que se presentan tras tratamiento retóxico de las erupciones como, por ejemplo, en asma bronquial, neuralgias y lesiones hepáticas, etc. Con frecuencia, las mismas indicaciones que Psoriasis Nosode-Injeel, Psorinum-Injeel y Anthracinum-Injeel. Muy eficaz en combinación con Asthma-Nosode-Injeel.

Pyrogenium-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Fases de reacción intensas y excesivas, con tendencia a las supuraciones. Linfangitis. Estados gangrenosos y desarrollos sépticos, en particular cuando se acompañan de los siguientes síntomas: sensación de frío intenso y escalofríos, sensación de frío extremo con aumento de la fiebre e hiperhidrosis.

Pyrogenium-Injeel está especialmente indicado durante la fiebre inicial, que siempre se acompaña de escalofríos y, en ocasiones, de sudores fríos.

Divergencia entre temperatura y pulso, bien un pulso inusualmente acelerado en relación con la fiebre, o un pulso lento con fiebre alta. Todas las secreciones son de mal olor, en particular las heces, de olor putrefacto.

Sensibilidad dolorosa en todo el cuerpo, de forma que se encuentra la cama muy dura. Estados de malestar que comienzan con dolores en las extremidades. Intranquilidad con movimientos impulsivos. Deseo de calor, mejoría con el calor.

Rubeolae-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Tratamiento posterior después de haber padecido la rubéola.

Síntomas encefalomielíticos o reumatoideos asociados a una rubéola padecida con anterioridad. Tumefacción de los ganglios linfáticos, especialmente cervicales, axilares, en las fosas poplíteas o asociados a esplenomegalia, así como exantemas similares a la rubéola.

Contraindicaciones: Embarazo

Salmonella paratyphi B-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Cuadros de gastroenteritis como, por ejemplo, tras consumo de helados e intoxicaciones por moluscos y carne (en asociación con Areel® y Veraccord®).

Enfermedades que cursan con fiebre muy alta y exicosis. Anginas persistentes y faringitis gripal. Colecistitis y otras infecciones con hiperhidrosis, palidez, debilidad del miocardio con arritmia. Como medicamento coadyuvante en fases neoplásicas. Según Julian, también en vegetaciones adenoides en la infancia.

Salmonella typhi-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Enfermedades que cursan con fiebre muy alta (enterocolitis hemorrágica, trastornos cardiacos bradicárdicos), así como en secuelas tifoideas.

Meteorismo. Colangitis, colecistitis. Bronquitis, bronconeumonía. Miocarditis. Complicaciones raras en el curso de la fiebre tifoidea como, por ejemplo, otitis, conjuntivitis, hemorragias de retina, degeneración muscular, polineuritis, parotiditis, osteomielitis, pancreatopatías, endocarditis, miocarditis, pericarditis, hepatitis, espondilitis.

Estados de confusión y aturdimiento como, por ejemplo, en esclerosis cerebral.

Sanguis menstrualis-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Es sabido que con la sangre menstrual se eliminan considerables cantidades de homotoxinas, las cuales pueden producir por efecto retrógrado congestiones pasivas, lo que ocurre, por ejemplo, en el climaterio y en caso de migrañas. Estados de confusión, manía celosa, ataques cardiacos, etc.

Por tanto, Sanguis menstrualis-Injeel está indicado en casi todos los estados tóxicos y, especialmente, cuando se produce una deficiente destoxicación de histamina y una deficiente degradación de las hormonas sexuales. Está asimismo indicado como medicamento coadyuvante para la depuración del terreno homotóxico, tanto en enfermedades agudas graves como crónicas, incluso, en la dosificación adecuada, en fases neoplásicas.

Scarlatinum-Injeel D 20, D 30, D 200 ana partes.

Secuelas después de haber sufrido la escarlatina, como nefritis y nefrosis, albuminuria, hematuria. Tendencia a la formación de edemas. Miocarditis, ocasionalmente con trastornos circulatorios coronarios, angina de pecho, neurosis cardiaca. Otitis media. Enfermedades reumatoideas.

Actúa principalmente sobre los riñones y, por tanto, también sobre la piel (dadas las relaciones entre riñones y piel). Enfermedades cutáneas con descamación y bordes rojizos y secos como, por ejemplo, en psoriasis, especialmente en pacientes de aspecto pastoso (mientras que Diphtherinum-Injeel actúa preferentemente en personas delgadas y sobre el corazón). En general, los pacientes con tejidos conjuntivos débiles y blandos tam-

bién sufren trastornos de la función renal (profesor Müller). La acción de Scarlatinum-Injeel sobre la función renal es comparable a la de Berberis-Injeel y Berbaccord®, por lo que existen buenas posibilidades de combinación con estos dos medicamentos. Berbaccord® también es adecuado para tipos pastosos. Tras su administración combinada, se observan a menudo buenos efectos de drenaje de los edemas nefrógenos.

Mientras que el paciente Diphtherinum posee una lengua roja y lisa, sufriendo afecciones cardiacas, la lengua del paciente Scarlatinum es limpia y lisa, como barnizada (lengua aframbuesada, lengua Apis, lengua de Mercurius corrosivus), pastosa e hinchada con tendencia edematosa.

Por tanto, Scarlatinum-Injeel actúa eficazmente en tipos flemáticos y Diphtherinum-Injeel en tipos eréticos.

Serum ovile-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Medicamento a intercalar en anafilaxia y en cualquier tipo de alergias como, por ejemplo, fiebre del heno, polinosis, asma bronquial de otro origen alérgico. También en dermatitis atópica y en eccemas agudos y crónicos.

Puede probarse su administración en tiroiditis de Hashimoto o estrumitis.

Sinusitis-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Inflamaciones agudas, crónicas y, especialmente crónicas recidivantes o supuraciones de los senos paranasales. Vegetaciones adenoides, linfatismo, fiebre del heno y otras rinitis y sinusitis vasomotoras o alérgicas. Síndrome senopulmonar. Como tratamiento coadyuvante en rinitis crónicas con tendencia a la rinitis atrófica. También en enfermedades que pueden ser influidas de forma refleja por la mucosa nasal, como, por ejemplo, asma refleja, úlcera gástrica y duodenal, neuralgias, etc.

Produce efectos favorables junto con Euphoheel® (ampollas, gotas), Euphoheel compositum® (spray nasal), así como en asociación con Mucosa nasalis suis-Injeel o con Mucs heel®, sobre todo en casos crónicos y con tendencia a la rinitis atrófica. También junto con Psorinoheel® y Graf homaccord® en vegetaciones adenoides y pólipos nasales, en combinación con Ventriculus suis-Injeel y/o Duodenum suis-Injeel en afecciones del tracto gastrointestinal.

Staphylococcus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Enfermedades crónicas y crónicas recidivantes causadas por estafilococos, en forma de infección mixta o de infección secundaria como, por ejemplo, furúnculos, ántrax, panadizos, impétigo, blefaritis, orzuelos, acné vulgar y conglobata, úlcera varicosa, piodermitis crónica, papilar y exulcerativa, osteomielitis, procesos flemonosos, otitis media, cistopielitis, neumonía, enterocolitis, mielitis, etc.

Generalmente en fases retóxicas que tienen su origen en lesiones por estafilotoxinas como, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, así como cuadros clínicos en cuya historia clínica se encuentran las enfermedades antes mencionadas.

Staphylococcus-Injeel también puede administrarse con un efecto favorable en lesiones miocárdicas, lesiones hepáticas y del tejido conjuntivo, así como en enfermedades tiroideas. Especialmente eficaz en asociación con Streptococcus haemolyticus-Injeel y Pyrogenium-Injeel.

Streptococcus haemolyticus-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Amigdalitis (frecuentemente con tendencia a los abscesos amigdalares), otitis media, flemones, empiema. Mastitis puerperal. Endocarditis, miocarditis y pericarditis. Neumonía. Meningitis. Osteomielitis. Poliartritis primaria crónica. Espasmos coreiformes. Muecas, tics. Hipertonía muscular. Alteraciones psíquicas como, por ejemplo, debilidad de impulsos, falta de atención, volubilidad, irritabilidad, depresión, cuadros psicóticos, psicosis con alucinaciones, pesadillas, pataleo.

Sintomático en intolerancia a los ruidos, luces y corrientes de aire, así como llanto sin motivos, sumisión, sensación de vibración de la columna vertebral al echarse, acufenos, disopsia y sensación de labios salados.

Streptococcus haemolyticus-Injeel deberá incluirse siempre en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, especialmente cuando existe la sospecha de que los estreptococos han participado en la patogénesis.

Especialmente eficaz en combinación con Staphylococcus-Injeel, Pyrogenium-Injeel y Anthracinum-Injeel.

Streptococcus viridans-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Indicaciones similares a las de Streptococcus haemolyticus-Injeel, pero se administra especialmente en endocarditis lenta y síntomas de sepsis lenta, así como en estados febriles persistentes o tifoideos. También en enfermedades autoinmunes o como medicamento a intercalar en fases de neoplasia.

Struma cystica-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Struma cystica-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Bocio quístico, experimentalmente también en otras hipertrofias tiroideas como, por ejemplo, bocio nodular, coloide y quístico. Tras intervención quirúrgica, a fin de evitar posibles recidivas.

Struma nodosa-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Bocio nodular (adenoma), frecuentemente mezclado con quistes, con calcificación habitual y hemorragias ocasionales. También puede probarse su administración en otros tipos de bocio.

Struma parenchymatosa-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Aumento parenquimatoso, es decir, difuso y uniforme, de la glándula tiroidea (normalmente con extenso desarrollo vascular y proliferación del epitelio glandular). También puede probarse su administración en otros tipos de bocio.

Sutoxol-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Niveles homotóxicos graves en todo tipo de fases. Para administrar o intercalar en la depuración del terreno homotóxico. Tendencia a las supuraciones, furúnculos, ántrax. Linfatismo. Leucorrea. Colangitis, colecistitis, colelitiasis. Experimentalmente en apendicitis crónica. En fases de neoplasia, como medicamento a intercalar.
Sutoxol-Injeel muestra similitudes con Pyrogenium-Injeel, de forma que puede utilizarse también con las indicaciones de Pyrogenium-Injeel. Además de Insektizid-Injeel, Psorinoheel N®, Grippe-Nosode-Injeel, Diphtherinum-Injeel, Adeps suillus-Injeel y Pyrogenium-Injeel, es uno de los nosodes más importantes, en particular para reducir niveles homotóxicos graves.

Tetanus-Antitoxin-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.
Reacciones, hipersensibilidad y enfermedades serológicas. Enfermedades espásticas de cualquier tipo, así como paresias espásticas. También, ocasionalmente, en esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson. Según Julian, también en trismo, trastornos de la glándula paratiroidea y del metabolismo del calcio. Experimentalmente en neuralgias y artrosis.

Tonsillarpfröpfe-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Constitución hidrogenoide. Sobrecarga de toxinas (sutoxinas). Tendencia a la amigdalitis crónica o crónica recidivante. Enfermedades focales como, por ejemplo, neuralgias, cuadros clínicos de varias formas de reumatismo, nefropatías y nefrosis. También experimentalmente en trastornos de la circulación coronaria.

Tonsillitis-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Tonsillitis-Nosode-Injeel forte D 6, D 10, D 30, D 200 ana partes.
Indicaciones similares a las de Tonsillarpfröpfe-Injeel y forte, aunque orientadas especialmente a las impregnaciones retóxicas tras el tratamiento no biológico de la amigdalitis como, por ejemplo, poliartritis reumática, glomerulonefritis, nefrosis, endocarditis y miocarditis. Lesiones miocárdicas y hepáticas.

Toxoplasmose-Nosode-Injeel D 15, D 30, D 200 ana partes.

Toxoplasmose-Nosode-Injeel forte D 10, D 15, D 30, D 200 ana partes.
Estado tras recuperación de una fetopatía toxoplasmótica, especialmente trastornos y retraso del desarrollo físico e intelectual. Tratamiento sintomático en cefaleas intolerables y resistentes a cualquier tratamiento como, por ejemplo, en hipertensión excesiva, migrañas, alteraciones psíquicas como, por ejemplo, estados depresivos debidos a una encefalitis crónica, enterocolitis, hepatitis, esplenitis, miositis, orquitis y algunas enfermedades cutáneas de tipo papular (eritema nudoso).
En general, se administra como inyección intercalada en fases retóxicas como, por ejemplo, cuando los niños sufren retrasos en su desarrollo (como después del tratamiento retóxico de la gripe, amigdalitis, etc.), aunque también tras el tratamiento retóxico de estas enfermedades en la edad adulta (convalecencia retardada).

Trichomonaden-Fluor-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Colpitis, erosión cervical, prurito vulvar (y anal), dolores ardientes en la vagina durante la micción. En el hombre, en uretritis ardiente. Endometritis, parametritis, salpingitis, ooforitis o prostatitis y, especialmente cuando se ha tratado retóxicamente una leucorrea o uretritis (en el hombre).
También en caso de sequedad de la mucosa nasal y tendencia a la rinitis atrófica, así como crisis cardiacas que se presentan tras el tratamiento retóxico de la leucorrea. Como medicamentos a alternar: Kreosotum-Injeel, Acidum nitricum-Injeel y Lamioflur.

Tuberculinum-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Tuberculinum-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Según Julian, las indicaciones de Tuberculinum se extienden a

la tuberculosis y a sus manifestaciones específicas y se amplían con su favorable aplicación terapéutica en trastornos psóricos, sicóticos y, naturalmente, también tuberculotóxicos. La eficacia de Tuberculinum es mayor cuando este nosode no se aplica según el principio de isopatía, es decir, no en la propia tuberculosis sino según la ley de similitud en enfermedades similares, es decir, en aquellas que presentan síntomas parecidos. Esto es válido para todos los nosodes, pero sobre todo para Tuberculinum. Depresiones mentales, tendencia al llanto. Hipocondría. Somnolencia durante el día. Disminución de la memoria. Agravación por la música (Julian). Cefaleas con sensación de tener el cerebro encerrado en una banda de hierro. Náuseas que se presentan periódicamente en tiempo húmedo y al oler el café. Dolor que se presenta sobre todo por encima del ojo derecho. También en escolares, agravación con el mínimo esfuerzo mental. Sueño intranquilo con tos, despertar con sensación de ansiedad. Conjuntivitis, orzuelos, queratitis, fotofobia. Otitis crónica y rinitis. Ulceraciones en la laringe. Afonía. Asma bronquial. Pleuritis seca con tos irritativa seca y dolores en el pecho. Palpitaciones cardiacas, arritmia. Coloración facial rojo violácea (Papaver-Injeel, también Belladonna-Injeel S). Hipotonía. Cansancio. Hiperhidrosis. Cardiodinia. También en úlcera gástrica y duodenal, colecistitis crónica y enterocolitis, así como cistopielitis crónica, nefritis, hidrocele, metritis. Igualmente en artritis aguda y crónica, osteocondrosis (enfermedad de Scheuermann), así como en fístulas óseas y, especialmente, en enfermedades cutáneas como eccemas descamativos e irritativos y fisuras. En impétigo, psoriasis, lupus eritematoso, acné juvenil, urticaria recidivante y sudación nocturna que deja un color amarillento en la ropa. Es característica de Tuberculinum la vicariación entre reumatismo y enfermedades cutáneas, en general, el cambio entre fases diferentes.

Ulcus cruris-Nosode-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.

Ulceras crurales de difícil curación.

Ulcus duodeni-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Ulcera duodenal callosa crónica, úlcera duodenal crónica recidivante con exacerbación primaveral y otoñal, a fin de evitar recidivas. Administrar también en úlcera duodenal de localización posbulbar, con retraso en el proceso de curación, donde su localización próxima a la ampolla de Vater también puede conducir a complicaciones secundarias, como la afectación de las vías biliares y pancreáticas, por incapacidad de la ampolla para cerrarse.

Ulcus ventriculi-Nosode-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Ulceras gástricas crónicas y crónicas recidivantes (independientemente de que existan hiperclorhidria, hipoacidez o aclorhidria). También en precancerosis.

Vaccininum-Injeel D 20, D 30, D 200 ana partes.

Consecuencias de reacciones excesivas tras vacunación contra la viruela, eficaz en asociación con Silicea-Injeel, Sulfur-Injeel S, Hepar sulfuris-Injeel, Mercurius solubilis Hahnemanni Injeel y Thuja-Injeel S. También en cefaleas, depresión exógena, conjuntivitis, blefaritis, iritis, rinitis purulenta, poliartritis reumática, paresia reumática, nefritis posvacunal, nefritis con albuminuria y hematuria. Asimismo, en hipermenorrea, varicela y, especialmente, en herpes zoster y simple (como inyección mixta con Variolinum-Injeel), aunque también en erisipela, flemones y eccemas agudos. También en dolores precordiales, eretismo cardiaco, punzadas pectorales, anorexia y repulsión al oler y ver alimentos (Julian). En general, en estados tóxicos graves y en enfermedades sépticas (en asociación con Trameel S®, Baptisia-Injeel S, Lachesis-Injeel S, Echinacea angustifolia-Injeel forte, Pyrogenium-Injeel).

Experimentalmente en aftas (con Engystol®, en caso necesario también Mucs heel®, etc.).

Varicellen-Nosode-Injeel D 12, D 30, D 200 ana partes.

Tras recuperación de una varicela y sus secuelas. Erupciones similares a las de una varicela.

Variolinum-Injeel D 20, D 30, D 200 ana partes.

Variolinum-Injeel forte D 15, D 20, D 30, D 200 ana partes.

Pústulas y erupciones cutáneas similares, ocasionalmente con tendencia a las hemorragias. Herpes como, por ejemplo, herpes simple y zoster. Acné pustuloso, impétigo contagioso.

Exantemas con tendencia a la sugilación (equimosis) y petequias. Formación de cicatrices en la piel. Supuración de la piel, incluidos, por ejemplo, panadizos y acné conglobata. Según Julian, en dolor occipital intenso e insoportable, tos con expectoración de mucosidad viscosa, pegajosa y sanguinolenta, de sa

bor putrefacto y parecido al cobre. Lengua fuera durante el sueño. Meteorismo, timpanismo, vómitos, diarrea, dolor de espalda, especialmente sacrolumbar, que irradia al abdomen. Dolores en las muñecas. Sudación de mal olor durante el día. Ocasionalmente, también en neuralgias posherpéticas. Variolinum-Injeel también ha mostrado su eficacia en pediatría, cuando tras la vacunación se presentan dificultades escolares o cambios de carácter, etc. En general, en todo tipo de supuraciones y en los casos más graves de toxicidad y de fiebre alta, ocasionalmente en enfermedades sépticas (en inyección mixta con Trameel S®, Vaccininum-Injeel, Pyrogenium-Injeel, Anthracinum-Injeel, Echiheel F®). Además, en encefalitis posvacunal (con Arsenicum album-Injeel S, Baptisia-Injeel S, Zincum metallicum-Injeel o Zincum valerianicum-Injeel, Engystol®). Variolinum-Injeel tiene indicaciones similares a Vaccininum-Injeel.

Organopreparados-"suis"

Aorta suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Hipotensión, afecciones vasculares como claudicación intermitente y gangrena. Se ha de tener precaución en casos de angina de pecho. En tales casos, se debe realizar un tratamiento previo con otros medicamentos homeopáticos antihomotóxicos (Cactheel®, Cralonin®, Angio heel®, etc. y Cor suis-Injeel).

Arteria suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Arteria suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos circulatorios. Periarteritis. Claudicación intermitente. Diabetes mellitus. Gangrena. Enfermedad de Buerger. Calambres en la pantorrilla.

Bronchus suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Enfisema. Asma bronquial. Bronquitis crónica. Estasis de la circulación pulmonar.

Cardia ventriculi suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Cardiospasmos. Pirosis. Hipo. Gastritis crónica. Diátesis ulcerosa.

Cartilago suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Cartilago suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Condropatías. Tendosinovitis. Coxitis. Periartritis escapulohumeral. Artrosis deformante.

Cerebellum suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Cinetosis. Enfermedad de Ménière. Vértigo. Hiperemesis gravídica. Insomnio.

Cerebrum frontalis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos de la inteligencia y de la facultad de razonamiento. Trastornos del desarrollo en niños.

Cerebrum suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Cerebrum suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Estados de agotamiento mental y trastornos del desarrollo. Debilidad funcional y trastornos circulatorios cerebrales. Parálisis progresiva (tratamiento posterior). Paraplejía. Arterioesclerosis. Demencia de origen arterioesclerótico. Encefalomalacia.

Cerebrum totalis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Las mismas indicaciones de Cerebrum suis-Injeel y Cerebrum frontalis suis-Injeel.

Colon suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Acción similar a Coecum suis-Injeel, pero más potente. También en espasmos intestinales (flexura lienalis, sigmoide). Indicado

como medicamento a intercalar o para administrar al principio del tratamiento en todos los estados tóxicos graves. Atonía intestinal. Cólico umbilical. Tenesmo rectal. Colitis mucosa y ulcerosa. Insomnio.

Corpus luteum suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos del equilibrio hormonal femenino. Envejecimiento prematuro. Climaterio. Trastornos en el curso del embarazo.

Corpus pineale suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Retrasa el desarrollo de fases neoplásicas. Asma bronquial. Puede probarse también en estados epileptiformes y en fases de degeneración de tipo general, como medicamento coadyuvante y para intercalar. Corea menor. Papilomas en la vejiga.

Corpus vitreum suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Opacidad del cuerpo vítreo. Glaucoma. Cataratas.

Cor suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Hipotensión. Angina de pecho. Trastornos de la circulación coronaria. Insuficiencia cardiaca. Corazón de atleta. Taquicardia paroxística. Tratamiento postinfarto.

Curvatura major ventriculi suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes
(Curvatura mayor del estómago)
Ulcera gastroduodenal. Gastritis crónica y precancerosis gástrica. Aquilia gástrica. Gastrospasmos.

Curvatura minor ventriculi suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes
(Curvatura menor del estómago)
Indicaciones similares a las de Curvatura major ventriculi suis-Injeel.

Cutis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Cutis suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Reacciones alérgicas. Dermatosis. Eccemas. Seborrea. Pénfigo. Rágades. Psoriasis. Ulcera de decúbito. Dermatomicosis. Elefantiasis. Esclerodermia. Después de quemaduras (incluyendo quemaduras por rayos X). Dermatitis atópica. Trastornos de la excreción renal. Hiperhidrosis, etc.

Dens suis-Injeel D10, D 30, D 200 ana partes.
Véase también Pulpa dentis suis-Injeel.
Periodontosis. Periodontitis. Caries. Trastornos de la dentición. Granuloma apical. Enfermedades focales.

Discus intervertebralis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Osteocondrosis de la columna vertebral. Síndrome cervical. Prolapso del núcleo pulposo. Enfermedades reumáticas y neurálgicas de origen intervertebral.

Ductus deferens suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Impotencia (en el varón). Trastornos de la fertilidad.

Duodenum suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Ulcera duodenal. Diátesis ulcerosa. Duodenitis. Pancreatitis. Síndrome gastrocardiaco. Pilorospasmos.

Embryo totalis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Embryo totalis suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Para revitalización, en todas las fases celulares. Arterioesclerosis. Distrofia muscular.

Epididymis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos de la fertilidad y la potencia. Como medicamento coadyuvante en carcinoma rectal.

Fel suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos de la función y excreción hepáticas; así como para favorecer la destoxicación general del hígado. Disbacteriosis intestinal. Taquicardia y arritmia cardiaca.

Funiculus umbilicalis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Funiculus umbilicalis suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Medicamento de las afecciones del tejido conjuntivo, indicado en casi todas las enfermedades crónicas. Lesiones del tejido conjuntivo. Adherencias. Osteocondrosis. Envejecimiento prematuro. Formación de arrugas. Adinamia. Arterioesclerosis. Síndrome cervical. Coxitis. Diverticulitis. Colitis crónica. Lupus eritematoso. Colagenopatías. Esclerodermia. Fibromas. Trastornos vasculares. Indicaciones geriátricas de todo tipo. Glaucoma. Trastornos circulatorios. Distonía vegetativa. Lesiones por radiación. Ulcera duodenal y gástrica. Prurito vulvar. Psoriasis. Sarcomas y carcinomas. Enfermedades autoinmunes. Trastornos provocados por antibióticos y otros medicamentos. Iatrogenia en general. Escrofulosis. Otosclerosis. Esclerosis múltiple. Atrofia muscular. Neuralgia intervertebral. Dermatitis atópica. Edema. Marasmo. Caquexia. Linfogranulomatosis. Miopía. Acné rosácea. Ulcera de decúbito. Dermatitis. Distrofia adiposogenital.

Elefantiasis. Enfisema. Exostosis. Cirrosis hepática. Tendosinovitis. Hidrocele. Medicamento coadyuvante en mixedema. Estrechez uretral. Fisura anal. Prolapso uterino. Eritema exudativo multiforme y nudoso. Enfermedad de Bechterew. Miositis osificante. Osteomalacia. Este medicamento deberá siempre combinarse con los medicamentos homeopáticos antihomotóxicos adecuados y otros organopreparados-"suis" (Hypophysis suis-Injeel, Glandula suprarenalis suis-Injeel y, particularmente, con Trameel S®, Engystol®, Galheel®, Psorinoheel®, Silicea-Injeel, Hepeel® y, de forma especial, también con los catalizadores intermediarios del ciclo de Krebs y, con el fin de obtener una acción particularmente enérgica, también con los medicamentos compositum -Heel, etc.).

Gingiva suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Periodontosis. Periodontitis. Granuloma apical. Gingivitis. Estomatitis aftosa crónica.

Glandula lymphatica suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Linfatismo. Diátesis exudativa, como medicamento coadyuvante en la enfermedad de Hodgkin (linfogranulomatosis). Linfosarcoma y reticulosis (junto con Galheel®, Psorinoheel®, Lymphomyosot®). Tumefacción de los ganglios linfáticos de origen desconocido. Cólico intestinal. Agranulocitosis. Amigdalitis crónica. Hipertrofia amigdalar.

Glandula parathyreoidea suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Tetania. Trastornos del metabolismo del calcio. Artritis y artrosis crónicas. Coxitis. Estados tras tiroidectomía. Asma bronquial. Hipertensión. Raquitismo. Miositis osificante. Enfermedad de Bechterew. Osteomalacia. Osteocondrosis. Espasmofilia. Pilorospasmos. Enfermedad de Sudeck. Cólico intestinal.

Glandula suprarenalis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Glandula suprarenalis suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Adinamia. Asma bronquial. Estados de agotamiento. Enfermedad de Addison y otros síntomas de agotamiento de las glándulas suprarrenales. Artritis reumatoidea. Hipotonía. Vagotonía. Dermatitis atópica. Rágades. Colitis mucosa. Espasmofilia. Después de quemaduras. Medicamento geriátrico.

Glandula thymi suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Glandula thymi suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos del crecimiento y el desarrollo. Síndrome de Down. Fases de neoplasia.

Glandula thyreoidea suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Glandula thyreoidea suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Síndrome de Down. Mixedema. Bocio parenquimatoso y coloide. Fases de neoplasia. Obesidad. Enfermedades hepáticas y renales.

Hepar suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Lesiones hepáticas y deficiente destoxicación hepática. Eccema crónico. Dermatitis atópica. Psoriasis. Lupus eritematoso. Porfiria. También en dermatomicosis. Pénfigo y craurosis vulvar. Esterilidad masculina. Enfermedades por radiaciones. Hipoglucemia. Anorexia nerviosa. Se indica frecuentemente como medicamento a intercalar en fases celulares. Para estimular la función destoxicante hepática; también indicado en artrosis deformante y periartritis escapulohumeral.

Hypophysis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Hypophysis suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos hormonales. Obesidad hipofisaria. Distrofia adiposo genital. Manifestaciones ováricas de deficiencias endocrinas. Trastornos de la menstruación y ovulación. Artrosis crónica y artritis reumatoidea. Trastornos de las funciones del tejido conjuntivo. Trastornos del crecimiento. Dismenorrea. Galactorrea. Dermatitis atópica y otras enfermedades de la piel.

Hypothalamus suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Hypothalamus suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos del sueño. Enfermedad de Parkinson. Estados epileptiformes. Trastornos del crecimiento y de la maduración, incluyendo los de tipo mental en los niños. Corea menor. Ninfomanía. Estados de excitación. Enfermedad de Simmond.

Jejunum suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Ulcera duodenal. Pancreatitis. Síndrome del dumping. Hipoglucemia.

Larynx suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Ronquera. Afonía. Trastornos de la voz. Pólipos laríngeos. Puede probarse en cáncer laríngeo.

Lens suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Catarata senil y traumática.
Lingua suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Sensación ardiente en la lengua. Estomatitis aftosa. Trastornos del gusto
Mamma suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Mamma suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Galactorrea. Mastodinia. Precancerosis. Desarrollo de fibromas. Pechos flácidos e hipotróficos. Dolor intermenstrual tras mastectomía.
Medulla oblongata suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades de Parkinson. Parálisis bulbar progresiva. Polineuritis. Esclerosis múltiple. Esclerosis lateral amiotrófica. Tabes dorsal. Parálisis espinal. Hipotonía. Corea menor. Trastornos de los centros vegetativos, incluyendo, por ejemplo, asma bronquial.
Medulla ossis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Anemia. Leucemia. Agranulocitosis y otros trastornos iatrogénicos. Lesiones por radiación. Coxitis. Osteomalacia. Osteomielitis crónica. Exostosis. Artritis deformante. Enfermedad de Sudeck.
Medulla spinalis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Esclerosis múltiple. Esclerosis lateral amiotrófica. Tabes dorsal. Paresias. Mielitis. Paraplejía. Corea menor.
Mucosa nasalis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Sinusitis crónica. Polisinusitis. Ocena. Pólipos nasales y otras afecciones de los senos nasales, ocasionalmente con estados reflejos en los órganos internos (como, por ejemplo, úlcera duodenal, asma bronquial).
Musculi oculi suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Estrabismo. Estado postapoplético con oftalmoplejía.
Musculus suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Musculus suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Miotonía. Insuficiencia muscular. Distrofia muscular. Atrofia muscular. Estados de debilidad y agotamiento. Insomnio.
Nervus olfactorius suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Anosmia. Rinitis vasomotora. Fiebre del heno (profilaxis). Afecciones reflejas con origen en la mucosa nasal. Puede probarse también en asma bronquial.
Nervus opticus suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Nervus opticus suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Atrofia del nervio óptico (posluética o tóxica). Disopsia. Escotoma centelleante. Migraña.
Oculus totalis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Oculus totalis suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Enfermedades oculares en fase de impregnación y/o degeneración. Glaucoma. Cataratas. Conjuntivitis crónica. Escleritis. En granulaciones crónicas (precaución: tuberculosis).
Oesophagus suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Pirosis. Globo histérico. Cardiospasmo. Hipo.
Onyx suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Onicomicosis, atrofia de las uñas. Alteraciones en las uñas en otras enfermedades.
Os petrosum suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Otosclerosis. Acufenos. Disacusia. Otras fases de impregnación y degeneración del oído interno.
Os suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Osteomalacia. Raquitismo. Osteoporosis. Enfermedad de Sudeck. Exostosis. Periostitis.
Ovarium suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Ovarium suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos de la función ovárica. Dismenorrea. Amenorrea. Climaterio con signos de insuficiencia endocrina ovárica. Hipermenorrea. Metrorragia. Esterilidad femenina. Neurosis climatérica con depresión. Ninfomanía. Delirio celotípico. Craurosis vulvar. Mastodinia. Osteomalacia.
Pankreas suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Diabetes mellitus (de origen pancreático). Disbacteriosis. Marasmo. Caquexia. Enteritis crónica. Duodenitis. Trastornos de la fermentación intestinal. Adinamia. Síndrome gastrocardiaco.
Parotis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Tras el tratamiento de las parotiditis. Quistes y trastornos de la secreción de las parótidas.
Placenta fetalis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Véase Placenta suis-Injeel
Placenta suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes
Placenta suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos circulatorios periféricos. Cutis marmorata. Ulcera

de decúbito. Sabañones. Enfermedad de Buerger. Ulcera crural. Rágades. Eccema. Formación de arrugas en la piel. Esclerodermia. Claudicación intermitente. Dismenorrea. Calambres en la pantorrilla. Reumatismo muscular.

Pons suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Afecciones postencefalíticas. Enfermedad de Parkinson (junto a Tarantula-Injeel). Trastornos de la inervación muscular.

Prostata suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Adenoma prostático. Trastornos de la micción y potencia sexual. Envejecimiento prematuro. Marasmo y caquexia.

Pulmo suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Asma bronquial. Bronquitis del fumador. Enfisema. Bronquiectasias. Precaución: en la tuberculosis, no se debe inyectar en fases febriles. Se debe esperar a que surta efecto, es decir, se ha de inyectar en intervalos de tiempo largos.

Pulpa dentis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Vease también Dens suis-Injeel.
Granuloma apical. Dentición pobre. Periodontosis. Periodontitis. Caries.

Pyelon suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Hidronefrosis. Pielitis crónica. Nefrolitiasis. Adenoma prostático. Cistopielitis. Nefrosis. Uremia. Eclampsia.

Pylorus suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Ulcera duodenal y gástrica. Anemia perniciosa. Aquilia gástrica. Anemia postinfecciosa. Pilorospasmo.

Rectum suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Rectum suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Tenesmo rectal. Estreñimiento. Eliminación deficiente a través del intestino. Precancerosis del recto. Diverticulitis. Fases preliminares de cáncer rectal. Colitis mucosa. Fisura anal.

Ren suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Ren suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Nefrolitiasis. Hidronefrosis. Cistopielitis. Albuminuria. Nefrosis. Glomerulonefritis (nunca en la fase aguda). Adenoma prostático. Edema. Oxaluria. Disminución de la función renal con eliminación deficiente. Hiperhidrosis.

Retina suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Retina suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Coroiditis. Trastornos de la visión. Miopía. Enfermedades degenerativas de la retina y del ojo. Experimentalmente en glaucoma.

Salpinx uteri suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Esterilidad femenina debido a enfermedades inflamatorias de las trompas (secuelas de gonorrea, etc.). Trastornos de la ovulación. Dismenorrea. Climaterio.

Sanguis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Generalmente en discrasias, estados homotóxicos graves y al comienzo de tratamientos de destoxicación.
Este medicamento se intercalará en todas las fases de degeneración, a determinados intervalos (cada 1-2-3 semanas), entre otros tratamientos con medicamentos homeopáticos antihomotóxicos Heel, ya que la sangre, como gran banda transportadora, también transporta numerosas homotoxinas, por lo que despliega una acción terapéutica de efecto inverso. Por tanto, sus indicaciones incluyen: leucemia, agranulocitosis, anemia, estados alérgicos y dermatitis.
Enfermedades metabólicas, especialmente diabetes mellitus; arterioesclerosis, colesterolemia, policitemia, etc., así como caquexia de Simmond.

Splen suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Leucemia. Anemia. Agranulocitosis. Se administra generalmente en carcinomas para revitalización, también en la senilidad y para aumentar las defensas antiinfecciosas.

Sympathicus suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Distonía vegetativa. Enfermedad de Sudeck. Hipotonía. Gangrena simétrica de las extremidades. Enfermedad de Buerger. Hipernefroma (experimentalmente). Migraña (además de Spigelon®, Psorinoheel®, Hepeel® y Hepar suis-Injeel, etc.). Asma bronquial. Ulcera duodenal. Angina de pecho. Diabetes mellitus.

Tendo suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Condropatías. Tendosinovitis. Coxitis. Periartritis escapulohumeral. Artrosis deformante.

Testis suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Testis suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Impotencia (en el varón). Envejecimiento prematuro. Estados de agotamiento. Agente revitalizador. Hidrocele. Esterilidad. Neuralgia funicular. Puede probarse en osteomalacia.

Tonsilla pharyngica suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Linfatismo. Hipertrofia de la amígdala faríngea. Trastornos del desarrollo mental y físico.

Tonsilla suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Hipertrofia amigdalar. Amigdalitis crónica. Linfatismo. Escrofulosis. Diátesis exudativa. También puede administrarse experimentalmente en linfogranulomatosis y reticulosis.

Tuba Eustachii suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Catarro crónico del conducto auditivo con acufenos y disacusia. Trastornos del oído medio como, por ejemplo, hidropesía del oído medio.

Ureter suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Nefrolitiasis. Trastornos de la excreción renal. Trastornos prostáticos. Hidronefrosis. Nefrosis. Cistopielitis. Glomerulonefritis. Ciertos casos de hipertensión renal.

Urethra suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Estrechez uretral. Estados crónicos de irritación uretral y del -- sistema urogenital. Prurito vulvar.

Uterus suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Uterus suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Prolapso uterino, Miomatosis uterina. Dismenorrea. Precancerosis del útero. Erosión uterina. Esterilidad femenina, otras enfermedades degenerativas del útero.

Vena suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.

Vena suis-Injeel forte D 8, D 12, D 30, D 200 ana partes.
Varices. Ulcera crural. Vitium mitral. Estasis venosa. Trastornos circulatorios. Claudicación intermitente. Enfermedad de Buerger. Periarteritis. Calambres en la pantorrilla.

Ventriculus suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Aquilia gástrica. Anemia perniciosa. Anemia postinfecciosa. Precancerosis gástrica. Ulceras gástricas crónicas. Pirosis.

Vesica fellea suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos de la función hepática. Colangitis crónica y colecistitis. Se ha de intercalar en numerosos casos de niveles tóxicos excesivos, también en cirrosis hepática, uremia, lupus eritematoso, etc.

Vesica urinaria suis-Injeel D 10, D 30, D 200 ana partes.
Trastornos de la excreción renal. Oxaluria. Nefrolitiasis. Cistopielitis. Hidronefrosis. Glomerulonefritis y nefrosis. Papilomas vesicales. Tenesmo vesical. Adenoma prostático. Ejerce un efecto de drenaje y estimulante sobre la excreción renal y la destoxicación general, por lo que se deberá intercalar en numerosas enfermedades crónicas (con Colon suis-Injeel, Hepar suis-Injeel, Vesica fellea suis-Injeel).

NOVEDADES

Oligoelementos

(gotas)

Oligoheel® Al
Retraso del desarrollo intelectual en niños; hiperquinesia infantil y dificultades escolares; trastornos del sueño.

Oligoheel® S
Afecciones alérgicas (desensibilización); trastornos funcionales del hígado y vías biliares.

Oligoheel® Bi
Procesos inflamatorios e infecciosos O.R.L. (Sobre todo amigdalitis y laringitis).

Oligoheel® Co
Regulación del simpático (sobre todo en espasmos digestivos y arteriales); migrañas; debilidad general; síndrome de fatiga crónica; debilidad en músculos y ligamentos.

Oligoheel® Cu
Afecciones inflamatorias bacterianas y virales (gripe y resfriado común); esterilidad; trastornos pigmentarios; diabetes; enfisema pulmonar; enfermedades cardiovasculares; artritis.

Oligoheel® Cu-Ag-Au
Diátesis anérgica: astenia psicofísica; tendencia depresiva; debilidad de las defensas; infecciones recidivantes.

Oligoheel® F
Hiperlaxitud ligamentaria; profilaxis de la caries; trastornos del metabolismo del calcio (osteoporosis, etc.).

Oligoheel® P
Disfunciones paratiroideas (osteoporosis, distrofias óseas); espasmofilia; artritis; sobrepeso; trastornos del crecimiento en niños.

Oligoheel® Li
Afecciones psíquicas que cursan con nerviosismo y ansiedad; tendencia a la depresión.

Oligoheel® Mg
Afecciones intestinales; espasmofilia; artrosis; osteoporosis; hipecolesterolemia; depresión; nerviosismo; cálculos renales; acidez; colitis; síndrome de fatiga crónica; enfermedades autoinmunes y cáncer.

Oligoheel® Mn
Afecciones alérgicas (urticaria, asma, rinitis); migrañas con trastornos digestivos, oftálmicos, etc.; artralgias fugaces; arterioesclerosis; epilepsias; fatiga crónica; diabetes; obesidad; nerviosismo.

Oligoheel® Mn-Co
Síndromes neurovegetativos; regulación de alteraciones circulatorias.

Oligoheel® Mn-Cu
Manifestaciones infecciosas crónicas; tendencia a trastornos respiratorios; susceptibilidad a la fatiga.

Oligoheel® Mn-Cu-Co
Tratamiento complementario de las anemias en general.

Oligoheel® Ni-Co
Trastornos pancreáticos funcionales (lentitud digestiva, somnolencia posprandial, etc.).

Oligoheel® K
Reumatismos crónicos; dolores reumáticos en general; tratamiento de cáncer como desbloqueador celular; trastornos cardiovasculares; alergias en niños; insomnio.

Oligoheel® I
Disfunciones tiroideas (de tipo hiper o hipo); oligoelemento específico del metabolismo tiroideo; enfermedad fibroquística de mama; exposición al material radioactivo; debilidad muscular; aumento de peso; frialdad de manos y pies.

Oligoheel® Zn
Trastornos endocrinos de tipo funcional; regulación hipofisaria; infecciones de repetición; reumatismo; artritis; alcoholismo; dismenorrea; enfermedades hepáticas y renales; estrés; impotencia; disminución de la memoria y alopecia.

Oligoheel® Zn-Cu
Disfunciones hipofisogonadales; afecciones endocrinas funcionales de la pubertad y de la menopausia.

Oligoheel® Zn-Ni-Co
Trastornos funcionales hipofisogonadales; prediabetes, obesidad.

NOVEDADES

Metaboheel®

Solución Inyectable

Fórmula con 2,0 ml. cada ampolleta contiene:

Graphites	10D
Graphites	30D
Graphites	200D
Levothyroxinum	10D
Levothyroxinum	12D
Fucus vesiculosus	6D
Adenosinum triphosphoricum	8D
Adenosinum 3,5 monohydrogenphosphoricum	6D

Agua inyectable c.b.p.	2,0 ml

Indicaciones terapéuticas:

Coadyuvante en el tratamiento de la obesidad endógena y exógena.
Alteraciones del metabolismo de los ácidos grasos.
Predisposición a la obesidad.

Patogenesias de cada activo homeopático:

Graphites

Acción lipolítica, pacientes gordos, apáticos, friolento y constipado, indicado especialmente en personas, sobre todo, mujeres con tendencia a la obesidad.

Levothyroxinum

Estimulación del metabolismo basal, en pacientes con tendencia a la obesidad. trastornos endocrinos.

Fucus vesiculosus

Trastornos endocrinos con tendencia a la obesidad, hipertrofia del cuerpo tiroides.

Adenosinum triphosphoricum

Apoyo de los sistemas consumidores de energía.

Adenosinum-3',5' monohydrogenphosphoricum

Estimulación de la reactividad de los sistemas enzimáticos.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, en pacientes con enfermedades tiroideas.

Precauciones y restricciones de uso durante el embarazo y lactancia:

No se han reportado efectos secundarios en forma general, pero no se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

Reacciones secundarias y adversas:

No se conocen.

Interacciones medicamentosas y de otro género:

Aunque no se ha reportado una interacción como tal, se recomienda no ingerir bebidas alcohólicas, café o cualquier otra sustancia estimulante durante el tratamiento, ya que en los requisitos de la experimentación pura establecidos por el doctor Hahnemann, estas son sustancias que se prohíben al sujeto de experimentación, ya que puede disminuir o bloquear los efectos de las sustancias en experimentación.

Alteraciones de prueba de laboratorio:

Hasta el momento no se han presentado alteraciones en las pruebas de laboratorio.

Dosis y vía de administración:

En general , aplicar 1 ampolleta 1 vez por semana, en dosis única por vía oral, intramuscular, subcutánea, intradérmica o intravenoso por 10 semanas.
Se sugiere su aplicación en forma de mesoterapia.
No es de uso pediátrico.

NOVEDADES

Lipolisheel®

Solución Inyectable

Sobredosificación o ingesta accidental:

Las manifestaciones que pudieran presentarse son los síntomas de una agravación medicamentosa de alguno de los componentes de la fórmula, en tal caso suspender el tratamiento.

Presentación:

Caja de cartón con 5 y 10 ampolletas.

Recomendaciones para el almacenamiento:

Conservese en lugar fresco y seco.
Protéjase de la luz.

Leyendas de protección

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MÉDICOS.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Hecho en Alemania por:
Biologische Heilmittel Heel GMBH.
Dr. Reckeweg - Str. 2-4.
76532 Baden, Baden Alemania.

Distribuido en México por:
Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V.
Blvd. García Morales Km. 6.5. El llano, Hermosillo, Son. México.
83210.

Reg. No. 002H2002 SSA

IPPR No. AHR-110457/R2002

Fórmula con 2,0 ml. cada ampolleta contiene:

Placenta totalis suis	6D
Vena suis	8D
Arteria suis	10D
Funiculus umbilicalis suis	10D
Secale cornutum	4D
Nicotiana Tabacum	10D
Aesculus hippocastanum	4D
Barium carbonicum	13D
Vipera berus	10D
Juglans regia ssp. regia	4D
Fumaria officinalis	4D
Levothyroxinum	12D
Sepia officinalis	6D
Pulsatilla pratensis	4D

Agua inyectable c.b.p.	2,0 ml

Indicaciones terapéuticas:

Coadyuvante en el tratamiento de la lipodistrofia.
Para cualquier tipo de lipodistrofia dura, media y blanda. En casos de lipodistrofia asociada a obesidad.

Patogenesias de cada activo homeopático:

Placenta totalis suis

Trastornos de la circulación periférica, eccemas, úlcera crural sabañones.

Vena suis

Trastornos de la circulación periférica, calambres en la pantorrilla, varices, úlcera crural, éstasis venosa.

Arteria suis

Trastornos circulatorios, claudicación intermitente.

NOVEDADES

Funiculus umbilicalis suis
Daños en el tejido conjuntivo, arterioesclerosis. Trastornos circulatorios.

Secale cornutum
Trastornos de la circulación periférica, parestesias, úlcera crural, mielitis después de haberse enfriado o mojado por la lluvia.

Nicotiana tabacum
Angioespasmos parestesias, vértigo colapso con palidez y sudores fríos, migraña.

Aesculus hippocastanum
Extasis venosa, hemorroides, varices parestesias, dolor sacrolumbar.

Barium carbonicum
Arterioesclerosis, corazón senil.

Vipera berus
Tromboflebitis, gangrena, sensación de pesadez en las piernas, paresias, debilidad cardiocirculatoria, trastornos del lenguaje.

Juglans regia ssp. Regia
Erupción pruriginosa y ardiente en los miembros inferiores, en invierno, y en el que el prurito aparece apenas se le destapa o se le desviste.

Fumaria officinalis
Medicamento depurativo de la sangre en caso de sobrecarga homotóxica, trastornos hepáticos funcionales, eccemas.

Sepia officinalis
Piernas y pies hinchados, peor sentada o parada, mejor caminando, la piel arde después del rascado, trastornos climatéricos, agotamiento nervioso. Depresiones, inflamaciones crónicas del útero y anexos.

Pulsatilla pratensis
Congestión venosa de las extremidades, manos rojas o cianóticas, varices en piernas y pies, azuladas, hinchadas, inflamadas con fuertes dolores lancinantes o pinchantes, calientes al tacto, con prurito y ardor en la piel.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Precauciones y restricciones de uso durante el embarazo y lactancia:

No se han reportado efectos secundarios en forma general, pero no se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

Reacciones secundarias y adversas:

No se conocen.

Interacciones medicamentosas y de otro género:

Aunque no se ha reportado una interacción como tal, se recomienda no ingerir bebidas alcohólicas, café o cualquier otra sustancia estimulante durante el tratamiento, ya que en los requisitos de la experimentación pura establecidos por el doctor Hahnemann, estas son sustancias que se prohíben al sujeto de experimentación, ya que puede disminuir o bloquear los efectos de las sustancias en experimentación.

Alteraciones de prueba de laboratorio:

Hasta el momento no se han presentado alteraciones en las pruebas de laboratorio.

Dosis y vía de administración:

En general , aplicar 1 ampolleta 1 vez por semana, en dosis única por vía oral, intramuscular, subcutánea, intradérmica o intravenoso por 10 semanas.
Se sugiere su aplicación en forma de mesoterapia.
No es de uso pediátrico.

Sobredosificación o ingesta accidental:

Las manifestaciones que pudieran presentarse son los síntomas de una agravación medicamentosa de alguno de los com

NOVEDADES

ponentes de la fórmula, en tal caso suspender el tratamiento.

Presentación:

Caja de cartón con 5 y 10 ampolletas.

Recomendaciones para el almacenamiento:
Conservese en lugar fresco y seco.
Protéjase de la luz.

Leyendas de protección

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MÉDICOS.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Hecho en Alemania por:
Biologische Heilmittel Heel GMBH.
Dr. Reckeweg - Str. 2-4.
76532 Baden, Baden Alemania.

Distribuido en México por:
Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V.
Blvd. García Morales Km. 6.5. El llano, Hermosillo, Son. México.
83210.

Reg. No. 001H2002 SSA

IPPR No. AHR-110456/R2002

Muskheel®

Solución Inyectable

Fórmula con 2,0 ml. cada ampolleta contiene:

Musculus suis	10D
Testis suis	10D
Embryo totalis suis	10D
Funiculus umbilicalis suis	10D
Glandula suprarenalis suis	10D
Cortisonum aceticum	10D
Strychninum phosphoricum	8D
Magnesium phosphoricum	8D
Manganum phosphoricum	8D
Acidum ascorbicum	6D
Thiaminum hydrochloricum	6D
Natrium riboflavinum phosphoricum	6D
Pyridoxinum hydrochloricum	6D
Nicotinamidum	6D
Acidum cis aconiticum	8D
Acidum citricum	8D
Acidum fumaricum	8D
Acidum alpha ketoglutaricum	8D
Acidum DL malicum	8D
Acidum succinicum	8D
Barium oxalsuccinicum	10D
Natrium diethyloxalaceticum	8D
Natrium pyruvicum	8D
Cysteinum	6D
Adenosinum triphosphoricum	10D
Nadidum	10D
Coenzym A	8D
Acidum DL alpha liponicum	6D

Agua inyectable c.b.p.	2,0 ml

NOVEDADES

Indicaciones terapéuticas:

Auxiliar en el tratamiento de las molestias causadas por algunas distrofias musculares.

Miotonía, insuficiencia muscular, atrofia muscular estados de agotamiento.

Patogenesias de cada activo homeopático:

Musculus suis

Miotonía, insuficiencia muscular, distrofia muscular, atrofia - muscular, estados de agotamiento, insomnio.

Testis suis

Factor de revitalización, impotencia viril, estados de agotamiento.

Embryo totalis suis

Para la revitalización en fases celulares, arterioesclerosis, distrofia muscular.

Funiculus umbilicalis suis

Para la revitalización en fases celulares, arterioesclerosis, distrofia muscular.

Glandula suprarenalis suis

Estados de agotamiento, insuficiencia de las glándulas suprarrenales.

Cortisonum aceticum

Lesiones de la corteza de las glándulas suprarrenales, hipófisis y tejido conjuntivo.

Strychninum phosphoricum

Síntomas de agotamiento, insomnio, irritabilidad, hiperhidrosis, corea menor, paresias de diferente tipo.

Magnesium phosphoricum

Neuralgias, diátesis espasmódica, estados de agotamiento.

Manganum phosphoricum

Estados de agotamiento con anemia.

Acidum ascorbicum

Cofactor para las funciones enzimáticas (sistema redox).

Thiaminum hydrochloricum

Cofactor para funciones enzimáticas (descarboxilación oxidativa).

Natrium riboflavinum phosphoricum

Cofactor para las funciones enzimáticas (flavoproteinas y sistema redox).

Pyridoxinum hydrochloricum

Cofactor para funciones enzimáticas (transaminasas, deshidratasas, desulfidrasas, descarboxilasas).

Nicotinamidum

Cofactor para funciones enzimáticas (deshidratasas).

Acidum cis aconiticum

Factor activo del ciclo de krebs y de los sistemas redox. Debilidad de los mecanismos de defensa.

Acidum citricum

Factor activo del ciclo de krebs y de los sistemas redox. Arterio esclerosis.

Acidum fumaricum

Factor activo del ciclo de krebs y de los sistemas redox. Estados de debilidad.

Acidum alpha ketoglutaricum

Factor activo del ciclo de krebs y de los sistemas redox. Sensación de debilidad.

Acidum dl malicum

Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox. Favorece la destoxicación.

Acidum succinicum

Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los síntomas redox. Fatiga extrema con sensación de pesadez en las extremidades.

Barium oxalsuccinicum

Factor activo del ciclo del ácido crítico y de los sistemas redox. Efecto regulador en trastornos del sistema endrocrino.

Natrium diethyloxalaceticum

Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox. Debilidad de los mecanismos de defensa.

Natrium pyruvicum

Factor activo del ciclo del ácido cítrico y de los sistemas redox. Favorece la destoxicación.

Cysteinum

Factor de potencial redox que contiene grupos SH trastornos retóxicos, latrogenia.

Adenosinum triphosphoricum

Apoyo de los sistemas consumidores de energía.

NOVEDADES

Nadidum
Biocatalizador, estimulación de la oxidación final en la cadena respiratoria.
Coenzym A
Coenzima para la transacetilación.
Acidum alpha liponicum
Coenzima para la descomposición del ácido pirúvico.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

Precauciones y restricciones de uso durante el embarazo y lactancia:

No se han reportado efectos secundarios en forma general, pero no se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

Reacciones secundarias y adversas:

No se conocen.

Interacciones medicamentosas y de otro género:

Aunque no se han reportado una interacción como tal, se recomienda no ingerir bebidas alcohólicas, café o cualquier otra sustancia estimulante durante el tratamiento, ya que en los requisitos de la experimentación pura establecidos por el doctor Hahnemann, estas son sustancias que se prohíben al sujeto de experimentación, ya que puede disminuir o bloquear los efectos de las sustancias en experimentación.

Alteraciones de prueba de laboratorio:

Hasta el momento no se han presentado alteraciones en las pruebas de laboratorio.

Dosis y vía de administración:

En general , aplicar 1 ampolleta 3 veces por semana, en dosis única por vía oral, intramuscular, subcutánea, intradérmica o intravenoso.
Se sugiere su aplicación en forma de mesoterapia.
No es de uso pediátrico.

Sobredosificación o ingesta accidental:

Las manifestaciones que pudieran presentarse son los síntomas de una agravación medicamentosa de alguno de los componentes de la fórmula, en tal caso suspender el tratamiento.

Presentación:

Caja de cartón con 5 y 10 ampolletas.

Recomendaciones para el almacenamiento:
Conservese en lugar fresco y seco.
Protéjase de la luz.

Leyendas de protección

LITERATURA EXCLUSIVA PARA MÉDICOS.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Hecho en Alemania por:
Biologische Heilmittel Heel GMBH.
Dr. Reckeweg - Str. 2-4.
76532 Baden, Baden Alemania.

Distribuido en México por:
Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V.
Blvd. García Morales Km. 6.5. El llano, Hermosillo, Son. México.
83210.

Reg. No. 003H2002 SSA

IPPR No. AHR-110455/R2002